

6
Laudate Deum omnes gentes, laudate eum omnes populi

N V O V A A L G E B R A

P R O P O R T I O N A L E.

Doue si mostra la inuentione della Radice cuba di molti binomij, quali gl'Illu-
stri Scrittori teneuano non potere essere cubi,

Et anco delli Trinomij con molte considerationi intorno à simili quantità.

DI PIETRO ANTONIO CATALDI.

ALL'ILLVSTRISSIMO
SENATO DI BOLOGNA.



IN BOLOGNA, M. DC. XIX.

Appresso Sebastiano Bonomi.

Con Licenza de' Superiori.

ALGERIA

Desseins militaires, fortifications, etc. etc.
des colonies algériennes, par le capitaine

DI PIETRO ANTONI, capitaine.

SENATO DI BOLONNA



IN BOLOGNA, M. DC. LXX.



Illustrifs. Signori, & Padroni colendifs.



L'ALGEBRA è dottrina dalla quale gl'intelletti efercitati nelli numeri, & linee poffono di cōtinuo eſtraherſi marauigliofe inuentioni, & applicabili alle occorrenze neceffarie, & comode, onde in queſt'opera moſtrandofi come ſi troui la radice cuba di molti binomij quali da gl'Illuſtri Scrittori ſi teneua non potere eſſere cubi, & anco d'alcuni Trinomij con altre conſiderationi in ſimili quantità; io ſotto la protezione di queſto Illuſtriſ. Senato benigniſſimo fautore, & benefattore de' letterati, & dotti, & al quale io deuo quanto da me può deriuare, la vengo à ponere in luce per ampliare queſta Dottrina, come ſpero anco di fare con altre opere già compoſte, & che andarò componendo, mentre piacerà à N.S.Dio concedermene gratia; & pregando Sua Diuina Maeſtà ad accreſcere di continuo le SS.VV.Illuſtriſ. di felicità.

Di VV. SS. Illuſtriſ;

Humiliſſimo Seruitore

Pietro Antonio Cataldi



Tauola delle cose principali contenute in questa Opera.

Come si conosca il binomio $x + \frac{1}{x}$ più rad. $x + \frac{1}{x}$ essere cubo non ostante, che la differenza $4\frac{1}{2}$ de' quadrati delle due sue parti non sia numero cubo, & come si troui la sua radice cuba. a fac. 17

Modo particolare di trouare la radice cuba delli numeri grandi. 19

Regola di trouare la differenza de' cubi di due quantità. 21

Inuentione della radice cuba delli Trinomy cubi. 28

Dimostrazione della conuenienza particolare, che ha il binomio cubo con la sua radice cuba. 39

Come si troui la radice cuba d'alcuni quadrinomy cubi. 42

Come si trouino due quantità tali, che il prodotto loro sia eguale al quadrato della differenza loro, & che la somma de' quadrati loro sia un numero dato, con la regola numerale, & lineale di simili questi. 49

Esempio del partire per un Trinomio. 50

L A V S D E O.

ordinato da G. B. B.



Tutto il mondo è teatro

CONTINVAZIONE DELL'ALGEBRA PROPORTIONALE;

Doue oltre il dichiararsi i due vltimi Problemi del secondo Libro dell'ingegnossima Opera de' Zeczerici, del dottissimo Signor Francesco Vietto Mathematico Eccellentissimo, si mostrano molte sottili, & marauigliose inuentioni.

Dato il prodotto, che nasce à moltiplicare la differenza di due quantità nella differenza de' due quadrati loro, & anco il prodotto, che nasce à moltiplicare la somma delle due quantità nella somma de' dui quadrati loro, trouare esse due quantità.



La il primo prodotto B. 32. & il secondo D. 272. Ponasi la somma de' lati essere A. 1. & che B. 32. sarà il quad. della differenza delle due quantità, & D. 272. sarà A. 1. co. la somma de' quadrati d'esse due quantità (che A. 1. co. se D. 272. nasce a moltiplicare la somma delle due quantità, nella somma de' dui quadrati loro, è necessario, che a partire esso D. per uno de' due moltiplicanti, cioè per la somma A. delle due quantità, ne venga l'altro d'essi dui moltiplicanti, cioè la somma de' quad. d'esse due quantità. Et se il B. 32.

nasce a moltiplicare la differenza delle due quantità, nella differenza de' dui quadrati loro, ne segue similmente, che a partire esso B. 32. per la somma A. delle due quantità, ne venga il quadrato della differenza delle medesime due quantità (perche di due quantità poniamo 3. & 11. la differenza 12. de' loro quadrati 9. & 121. si troua moltiplicando la somma loro 14. via la differenza loro 8. Onde moltiplicando esso 12. differenza de' quadrati (prodotto da 8. & 14.) via 8. differenza de' lati, che fa 896. questo viene ad essere prodotto da 8. & 14. cioè dal dutto della differenza nella differenza, moltiplicato nella somma d'esse quantità 3. & 11. ma il dutto della differenza 8. nella istessa differenza 8. è il quadrato d'essa differenza, cioè è 64. però l'896. nasce dal dutto del quadrato della differenza delle due quantità, nella somma delle medesime due quantità, per il che esso 896. (che anco è fatto dalla differenza 8. delle due quantità nella differenza 12. de' quadrati loro) partendosi per l'uno di quelli producenti, è moltiplicanti, cioè per la somma 14. delle due quantità, l'auuenimento douerà essere l'altro moltiplicante, cioè il quad. 64. della differenza delle due quantità. Onde è chiaro, che il dutto della differenza 8. delle due quantità, nella differenza 12. de' quadrati loro, partito per la somma 14. d'esse due quantità, l'auuenimento (64. è il quadrato della differenza 8. delle due quantità.) Ma il doppio della somma de' quad. delle due quantità, manco d' meno il quadrato della differenza d'esse due quantità fa tanto, & vogliamo dire è tanto quanto il quadrato della somma delle due quantità (perche essendosi mostrò nella quinta operatione a faiciate 56. che il quad. della somma di due quantità con il quad. della differenza delle istesse due quantità, sono eguali al doppio della somma de' quadrati delle medesime due quantità, ne segue, che da ciascuna banda leuandosi il quadrato della differenza delle due quantità, all' hora il solo quad. della somma delle due quantità, sarà eguale al doppio della somma de' quadrati, manco il quadrato della differenza delle due quantità) per il che il prodotto D. 272. due volte, partito per A. 1. co. manco il prodotto B. 32. partito per l'1. co. sarà eguale al quadrato di A. 1. co. cioè ad 1. co. (& vogliamo dire D. due volte manco B. Cioè D due volte B. A. cioè 244. ab 32. 1. co. e b 2. 512. sarà eguale al quad. di A. 1. co. cioè ad 1. co. A. onde

A tità

tà per il denominatore, ò partitore comune A 1. & somma delle due quantità che si cercano; haueremo il doppio di D. manco il B. eguale al cubo di A. somma delle due quantità cercate, cioè haueremo il doppio di D manco B. eguale ad 1. 3. Onde si vede, che il doppio del prodotto della somma delle due quantità, nella somma de' quadrati d'esse due quantità, cauato il prodotto della differenza delle due quantità, nella differenza de' quadrati loro è eguale al cubo della somma delle due quantità. Però essendo D. 272. dal suo doppio 544. cauando il B. 32. il restante 512. sarà il cubo di A. somma delle due quantità, però la $\sqrt[3]{512}$ cuba di 8. cioè 8. sarà la somma delle due quantità. Dati dunque li prodotti B. 32. & D. 272. si trouano le due quantità. Perché douendo essere 8. la somma delle due quantità, & D. 272. il prodotto d'essa somma 8. nella somma de' quadrati delle due quantità, si vede che a partire questo 272. B. per 8. somma delle due quantità, l'auuenimento 34. deve essere la somma de' quadrati delle due quantità. Et hora sapendo la somma delle due quantità essere 8. & la somma de' dui quadrati loro essere 34. si trouariano le due quantità nel modo moltrato nella sesta Operatione. Cioè dal doppio della somma de' quadrati delle due quantità, cioè dal doppio di 34. ch'è 68. si caui il quadrato della somma delle due quantità, cioè il quad. d'8. ch'è 64. & il restante 4. è il quad. della differenza delle due quantità, onde presa la $\sqrt[3]{4}$ ch'è 2. questo 2. è la differenza delle due quantità, che cauata da 8. somma, la mità del restante 6. cioè 3. sarà la quantità minore, & però 5. sarà la maggiore, ouero essendo 8. la somma delle due quantità con esso 8. partendo B. 32. l'auuenimento 4. deu essere ò vogliamo dire è il quad. della differenza delle due quantità (come si è mostrato nel discorso superiore); però essa differenza è la B di 4. cioè 2. onde le quantità sono 4. (mità di 8. somma loro) & la mità di 2. differenza loro, la minore cioè 3. & la maggiore 4. p. 1. cioè 5.

Dalle cose dette si può deriuare, ò estrarre la seguente Regola negli questi simili.

Dato il prodotto (& chiamisi B) che nasce a moltiplicare la differenza di due quantità, nella differenza de' dui quadrati loro. Et anco il prodotto (& chiamisi D) che nasce a moltiplicare la somma delle due quantità, nella somma de' dui quadrati loro; Per trouare quanto sia ciascuna delle due quantità.

Dal doppio di D. si caui B. & del restante A. si pigli la $\sqrt[3]{A}$ cuba, & sia C (qual C è sempre la somma delle due quantità) con esso C. si parta D. & sia l'auuenimento A (quale A è sempre la somma de' quadrati delle due quantità) dal doppio di questo A. si caui il quadrato di C, & sia il restante R. quale R è sempre il quad. della differenza delle due quantità. Quello R. si sarà anco trouato subito partendo B. per C. che l'auuenimento è l'R; Di questo R. si pigli la $\sqrt[3]{R}$ quadra, & sia S. quale S. sarà la differenza delle due quantità, essendo C. la somma loro, perche la mità di S. si giunga, & caui a la mità di C, che li dui risultanti faranno le due quantità cercate; Et anco breuemente si potrà dire.

Dal doppio di D. si caui B. & del restante si pigli la $\sqrt[3]{A}$ cuba, & sia C. con il quale C. si parta B. & dell'auuenimento si pigli la $\sqrt[3]{R}$ quadra, & sia S. la mità del quale S. si gionga, & caui alla & dalla mità di C. che i due risultanti faranno le due quantità cercate.

Di qui mo si può anco deriuare la Regola lineale.

Per darne effettio in pratica si potrà dire.

Si vogliono fare dui Giardini quadrati tali, che moltiplicando la somma delle due grandezze loro, via la somma di i suoi lati, facci a punto la grandezza d'un campo lungo pertiche 17. & largo pertiche 16. Ma moltiplicando la differenza de' dui suoi lati, via la differenza delle loro grandezze, facci a punto la grandezza d'un campo lungo pertiche 8. & largo pertiche 4. si domanda quanto sarà ciascuno d'essi dui Giardini per lato.

Delli dui campi le grandezze sono 17. & 32. però còuiene trouare dui numeri tali, che la somma loro moltiplicata via la somma delli dui quad. loro facci 272. Et che la differenza loro moltiplicata via la differenza de' quadrati loro facci 32. Onde come insegna la regola; Dal doppio di 272. maggiore, cauaremo 32. minore, & del restante 512. piglieremo la $\sqrt[3]{512}$ cuba ch'è 8. (& questo 8. è la somma de' dui lati de' i dui Giardini) con il quale 8. si parta 32. & ne viene 4. del quale si pigli la rad. quadra, ch'è 2. (& questo 2. è sempre la differenza de' i due lati de' i due Giardini) hora la mità di questo 2. si giunga, & caui alla mità del 4. detto, che i dui risultanti 3. & 5. faranno i dui lati de' i dui Giardini, però diremo che l'uno sarà 3. pertiche per ciascun lato, & l'altro 5. pertiche per ciascun lato, & le loro grandezze faranno pertiche 9. & pertiche 25.

Hor veda lo Studente come applicando i questi astratti alle cose materiali, si possa conoscere la bellezza della Scienza, & mollrare che senz'essa sia impossibile a risolvere ancora questi Meccanici, che a prima vista non paiono molto difficili.

Si potrà anco dire. Sono due Stanze quadrate tali, che fatto vn Pilaistro egualmente grosso, la base del quale sia grande quanto il pavimento delle due Stanze insieme, & alto quanto è il com-

composto delle due lunghezze d'esse Stanze, egli si troua contenere canne 172. cubiche, ò corporee di grandezza; Et fatto vn' altro Pilastro egualmente grosso tale, che la sua base sia quanto è differenza delle due superficie delle due Stanze, & l'altezza sia quanto è la differenza delle due lunghezze di dette due Stanze, egli è grande canne 32. corporee, si domanda la lunghezza di ciascuna delle due Stanze.

Et dicendoli effere B. 10. & D. 20. per trouare ciafcuna delle due quantità. Dal doppio di 10. ch'è 40. fi caui B. 10. che il riluante 30. è il cubo della fomma delle due quantità, perche effa fomma farà Bx cuba 30. con la quale fi pateta D. 20. cioè Bx cuba 8000. etto della fomma delle due quantità nella fomma de'loro quadrati, che l'aumentio Bx cuba $6\frac{2}{3}$. farà la fomma de' quadrati delle due quantità. Dal doppio della quale, ch'è Bx cuba $6\frac{2}{3} \times 2$. fi caui il quad. della fomma delle due quantità, cioè il quad. di Bx cuba 30. ch'è Bx cuba 900. & refti Bx cuba 2133 $\frac{1}{3}$. m Bx cuba 900. cioè Bx cuba 13 $\frac{1}{3}$. (che rad. cuba 900. in rad. cuba 2133 $\frac{1}{3}$. & refti rad. cuba $6\frac{2}{3}$. entra volte rad. cuba 21 $\frac{2}{3}$. cioè volte rad. cuba $6\frac{2}{3}$. ch'è $\frac{1}{3}$. & vogliamo dire volte 1. & de effa rad. cuba 900. in quello, che refta acauarlo da rad. cuba 2133 $\frac{1}{3}$. entrara una volta meno, cioè entrara foio volte $\frac{1}{3}$. perche multiplicando quello $\frac{1}{3}$. via rad. cuba 900. cioè rad. cuba $\frac{1}{3} \times 900$. via rad. cuba 900. che fa rad. cuba $21\frac{2}{3}$. cioè rad. c. $10\frac{2}{3}$. cioè rad. c. 33 $\frac{1}{3}$. quello fara il riluante; ouero per cauare rad. cuba 900. da rad. cuba 2133 $\frac{1}{3}$. riducendole a forma di rotto di una effa de denominatione, hauremo rad. c. $11\frac{1}{3}$ & rad. c. $10\frac{2}{3}$. che per effere il 27. & il 64. centena ri, numeri cubi, fi vede subito, che rad. c. $11\frac{1}{3}$ entra nell' una rad. c. 27. volte, cioè 3. volte, & nell'altra rad. c. 64. volte, cioè 4. volte, & però nella differenza loro entrara 1. volta, fi che 1. volta rad. c. $11\frac{1}{3}$. che fa pure rad. c. $11\frac{1}{3}$. cioè rad. c. 33 $\frac{1}{3}$. farà il riluante cercato. Et quello è il quadrato della differenza delle due quantità. (Qual quadrato della differenza delle due quantità fi trouaria anco subito come s'è detto di fopra, partendo B. 10. per 10. la fomma delle due quantità rad. c. 30. che ne viene 10 . cioè rad. c. $11\frac{1}{3}$. ch'è rad. c. $11\frac{1}{3}$. cioè rad. c. 33 $\frac{1}{3}$.) Effa differēza dunque delle due Bx c. 30. quantità farà la Bx quadra della detta Bx cuba 33 $\frac{1}{3}$. (o rad. cuba $11\frac{1}{3}$.) cioè farà Bx quadra cuba $11\frac{1}{3}$. (o vogliamo dire rad. cuba cuba 33 $\frac{1}{3}$.) però la mità d'effa differenza delle due quantità farà Bx quadra cuba $11\frac{1}{3}$. cioè Bx quadra cuba $\frac{1}{3}$. che giunta, & cauata alla mità della fomma delle due quantità, cioè alla mità di Bx cuba 30. ch'è Bx $\frac{1}{3}$. & vogliamo dire Bx cuba $\frac{1}{3}$. i dui refultanti Bx c. $11\frac{1}{3}$. p Bx quadra cuba $11\frac{1}{3}$. Et Bx cuba $\frac{1}{3}$. m Bx quadra cuba $11\frac{1}{3}$. & vogliamo dire Bx cuba 33 $\frac{1}{3}$. p Bx quadra cuba $11\frac{1}{3}$. Et Bx cuba 33 $\frac{1}{3}$. m Bx quadra cuba $11\frac{1}{3}$. faranno le due quantità.

Il quad. della quantità minore è $r.c. 33 \frac{1}{2}$. m. il duto di $r.c. 30$. in $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$.

Onde la forma de' dai quad. delle due quantità è $r.c. 33 \frac{1}{2}$. due volte, cioè $r.c. \frac{33}{2} \frac{0}{0}$. ch'è $r.c. 266 \frac{1}{2}$. quale somma de' quad. multiplicato nella sōma delle due quantità, ch'è $r.c. 30$. fa $r.c. 8000$. cioè 20. come si propone.

La differenza de' quad. delle dette due quantità è il duto di $r.c. 30$. in $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. due volte, cioè il duto di $r.c. 240$. in $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{1}{2}$. cioè il duto di $r.q.c. 57600$. in $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{1}{2}$. cioè il duto di $r.q.c. 1200$. in $r.q.c. 25$. ch'è $r.q.c. 30000$. Il che multiplicato nella differenza delle due quantità, ch'è $r.q.c. 33 \frac{1}{2}$. cioè $r.q.c. \frac{1}{2} \frac{0}{0}$. fa $r.q.c. 1000000$. cioè $r.c. 2000$. cioè 10. B. come si propone; Perilche siamo sicuri d'hauere bene operato, & le due quantità trouate esser a punto quelle, che si domandauano.

Se vorremo trouare la proportionē, che hanno delle due quantità trouate, la maggiore alla minore, cioè $r.c. 3 \frac{1}{2}$. p. $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. a $r.c. 3 \frac{1}{2}$. m. $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. potremo operare così.

Delle due parti del Binomio, che descrive la q. maggiore, poniamo per comodità, che la parte minore $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{1}{2}$. douenta la vnità, cioè 1. & veggasi, che douentara la parte maggiore $r.c. 3 \frac{1}{2}$. che perciò riducendola anch'ella a $r.q.c.$ ella fara $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{3}{8} \frac{1}{2}$. cioè (riduttala per comodità alla denominazione dell'altra) fara $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. che in effa la rad. q.c. $\frac{1}{8} \frac{5}{8}$. (cioè $r.q.c. 25$. in $r.q.c. 675$). entra p. $r.q.c. 27$. cioè a partire $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. p. $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. ò vogliamo dire (lasciando il denominatore comune 48.) a partire $r.q.c. 635$. p. $r.q.c. 25$. ne viene $r.q.c. 27$. ch'è $r.q.c. 3$. onde la parte maggiore del binomio fara $r.q.c. 3$. quando la parte minore sia 1. & però effo binomio fara $r.c. 3$. p. 1. Perilche se $r.c. 3 \frac{1}{2}$. p. $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. si riduce a $r.c. 1$. p. 1. Il Residuo $r.c. 3 \frac{1}{2}$. m. $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. si ridurrà al residuo $r.c. 3$. m. 1. Et così dalla quantità maggiore alla minore, fara come da $r.c. 3$. p. 1. a $r.c. 3$. m. 1. Et se anco vorremo ridurle a proportionē, che habbi l'antecedente rationale, potremo multiplicare l'antecedente $r.c. 3$. p. 1. ch'è binomio per il suo residuo $r.c. 3$. m. 1. Et anco per l'istesso residuo multiplicare il consequēte $r.c. 3$. m. 1. Et si ridurranno a 2. & 4. m. 12. Onde dalla quantità maggiore alla minore, fara come da 2. a 4. m. 12. Et anco partēdo per 2. per ridurre l'antecedente all'vnità, hancremo per antecedente 1. & per consequente 2. m. 3. che mostrano la proportionē ch'è della quantità maggiore alla minore.

Et se vorremo ridurre la parte minore cioè il consequente ad 1. perche dalla parte minore alla maggiore è come da 2. m. 3. ad 1. multiplicaremo l'antecedente, ch'è residuo per il suo binomio 2. p. 3. & fa 4. m. 3. cioè 1. per nouo antecedente, & medesimamente multiplicaremo il consequente 1. per l'istesso binomio 2. p. 3. & fa 2. p. 3. & questo è il nouo consequēte, perilche si dira, che dalla quantità minore alla maggiore è come da 1. a 2. p. 3.

Ma per ridurre la maggiore alla vnità al modo ordinario, & trouare, che douentaria, ò a che si ridurrea la minore, cioè che cosa habbi da essere la parte minore, quando la maggiore sia 1. si dira per la Regola del Tre (ò vogliamo dire delle 4. quantità proportionali.)

Per $r.c. 3 \frac{1}{2}$. p. $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. partasi
via $r.c. 3 \frac{1}{2}$. m. $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. suo residuo
m. $r.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. m. $r.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$.
cioè $r.c. 4 \frac{1}{2}$. (ch'è il doppio di $r.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$.)
che a cauare $r.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. da $r.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. cioè da
 $r.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. a lei tripla, resta solo il doppio
d'effa $r.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. cioè $r.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. ch'è $r.c. 4 \frac{1}{2}$.
entrara 4. volte, onde $r.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. via 4. cioè via $r.c. 64$ (ch'è quāto $r.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. via $r.c. 4$.) & fa $r.c. 33 \frac{1}{2}$.
fara la somma loro. Ancora (per la somma de' prodotti delle due multiplicationi in eroe)
al doppio di $r.c. 3 \frac{1}{2}$. c. $r.c. 30$. cioè $r.q.c. 900$. quale multiplicato via m. $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. che risulta
(sebbene per comodità) l'istesso, ch'è $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. via $r.q.c. 300$. fa $r.q.c. 112500$. cioè $r.q.c. 468$.
 $\frac{3}{4}$. & è m. quale cō la $r.c. 33 \frac{1}{2}$. (somma delle altre due multiplicationi) fa $r.c. 33 \frac{1}{2}$. m. $r.q.c. 468$.
 $\frac{3}{4}$. per il prodotto cercato, quale si parte per $r.c. 4 \frac{1}{2}$. & ne viene 2. m. 3.

$r.c. 4 \frac{1}{2}$. | $r.c. 33 \frac{1}{2}$. m. $r.q.c. 468 \frac{3}{4}$.
 $r.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. | $r.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. m. $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$.
 $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. | $r.c. 8$. m. $r.q.c. 27$
cioè 2. m. $r.q.c. 3$.

Scr. $r.c. 3 \frac{1}{2}$. p. $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. douenta 1. che douentaria $r.c. 3 \frac{1}{2}$. m. $r.q.c. \frac{3}{8} \frac{5}{8}$. Onde multiplicando la vnità (seconda delle 3. quantità, in questa regola del 3.) con la terza, il prodotto fara la istessa terza, quale si partira per la prima secondo l'arte, cioè multiplicado il partitore ch'è binomio per il suo residuo (acciò se ne produca un partitore semplice, cioè non binomio,) & anco per il medesimo residuo multiplicando la quantità da partire per seruire sempre la proportionē medesima.

medesima nelle due quantità: partitore cioè, & da partire) che il partitore douctará r.c.4 $\frac{1}{2}$. (quantità semplice, cioè d'un solo nome) & la quantità da partire douctará r.c.3 $\frac{1}{3}$. m.r.q.c. 468 $\frac{1}{2}$. Onde hora a partire questa per la partire r.c.4 $\frac{1}{2}$. quato alla r.c.3 $\frac{1}{3}$. ne viene r.c.8. cioè 2. Et quanto alla r.q.c. 468 $\frac{1}{2}$. (che è m) ridurremo il partitore r.c.4 $\frac{1}{2}$. a r.q.c. & farà r.q.c. $\frac{2}{3}$. che in r.q.c. 468 $\frac{1}{2}$. cioè in r.q.c. $\frac{1}{2}$ $\frac{8}{3}$. cioè in r.q.c. $\frac{1}{2}$ $\frac{8}{3}$. cioè (lasciando il comune denominatore) r.q.c. 624. in r.q.c. 168 75. entra volte r.q.c.27. che è r.q.3. pero a partire m.r.q.c. 468 $\frac{1}{2}$. per r.q.c. $\frac{2}{3}$. ne viene r.3. onde il totale auuicinato farà 2.m.r.1. & questa è la parte minore, come da 1.a 2. in r.3. & douerai fare dalla minore alla maggiore, come da 2. in r.3. ad 1. Et se li principiati per esercitarsi nelle operationi numerali di quella sorte, vorranno fingendo di farne proua, o chiarirli se veramente le due quantità dette, hanno fra loro la sopraditta proportion, potranno dire: Douendo perciò essere r.c.3 $\frac{1}{3}$. p.r.q.c. $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$. & r.c.3 $\frac{1}{3}$. m.r.q.c. $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$. & 1. & 2. m.r.3. quattro quantità proportionali (che si dice alla prima alla seconda, & essere la proportion, che è dalla terza alla quarta) conuenie che a moltiplicare la prima r.c.3 $\frac{1}{3}$. p.r.q.c. $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$. uia la quarta 2. m.r.3. facci quanto è il prodotto della seconda r.c.3 $\frac{1}{3}$. m.r.q.c. $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$. della terza 1. qual prodotto è la medesima seconda r.c.3 $\frac{1}{3}$. m.r.q.c. $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$. ma a punto il duto della prima nella quarta è r.c.3 $\frac{1}{3}$. m.r.q.c. $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$. come si vede in inargine, però siamo sicuri d'hauer operato bene, & che la proportion trouata conuenie veramente alle due quantità già stabilite.

1.co. piu 1. | 13. & piu 13.
 13.co. m 13 co. piu 13.
 13. &
 13. & piu 13. ce.
 resta m 13.co.
 13. m 13.co.
 m 13.co. m 13.co.

resta 13. & piu 13. nel quale
 b1.co. piu 1. partitore entra peife 13. vol
 te, però l'aumento a 13. & m 13. & p 13
 13.co. piu 13. E' uguale a 21.co.
 1.co. piu 1. E' uguale a $1\frac{1}{13}$.

da $\frac{1}{13}$ non si può cauare il numero
 1. però la Equatione è impossibile.

ria piu delle 8.co. che rimangono fino alle 21.co. che effe 8.co. valeriano solo 12. ch'è tanto piu
 li 13.co. piu 13. superariano le 21.co. Et discendofi la co. valere piu, cioe poniamo $1\frac{1}{13}$. questo man
 co può essere, perche le 8.co. valeriano solo 12. ch'è tanto piu del numero 13. ch'è con li ce. & oltre di
 ciò li 13.co. valeriano piu di 13.co. Et discendofi la co. valere 2. che così le 8.co. valeriano 16.
 che superano il numero 13. in 3. all'ora il ce. valeria 4. cioe 2. piu della co. onde li 13.co. supera
 riano le 21.co. in molto maggior quantita del 3. in che le 8.co. superano il numero 13. & tanto piu
 occorreria questo, quanto piu si ponesse grande il valore della co. Et ponendofi il valore della
 co. man. o a 1. poniamo $\frac{1}{13}$. accioche le 21.co. vagliano piu del numero 13. che valeranno 14. cioe 1.
 piu di numero 13. il ce. valeria $\frac{1}{13}$. onde li 13.co. valeriano piu dell' 1. che manca al numero 13.
 per arrivare al valore delle 21.co. Ne manca di $\frac{1}{13}$. può ponerfi il valore della co. perche all'ora
 li 13.co. piu 13. ammontariano piu delle 21.co.

L'istessimo siouita si vede auenire, considerando la Equatione principale di 13. & piu 13.
 E' uguale ad 8.co. piu 8.co. Che il valore della co. non può essere 1. perche all'ora l'una parte far
 ia 27. & l'altra solo 16. (che il 3. valeria 1. & similmente 1. valeria il ce.) ne manca d'1. ne piu
 d'1. come può oonferme lo Studente da se.

Et hauendo 4. & piu 7. E' uguale a 7.co. piu 4.co. facendo noi essere li dui 7. insieme, & anco li
 dui 4. insieme si ridurra a 4. & m 4.co. E' uguale a 7.co. m 7. Onde in ciascuna d'esse due quan
 tità entrara 1.co. piu 1. & ne verranno 4.co. m 4.co. Et 7.co. m 7. che faranno eguali fra loro, & acco
 modato il m sarà 4.co. piu 8. E' uguale ad 11.co. Cioe 1.co. piu $1\frac{1}{7}$. E' uguale a $2\frac{1}{7}$. co. Che la co. vale 1.
 Et anco può valere $1\frac{1}{7}$. Onde valendo 1. la co. & però 1. il ce. & 1. il 3. li 4. & piu 7. faranno 11. Et il
 medesimo 11. faranno li 7.co. piu 4.co. Ma la co. valendo $1\frac{1}{7}$. il ce. valera $3\frac{1}{7}$. & il 3. valera $5\frac{1}{7}$.
 $\frac{1}{7}$. onde 4. & piu 7. faranno $21\frac{1}{7}$. piu 7. cioe $28\frac{1}{7}$. & 7.co. piu 4.co. faranno $21\frac{1}{7}$. piu 7.
 cioe medefimamente $28\frac{1}{7}$.

1.co. piu 1. | 4. & m 4.co.
 4.co. m 4.co.
 4. &
 4. & piu 4.co.
 resta m 4.co.
 m 4.co. m 4.co.
 vi entra per m 1.co.
 Proua.

Auenimento 4.co. meno 4.co.
 Partitore. 1.co. piu 1.
 fa 4. & meno 4.co. piu 4.co. meno 4.co. cose.
 Cioe 4. & meno 4.co. che si è partito.
 4. & piu 7. E' uguale a 7.co. piu 4.co. Et come
 4. & m 4.co. E' uguale a 7.co. m 7. Et come scibifando
 4.co. m 4.co. E' uguale a 7.co. m 7. Cioe.
 4. & piu 7. E' uguale a 11.co. Cioe.
 1.co. piu $1\frac{1}{7}$. E' uguale a $2\frac{1}{7}$. co.

eguali l'uno all'altro, con alcune auuertenze ancora,
 che nel progresso si co. offeranno; all' hora in ciascuna
 parte, entrara precise 1.co. piu 1. & così scibifandoli, &
 partendoli per 1.co. piu 1. si ridurranno ad Equatione
 nota. Che per essempio; Hauendo 13. & piu 13. E' u
 li ad 8.co. piu 8.co. ciascuna d'esse due quantita si potrà
 partire per 1.co. piu 1. Che in 8.co. piu 8.co. entra pre
 cise volte 8.co. Et in 13. & piu 13. entra precise volte
 13.co. m 13.co. piu 13. Et così si hauea 13.co. m 13.co.
 piu 13. E' uguale ad 8.co. Cioe 13.co. piu 13. E' uguale a
 21.co. quale Equatione è impossibile; Et bene si cono
 sce la impossibilita considerandoci, che la co. dea valere 1.
 o piu d'1. ma 1. non può valere, perche anco il ce. valeria
 1. onde 13.co. piu 13. fariano 26. & 21.co. fariano solo
 21. Piu d'1. non può valere, poniamo $1\frac{1}{13}$. perche al
 l'ora il ce. valeria $1\frac{1}{13}$. & cioe $\frac{1}{13}$. piu della co. on
 de 13.co. fariano piu di 13.co. & anco il 13. numero fa
 ria piu delle 8.co. che rimangono fino alle 21.co. che effe 8.co. valeriano solo 12. ch'è tanto piu
 li 13.co. piu 13. superariano le 21.co. Et discendofi la co. valere piu, cioe poniamo $1\frac{1}{13}$. questo man
 co può essere, perche le 8.co. valeriano solo 12. ch'è tanto piu del numero 13. ch'è con li ce. & oltre di
 ciò li 13.co. valeriano piu di 13.co. Et discendofi la co. valere 2. che così le 8.co. valeriano 16.
 che superano il numero 13. in 3. all'ora il ce. valeria 4. cioe 2. piu della co. onde li 13.co. supera
 riano le 21.co. in molto maggior quantita del 3. in che le 8.co. superano il numero 13. & tanto piu
 occorreria questo, quanto piu si ponesse grande il valore della co. Et ponendofi il valore della
 co. man. o a 1. poniamo $\frac{1}{13}$. accioche le 21.co. vagliano piu del numero 13. che valeranno 14. cioe 1.
 piu di numero 13. il ce. valeria $\frac{1}{13}$. onde li 13.co. valeriano piu dell' 1. che manca al numero 13.
 per arrivare al valore delle 21.co. Ne manca di $\frac{1}{13}$. può ponerfi il valore della co. perche all'ora
 li 13.co. piu 13. ammontariano piu delle 21.co.

L'istessimo siouita si vede auenire, considerando la Equatione principale di 13. & piu 13.
 E' uguale ad 8.co. piu 8.co. Che il valore della co. non può essere 1. perche all'ora l'una parte far
 ia 27. & l'altra solo 16. (che il 3. valeria 1. & similmente 1. valeria il ce.) ne manca d'1. ne piu
 d'1. come può oonferme lo Studente da se.

Et hauendo 4. & piu 7. E' uguale a 7.co. piu 4.co. facendo noi essere li dui 7. insieme, & anco li
 dui 4. insieme si ridurra a 4. & m 4.co. E' uguale a 7.co. m 7. Onde in ciascuna d'esse due quan
 tità entrara 1.co. piu 1. & ne verranno 4.co. m 4.co. Et 7.co. m 7. che faranno eguali fra loro, & acco
 modato il m sarà 4.co. piu 8. E' uguale ad 11.co. Cioe 1.co. piu $1\frac{1}{7}$. E' uguale a $2\frac{1}{7}$. co. Che la co. vale 1.
 Et anco può valere $1\frac{1}{7}$. Onde valendo 1. la co. & però 1. il ce. & 1. il 3. li 4. & piu 7. faranno 11. Et il
 medesimo 11. faranno li 7.co. piu 4.co. Ma la co. valendo $1\frac{1}{7}$. il ce. valera $3\frac{1}{7}$. & il 3. valera $5\frac{1}{7}$.
 $\frac{1}{7}$. onde 4. & piu 7. faranno $21\frac{1}{7}$. piu 7. cioe $28\frac{1}{7}$. & 7.co. piu 4.co. faranno $21\frac{1}{7}$. piu 7.
 cioe medefimamente $28\frac{1}{7}$.

1.co. piu 1. | In 7.co. meno 7.
 7.co. meno 7.
 7.co.
 7.co. meno 7.co.
 resta meno 7.co.
 in m 7.co. meno 7.
 vi entra per meno 7.
 Proua.

7.co. m 7. auenimento.
 via 1.co. piu 1. partitore.
 fa 7.co. meno 7.co. piu 7.co. meno 7.
 cioe 7.co. meno 7. che si è partito.
 1. & il quadrato è $1\frac{1}{4}$.
 si caua $1\frac{1}{4}$.
 resta $\frac{3}{4}$. la x è $\frac{1}{4}$.
 quale giotta, & cauata ad $1\frac{1}{4}$. ne restano
 $1\frac{1}{4}$. & 1. che sono le due valute della cosa.
 Habbiafi

habbia 5. & 3. p. 3. *Egual* a 5. & 5. p. 3. co. Si riduce a 5. & 3. m. 5. cc. *Egual* a 3. co. m. 3. Cbe ho-
ra 1. co. m. 1. nelli 5. & 3. meno 5. cc. entr. 1. volte 5. cc. Et nel 3. co. meno 3. entr. 1. volte 3. Onde 5. cc.
sono eguali a 3. però il co. vale 3. Et la co. vale rad. 3. Il cubo valerà rad. 3. però 5. & 3. p. 3.
faranno rad. 5. & 3. Et 5. cc. p. 3. co. faranno 3. p. rad. 5. & 3. similmente. Ma intra la co. può va-
lere 1. (come si conosce vedendo che 5. & 3. numeri delli 5. & 3. da una banda sommano 8. co-
me anco il 5. & 3. numeri delli 5. cc. & 3. co. dall'altra banda, che in questi casi sono ille. & il 3.
& il 5. & 3. che vi fossero valera pure 1. Onde tanto importaria 1. quanto 1. co. 1. cc. 1. & 3. & 3.
& però il 5. & 3. p. 3. importano 8. come anco 5. cc. p. 3. co.

habbia 5. & 3. p. 3. cc. *Egual* a 3. co. p. 5. Qui la co. vale 1. ma usando il modo detto, si ridurrà
a 5. & 3. meno 5. cc. *Egual* a 3. co. meno 3. cc. Di queste il Residuo 1. co. meno 1. entraria nell'una
quantità 5. & 3. meno 5. che vi entra per volte 5. cc. p. 5. co. p. 5. ma non può entrare nell'altra 3. cc.
meno 3. cc. perche in essa il meno è il co. maggiore dignità, ma nel partitore 1. co. fa m. 1. il meno è il
numero minore dignità, anzi è privo di denominatione.

In esso 3. co. meno 3. cc. entraria bene 1. meno 1. co. & v'entra per volte 3. co. (che 3. co. via 1.
meno 1. co. fa 3. co. meno 3. cc.) ma questo 1. meno 1. co. non può poi entrare in 5. & 3. meno 5. entraria
bene in 5. meno 5. & 3. che v'entra per volte 5. p. 5. co. p. 5. cc. Et così bauendo 5. meno 5. & 3. *Egual*-
a 3. co. meno 3. cc. che derivaria da 3. cc. p. 5. *Egual* a 5. & 3. p. 3. co. si peruerria a 5. cc. p. 5. co. p. 5.
Egual a 3. co. cioè a 5. cc. p. 2. co. piu 5. *Egual* a 0. che è impossibile. Et pur si vede, che 5. & 3. piu
3. co. possono essere eguali a 3. cc. piu 5. & 3. che la co.
vale 1. & così 1. vale il co. & 1. vale il 3. (il che oc-
corre come s'è detto, quando il 5. & 3. numeri dello
quantità da una banda sono eguali a 5. & 3. nu-
meri delle quantità dall'altra banda, cioè che la
somma 8. da una banda è quanto la somma 8. dal-
l'altra, onde bauendo 7. & 3. piu 4. *Egual* a 5. cc. piu
6. co. perche 7. & 4. fa 11. come a co. 5. & 6. la co. va-
lerà 1. Et quando anco le quantità da una ban-
da, fossero piu che le quantità dall'altra, pare che
la somma de i numeri da una banda, sia eguale al-

1. meno 1. co. fa. In 5. meno 5. & 3.
5. piu 5. co. piu 5. cc.
5.
5. meno 5. co.
5. co. meno 5. & 3.
5. co. meno 5. cc.
5. cc. meno 5. & 3.
5. cc. meno 5. & 3.

la somma de numeri dall'altra, pure la co. valerà 1. & però il 3. il 3. il 4. il 5. & ogn'altra deno-
minatione che vi fosse valerà 1. & faranno come si fossero semplici numeri senza denomi-
ne; Onde dicendosi, 1. & 3. piu 3. & 3. cc. piu 8. & 3. è eguale a 5. & 3. piu 1. & 3. piu 6. & 3. co. piu 1. doue la
somma de i numeri da ciascuna banda è un medesimo 13. & 3. si vede che il valore della co. può es-
sere 1. Potrà forse anco hauere altra valuta, che di sopra doue si baua 4. & 3. piu 7. *Egual* a 7. cc.
piu 4. co. & ciascuna delle due somme era 11. & però la co. potreu valere 1. vedessimo che ella
ualeua anco 1. & 3. circa che si può auertire, che valendo 1. la co. il partitore 1. co. meno 1. faria 1.
meno 1. cioè 0. & la quantità da partire 5. & 3. meno 5. faria 5. meno 5. cioè 0. & perche 0. in 0. en-
tra quante volte si vuole, cioè 0. nessuna volta, 0. 5. volte, 0. 10. volte, 0. altro numero di volte; poiche
qual si voglia di questi anchimenti, moltiplicato con il partitore 0. produce 0. che è la quantità par-
tita, però non è marauiglia se a partire 5. & 3. meno 5. che è 0. per 1. co. meno 1. che è niente ne viene 5.
piu 5. co. piu 5. cc. cioè non è marauiglia, che a partire 0. per 0. ne venga 5. p. 5. co. piu 5. cc. benchè
pata, che ne doueria venire similmente 0. poiche si può dire, che non venga che auenimento si vo-
le, cioè che come s'è detto, 0. in 0. entra quante volte si vuole, che quel numero di volte auenimento
moltiplicato per 0. partitore fa pur 0. che è la quantità partita, ma perche ne venga mò piu 5. piu
5. co. piu 5. cc. (che valendo la co. niente, faria 5. piu 0. piu 0. cioè 5.) che altra quantità, 0. niente,
occorrere, perche essendo la mirabile, & artificiosissima Dottrina Algebratica tale, che hà risguard
ad ogni cosa, che possa auenire, ella fa essere l'auenimento tale, che sia il partitore quello che si
voglia, & però vaglia la co. 0. qu. Et 1. che può valere, 0. quel piu d'1. che si voglia, l'istesso auenimento
sia sempre a proposito; Onde se poniamo, che la co. vagli 2. il partitore 1. co. meno 1. farà 2. meno
2. cioè 1. & la quantità da partire 5. & 3. meno 5. farà 40. meno 5. cioè 35. che però (perche 1. in 35.
entra volte 35.) l'auenimento douerà essere 35. & ben si vede, che l'auenimento Algebratico 35.
piu 5. co. piu 5. cc. è 5. piu 10. piu 20. cioè 35. come bisogna. Et se la co. vagli poniamo 7. il partit-
ore 1. co. menor, farà 7. meno 1. cioè 6. La quantità da partire 5. & 3. meno 5. farà 1715. meno 5. cioè
1710. Et l'auenimento 5. piu 5. co. piu 5. cc. farà 5. piu 35. piu 245. cioè 285. come è a punto quel-
lo, che nasce a partire 1740. per 6. che è pure 285. Et così occorre a qual si voglia altra valuta
della cosa.

Si può anco notare, che di sopra in 3. co. meno 3. cc. doue non entra 1. co. meno 1. si viene a suppo-
nere, che la co. vagli piu d'1. accioche 1. co. meno 1. sia qualche cosa, ma all'hora 3. co. meno 3. cc.
saria

faria manco di niente, perche si ce. valeria piu della co. & 3. ce. da enuare faria no piu di 3. co. Et
 cosi il partitore qualche cosa non potria entrare in quantita, che sia manco di niente (come anco
 non puo entrare in niente, potria ben in 3. co. meno 3. ce. entrare 1. m. 1. co. & d'entraria per vol
 te 3. co. ma cosi conuerria supponere che la co. vagli manco d'1. accioche esso partitore 1. m. 1. co. sia
 qualche cosa, & che anco 3. co. meno 3. ce. sia pure qualche cosa, cioe che il ce. vagli manco che la co.
 Et si al hora la quantita eguale a queste 3. co. meno 3. ce. fusse 5. meno 5. 3. che saria pure quanti
 ta reale, poiche 1. 3. saria manco d'1. all' hora par
 tendo quello 5. meno 5. 3. piu l'1. meno 1. ne verria
 5. piu 5. co. piu 5. ce. Il che sara eguale all'altro
 auenimento, che 3. co. Onde si pererra a 5. piu 5.
 co. piu 5. ce. eguale a o. Il che e impossibile, cioe qua
 le Equatione e impossibile, & pure sappiamo, che
 quando 5. meno 5. 3. sono eguali a 3. co. meno 3. ce.
 Cioe che 5. piu 3. ce. sono eguali a 3. co. piu 5. 3. la co.
 vale 1. perche pare, che l'Algebra non facci cossi
 suo di trovare il vero valore dell'co. che pure
 e 1. poiche non solo non si troua quel 1. ma si per
 uenire ad Equatione impossibile, cioe di 5. piu 5. co. piu 5. ce. Eguale a o. perche noti l'accorto stu
 dente, che anzi di qui si forge la maranigliosa integrita, & realita della Scienza, poiche ella no
 puo tollerare alcuno inconueniente, ne impossibilita ne seruirsi di mezzo inconueniente, o impossi
 bile per trouare il vero, cossi come le persone da bene, o Virtuosi non si seruono di mezzi indiretti,
 o vistosi o vitiati per acquistare ricchezze, bonori, sanita, o dottrina, o altra cosa per se stessa buo
 na; Onde nell'Equatione di 5. 3. piu 5. co. Eguale a 3. co. piu 5. douendo essere 1. la valuta della
 co. potendo essere manco d'1. (perche all' hora 5. 3. piu 3. co. fariano manco di 3. ce. piu 5. (po
 che se bene 3. ce. fariano manco di 3. co. & pero sara uo manco di 3. che gioto a 5. saria manco di 8.
 come anco manco di 8. fariano li 5. 3. piu 3. co. piu saria quello, che mancaria alli 5. 3. piu 3. co. ad
 arriuare ad 8. che quello che mancaria a 3. ce. piu 5. ad arriuare ad 8. o cogliamo dire, che quello
 che mancaria a 3. co. ad arriuare a 3.) non nel pigliare per partitore 1. meno 1. co. veniamo a sup
 ponere che la co. vagli manco d'1. accioche 1. co. si possa cauere d'1. & resti qualche cosa per par
 titore, & perche questo supposito e impossibile, di qui e che l'Algebra mediante esso supposito im
 possibile, ci riduira apoc ad una Equatione impossibile, cioe di 5. piu 2. co. piu 5. ce. Eguale a o.
 come s' e visto; Anzi a punto da questa Equatione impossibile, conuolendo il supposito, o parti
 tore, preso essere impossibile, veniamo a chiarirli, che la co. non puo ualere manco d'1. come biso
 gnaria che ualeste a valore che 1. meno 1. co. fusse quantita reale.

$$\begin{array}{r}
 1. \text{ meno } 1. \text{ co.} \quad \text{In } 5. \text{ meno } 5. 3. \\
 \hline
 5. \text{ piu } 5. \text{ co. piu } 5. \text{ ce.} \\
 \hline
 5. \text{ meno } 5. \text{ co.} \\
 \hline
 \text{resta } 5. \text{ co.} \\
 \hline
 5. \text{ co. meno } 5. 3. \\
 \hline
 5. \text{ co. meno } 5. \text{ ce.} \\
 \hline
 \text{resta } 5. \text{ ce. meno } 5. 3.
 \end{array}$$

Ancora perche bauendo pure 5. 3. piu 3. co. Eguale a 3. ce. piu 5. Questa Equatione non solo
 si puo ridurre a 5. meno 5. 3. Eguale a 3. co. meno 3. ce. come si e fatto di sopra, ma anco a 3. co.
 meno 3. co. Eguale a 5. 3. meno 5. ciascuna delle quali parti si puo partire per 1. co. meno 1. che
 ne risultano due auenimenti 3. co. Et 5. ce. piu 3. co. piu 3. ce. fusse che nell'altro, cioe 5. ce. piu 2.
 co. 5. Eguale a o. Equatione impossibile, et fa pure accorti l'Algebra, che anco questo supposito e
 impossibile, cioe che il partitore possa essere 1. cosa in 1. Et parebbe manco puo essere 1. meno 1.
 cosa come s' e uisuto, pare che verament: la Equatione di 5. 3. piu 3. co. fusse. Eguale a 3. ce. piu
 5. sia impossibile, poiche essendo modi pure inconuenienti, & secondo l'Arte si peruen
 ad Equationi impossibili. Onde noti l'accorto Studente, che considerando li due partitori o
 sia meno 1.

$$\begin{array}{r}
 5. 3. \text{ piu } 3. \text{ co.} \quad \text{Eguale a } 3. \text{ ce. piu } 5. \\
 \hline
 \text{Situazione in} \\
 5. 3. \text{ meno } 5. \quad \text{Eguale a } 3. \text{ ce. meno } 3. \text{ co.} \\
 \hline
 \text{Quero in} \\
 5. 3. \text{ meno } 5. \text{ ce.} \quad \text{Eguale a } 5. \text{ meno } 3. \text{ co.} \\
 \hline
 \text{Quero in} \\
 3. \text{ co. meno } 3. \text{ ce.} \quad \text{Eguale a } 5. \text{ meno } 5. 3. \\
 \hline
 \text{Quero in} \\
 3. \text{ co. meno } 5. \quad \text{Eguale a } 3. \text{ ce. meno } 5. 3.
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1. \text{ co. piu } 1. \quad \text{In } 3. \text{ ce. meno } 3. \text{ co.} \\
 \hline
 \text{Auenimento} \quad 3. \text{ co. meno } 3. \\
 \hline
 5. \text{ ce.} \\
 \hline
 3. \text{ co. piu } 3. \\
 \hline
 \text{resta } 1. \\
 \hline
 3. \text{ co. m. } 3. \\
 \hline
 5. \text{ ce. m. } 4. \text{ co.} \\
 \hline
 \text{resta } 5. \text{ co. meno } 5. \text{ doue il parti} \\
 \text{tore non puo entrare.} \\
 \hline
 \text{sia } 1. \text{ co. meno } 1. \quad \text{In } 5. 3. \text{ meno } 5. \\
 \hline
 \text{Auenimento } 5. \text{ ce. piu } 5. \text{ co. piu } 5.
 \end{array}$$

3.co. più 1. In 3.ci. meno 3.40.
Auenimento. 3.co. meno 3.

3.co.
3.co. più 3.
resta m 3.
m 3.co. m 3.
m 3.co m 3.

Ancora vi può entrare 1.co. meno 1. che v'entra per volte 3.co.

Però si bauerà 3.co. Eguale a 5.co. più 5.co. più 5.cioè 0. Eguale a 5.co. più 2.co. più 5. la quale Equatione è impossibile.

zione impossibile, ciò ci fa accorgere, che la co. non può valere né più d'1. né manco d'1. perche è che la co. vale dunque precise 1. & che la Equatione principale è veramente impossibile (poiche ad essere impossibile conuerria concludere, che la co. non ualeffe né 1. né più né manco d'1.) ordremo dunque se la co. possa valere 1. dicendo. Valendo 1. da co. li 5.3. più 3.co. importariano 8. Et però se li 3.co. più 5. importino anch'essi 8. il valore della co. sarà 1. ma importano a punto 8. però la co. vale 1. Et ben si vede, che così ancora 5. meno 5.3. faria eguale a 3.co. meno 3.co. poiche l'uno sarà 5. meno 5. cioè 0. & l'altro 3. meno 3. cioè pure 0. & anco così 3.co. meno 3.co. sarà pure eguale a 5.3. meno 5. poiche l'uno sarà 3. meno 3. cioè 0. & l'altro sarà 5. meno 5. cioè pure niente. Onde siamo sicuri che la co. vale 1. ma che non può valere né più né manco d'1. cioè che essa non può bauerne più d'una valuta. Che alle volte può bauerne due valute come si vide nell'Equatione di 4.3. più 7. Eguale a 7.co. più 4.co. douè la co. vale 1. Et anco può valere 1.

4.3. più 7. Eguale a 7.co. più 4.co.
7.co. meno 1. 4.3. meno 4.co. Eguale a 7.co. meno 7.
4.co. più 4.co.
4.3.
4.3. meno 4.co.
resta 4.co.
4.co. meno 4.co.

Sarà 4.co. più 4.co. Eguale a 7.co. più 7.
cioè 4.co. Eguale a 3.co. più 7.
Cioè 1.co. Eguale a $\frac{1}{2}$. co. più 1.
la metà di $\frac{1}{2}$. & il suo quadrato $\frac{1}{4}$. giunto al num. 1. fa $1\frac{1}{4}$.
cioè $1\frac{1}{4}$. la sua radice $1\frac{1}{2}$. cioè $1\frac{1}{2}$. che con $\frac{1}{2}$. metà del numero
della cosa $\frac{1}{2}$. per il valore della cosa.

eguale a co. & numero, ha solo una valuta della co. però con essa si troua solo la valuta 1. Che nell'altra di 4.co. più 7. Eguale a 11.co. che può bauerne due valute si troua. & questa valuta 1. & anco la valuta 1. Et perche tanto conuiene che vagli la co. nell'Equatione di 4.co. più 7. Egual ad 11.co. quanto nell'Equatione di 4.co. Eguale a 3.co. più 7. poiche la valuta della co. da loro mostrata, degg'essere la valuta della co. nell'Equatione di 4.3. più 7. Eguale a 7.co. più 4.co. potiamo anco considerare, che cauando 7. da ciascuna parte, nella prima Equatione baueremo 4.co. eguale ad 11.co. meno 7. ma per la seconda Equatione sappiamo, che 4.co. sono eguali a 3.co. più 7. però a queste 3.co. più 7. saranno eguali le 11.co. meno 7. Cioè 8.co. a 14. & però la cosa valera 1.

Ancora essa Equatione di 4.3. più 7. Eguale a 7.co. più 4.co. Cauando 7.co. da ciascuna parte si ridurrà a 4.3. più 7.co. meno 7.co. Eguale a 4.co. & anco cauando 4.3. da ciascuna parte si ridurrà a 7. meno 7.co. Eguale a 4.co. meno 4.3. & ciascuna d'essi si potrà partire per 1. meno 1.co. che ne verrà 7. più 7.co. Eguale a 4.co. più 4.co. Cioè 7. più 3.co. Eguale a 4.co. come di sopra, & la co. valera pure 1. come di sopra.

Ma hauendo detto il partitore essere 1. meno 1. cosa, & trouando la co. valere $1\frac{1}{2}$. pare che il partitore sia impossibile, cioè non si possa dire 1. meno $\frac{1}{2}$. perche faria meno $\frac{1}{2}$. il che faria vero quan-

Et 1. meno 1.co. Accioche essi siano quantità reale. cioè che significino qualche cosa; nell'1.co. m 1. conuerria che la co. importasse più d'1. accioche d'esso valore si potesse equare l'1. & se fosse qualche cosa; Et nell'1.co. meno 1. conuerria che la co. importasse manco d'1. accioche cauandolo dall'1. restasse qualche cosa; cioè cō essi partitori douendo essere quantità reale, si viene in l'uno a supporre che la cosa vagli più, & nell'altro, che la co. vagli manco d'1. & perche cō ciascuno d'essi supposti, il partitori, si peruenne ad Equatione di 4.3. più 7. Eguale a 7.co. più 4.co. douè la co. vale 1. Et anco può valere 1.

Et si può notare che in questa Equatione di 4.3. più 7. Eguale a 7.co. più 4.co. che si riduce a 4.3. meno 4.co. Eguale a 7.co. meno 7. il partitore può anco essere 1. cosa meno 1. che li aumenti faranno 4.co. più 4.co. & 7.co. più 7. eguali fra loro, che si ridurrà a 4.co. eguale a 3.co. più 7. & la cosa valera $1\frac{1}{2}$. come anco si trouò quando si ridusse a 4. cenfi più 7. eguale ad 11.co. & a questa Equatione di 4.co. eguale a 3.co. più 7. cioè di cenfi

4. co. piu 7. Eguale a 11. co. se.
 4. cenfi. Eguale a 3. co. piu 7.
 e auuando 7. da ciascuna parte di sopra si bauerà.
 4. cenfi. Eguale a 11. co. meno 7.
 ma 4. co. di sotto è anco Eguale a 3. co. piu 7. però.
 4. co. meno 7. Eguale a 3. co. piu 7.
 Cioè 8. co. Eguale a 14.
 però 1. co. vale 4.

1. meno 1. co.	7. meno 7. ce.	4. co. meno 4. t.
7. piu 7. co.	4. co. piu 4. ce.	
7.	4. co.	
7. meno 7. co.	4. co. meno 4. ce.	
resta 7. co.	resta 4. ce.	
7. co. meno 7. ce.	4. ce. meno 4. t.	

Et il ce. 3. $\frac{1}{10}$. Et il 3. $\frac{1}{10}$. ben si vede, che 7. meno 7. ce. è 7. meno 21. $\frac{1}{10}$. cioè meno 14. $\frac{1}{10}$. similmente; Che a partire qual si voglia d'essi per 1. meno 1. co. cioè per 1. meno 1. $\frac{1}{10}$. ch'è meno $\frac{1}{10}$ ne viene 19. $\frac{1}{10}$. Cioè meno 1. $\frac{1}{10}$ in meno 14. $\frac{1}{10}$. entra volte 19. $\frac{1}{10}$. Et piu significando 7. piu 7. co. ouero 4. co. piu 4. ce. che sono li due auuenimenti detti; Et ben si vede, che 7. piu 7. co. è 7. piu 12. $\frac{1}{10}$. cioè 19. $\frac{1}{10}$. Et che anco 4. co. piu 4. t. è 7. piu 12. $\frac{1}{10}$. cioè similmente 19. $\frac{1}{10}$.

Et dicendosi 4. 3. piu 7. cenfi sono eguali a 7. co. se piu 4. pure anco si vede la cosa valere 1.

7. co. piu 1.	In 4. 3. meno 4.	In 7. co. meno 7. ce.
	4. ce. meno 4. co.	7. meno 7. co.
	4. 3.	7. co.
	4. 3. piu 4. ce.	7. co. piu 7.
	resta meno 4. ce.	resta meno 7.
	meno 4. ce. meno 4.	meno 7. ce. meno 7. co.
	meno 4. ce. meno 4. co.	resta 7. co. meno 7.
	resta 4. co. meno 4.	due non entra.
	due non entra.	

1. co. a meno 1.	In 4. 3. meno 4.	In 7. co. meno 7. ce.
Ne viene.	4. ce. piu 4. co. piu 4.	7. meno 7. co.
	4. 3.	7. co.
	4. 3. meno 4. ce.	7. co. meno 7.
	resta 4. ce.	resta 7.
	4. ce. meno 4.	7. meno 7. ce.
	4. ce. meno 4. co.	7. co. meno 7. ce.
	resta 4. co. meno 4.	resta 7. meno 7. co.
		due non entra.

1. meno 1. co. In 4. 3. meno 4. non può entrare, Ma in 7. co. si può notare, che in questa Equatione di 4. 3.

piu 4. ce. Eguale a 7. co. piu 7. si vede che tal conuenienza ha la prima parte 4. 3. dell'una alla prima parte 7. co. dell'altra, quale la seconda 4. ce. alla seconda 7. co. perché scibando 4. 3. Et 7. co. per 1. co. ne risulta 4. ce. Eguale a 7. Onde in tal caso basta ad eguagliare una sola parte dell'una alla sua corrispondente parte dell'altra, cioè 4. ce. a 7. co. che la co. ualeua rad. 1. $\frac{1}{10}$. così in questa semplice Equatione di 4. ce. Eguale a 7. co. come nella composta detta. Et hauendo 5. 6. piu 7. 3. Eguale a 20. 4. piu 28. co. perche scibando 7. 3. Et 28. co. per 7. ne viene 1. ce. Eguale a 4. Et scibando 7. 3. Et 28. ce. per 7. co. ne viene pure 1. ce. Eguale a 4. onde tal proportionione ha 5. 6. a 20. 4. quale 7. 3. a 28. co. Cioè 5. 6. a 7. 3. 28. co. sono quattro quantità proportionali (il che si conosce anco dal moltiplicare

quando la quantità che si parte fusse piu; poiche dicendosi gl'auuenimenti essere 7. piu 7. co. Et 4. co. piu 4. ce. ciascuno delli quali è piu, ne seguiria, che a moltiplicare l'auuenimento piu, con il partitore: meno il prodotto fusse piu; il che non può essere; Ma anzi perché essi auuenimenti sono piu, Et il partitore è meno, che moltiplicato fra loro fanno meno, veniamo a conoscere, che ciascuna delle due quantità partite, cioè 7. meno 7. ce. Et 4. co. meno 4. t. è meno, cioè che 7. ce. sono piu di 7. Et similmente, che 4. t. sono piu di 4. co. il che auuenendo è necessario, che la co. vagli piu di 1. Et però il ce. piu di 1. Et il 3. piu della co. Et perché la co. vale 1. $\frac{1}{10}$. Et

ma riducendosi a 5. 3. meno 4. Eguale a 7. co. se meno 7. ce. non si vede, che vi entri alcuna di questi partitori. Et dicendosi 4. 3. piu 4. ce. sono eguali a 4. co. piu 4. co. che pure si vede la co. ualere 1. si potrà partire ciascuna delle due quantità per 4. co. piu 4. ce. ne verrà 4. ce. Eguale a 4. co. cioè 1. ce. Eguale a 1. però il ce. vale 1.

Et dicendosi 4. 3. piu 4. ce. sono eguali a 7. co. piu 7. si potrà partire ciascuna quantità per 1. co. piu 1. Et ne ne viene 4. ce. Eguale a 7. co. 1. cenfo. Eguale a 1. $\frac{1}{10}$. però il ce. ualerà 1. $\frac{1}{10}$. Et il 3. ualerà rad. 5. $\frac{1}{10}$. onde 4. 3. piu 4. ce. saranno rad. 8. 5. $\frac{1}{10}$. piu 7. Et 7. co. piu 7. saranno rad. 8. 5. $\frac{1}{10}$. piu 7. similmente.

Et si può notare, che in questa Equatione di 4. 3. piu 4. ce. Eguale a 7. co. piu 7. si vede che tal conuenienza ha la prima parte 4. 3. dell'una alla prima parte 7. co. dell'altra, quale la seconda 4. ce. alla seconda 7. co. perché scibando 4. 3. Et 7. co. per 1. co. ne risulta 4. ce. Eguale a 7. Onde in tal caso basta ad eguagliare una sola parte dell'una alla sua corrispondente parte dell'altra, cioè 4. ce. a 7. co. che la co. ualeua rad. 1. $\frac{1}{10}$. così in questa semplice Equatione di 4. ce. Eguale a 7. co. come nella composta detta. Et hauendo 5. 6. piu 7. 3. Eguale a 20. 4. piu 28. co. perche scibando 7. 3. Et 28. co. per 7. ne viene 1. ce. Eguale a 4. Et scibando 7. 3. Et 28. ce. per 7. co. ne viene pure 1. ce. Eguale a 4. onde tal proportionione ha 5. 6. a 20. 4. quale 7. 3. a 28. co. Cioè 5. 6. a 7. 3. 28. co. sono quattro quantità proportionali (il che si conosce anco dal moltiplicare

care

giore 1. r. peruerremo pure alla istessa Equatione di 1. z. p. 1. Eguale a 4. z. done la z. vale 2. p. 3. ouero 2. m. 3. delle quali due valute hora la minore, cioè 2. m. 3. ch'è manco d'1. sarà al no- stro proposito, ponendosi la z. essere il numero minore, quando la vnità cioè 1. sia il maggiore. Che nella prima posizione doue si suppone d'essi dui numeri il minore essere 1. & il maggiore 1. z. diremo la z. valere 2. p. 3. ch'è la sua valuta maggiore nella Equatione detta; Et così sap- piamo, che il numero maggiore al minore è come da 2. p. 3. ad 1. cioè ha la proportionē, ch'è da 2. p. 3. ad 1. (Ouero che il minore al maggiore è come da 2. m. 3. ad 1. cioè ha la propor- tione, ch'è da 2. m. 3. ad 1.) Il che conosciuto ci ridurremo a fare hora qu. l'altro quesito; di- cendo. Trouinsi dui numeri d'quantità nella proportionē di 2. p. 3. ad 1. tali che la somma lo- ro moltiplicata nella somma de' quadrati loro facci 20. Ouero Trouinsi dui numeri nella pro- portionē di 2. p. 3. ad 1. (o d'1. a 2. m. 3. ch'è la istessa) tali che la differenza loro moltiplica- ta, nella differenza de' quadrati loro facci 10. Et per hora stando nel primo quesito di trovare due numeri nella proportionē di 2. p. 3. ad 1. tali che la somma loro moltiplicata nella somma de' quadrati loro facci 20. poneteremo il minore essere 1. co. & il maggiore (2. p. 3. 31) z. (qui mò il Cardano segue a trouare i quadrati loro, ma del maggiore dice per errore di caleolo egli esse- re (7. p. 3. 24.) z. il che non è, & perciò peruenendo a (24. p. 3. 72. p. 3. 192. p. 3. 216.) z. eguali a 20. dice che partito il 20. per essa quantità de' cu. la B. cuba vniuersale (o le gale) dell'aumenimēto sarà il numero minore (posto 1. z.) & qui finisce; ma noi operando diligentemente, trouaremo esso vero numero, d'quantità minore, & anco la maggiore; onde posto il minore 1. & il maggiore 2. p. 3. z. i loro quadrati faranno 1. z. & (7. p. 3. 48.) z. la somma d'essi quadra- ti (8. p. 3. 48.) z. & questa moltiplicata per (3. p. 3. 31.) z. fa (36. p. 3. 432. p. 3. 192. p. 3. cu. cioè (36. p. 3. 1200.) cu. il che è eguale a 20. & schifando per 4. farà (9. p. 3. 75.) cu. eguale a 5. per il che partendo 5. p. 9. p. 3. 75. quantità de' cu. (che moltiplicati per il suo residuo 9. m. 3. 75. fa 6. partitore semplice, & anco moltiplicato il 5. per l'istesso residuo fa 45. m. 3. 1875.) cioè partēdo 45. m. 3. 1875. per 6. & ne viene 7. 1/2. m. 3. 52 1/2. questo è il valore d'1. cu. onde la z. ch'è B. cuba d'1. cu. valerà la B. cuba d'esso auenimento, cioè valerà B. C. L. 7 1/2. m. 3. 52 1/2. 7. & questa sarà la minor quantità posta 1. cosa.

Et se stando nel secondo quesito, cioè dicendo. Trouinsi due quantità nella proportionē di 2. p. 3. ad 1. tali che la differenza loro moltiplicata nella differenza de' quadrati loro facci 10.

Posta pure la minor quantità 1. z. & la maggiore (2. p. 3. 31.) z. che i loro quadrati sono 1. z. & (7. p. 3. 48.) z. la differenza de' quali è (6. p. 3. 48.) z. questa moltiplicata via (1. p. 3. 1.) z. ch'è la differenza delle due quantità fa (18. p. 3. 108. p. 3. 48.) cu. cioè 18. p. 3. 100. cu. il che è eguale a 10. & schifando per 2. si riduce a 9. p. 3. 75. cu. eguale a 5. come di sopra. per il che pure la z. vale B. C. L. 7 1/2. m. 3. 52 1/2. 7. & è la minor quantità. & per trouare la maggiore moltiplicheremo questa per 2. p. 3. cioè per r. c. L. 26. p. 3. 675. 7. che fa B. C. L. 7 1/2. p. 3. 52 1/2. 7. Onde le due quan-

2. piu r. 3.	r. 675. via m. r. 5 1/2. 7.	26. via m. r. 52 1/2. 7.	r. 675. via 7 1/2.
via 7. piu r. 48. suo quad.	421875. 12. c. fini	r. 676.	r. 36 1/2.
fa 26. piu r. 675. suo cubo.	140625. 4.	56 1/2.	168 1/2.
r. c. L. 26. piu r. 675. 7.	3 7 5 2.	1352	4050
via r. c. L. 7 1/2. m. r. 52 1/2. 7.	50	3380	3375
prodotto r. c. L. 195. m. 187 1/2.	37	fa m. r. 3520 8 1/2. far. 37868 1/2.	
piu rad. 37968 1/2. m. r.	fa m. 187 1/2.	42250 0 12	455625. 12.
35208 1/2. 7. Cioe		6 3 0	6 7 5
r. c. L. 7 1/2. piu r. 52 1/2. 7.			
Quadrati r. c. L. 7 1/2. piu r. 52 1/2. 7.			
r. c. L. 7 1/2. piu r. 52 1/2. 7.			
56 1/2.	r. 52 1/2.		
52 1/2.	via r. 225.		
108 1/2.	far. 11718 1/2.		
Il quad. è r. c. L. 108 1/2. piu r. 11718 1/2. 7.			

r. 1/2. entra in questa volte m. 650. & in quest'altra volte 675. però nella dif- ferenza, cioè in quello che resta a ca- nuare la m. minore dalla maggiore, en- trerà volte 25. onde 25. cioè r. 625. via r. 1/2. fa r. 52 1/2. 7. ch'è il restāte, cioè ch'è la somma d'essi due quantità, d' vogliamo dire, ch'è il valore dirad. 37868 1/2. m. rad. 35208 1/2.

tirā faranno r. c. L. 7 1/2. piu r. 52 1/2. 7. & r. c. L. 7 1/2. m. r. 52 1/2. 7. Et i loro quadrati faranno r. c. L. 108 1/2. piu r. 11718 1/2. 7. Et r. c. L. 108 1/2. meno r. 11718 1/2. 7. Potiamo hora per sodisfare a gl

Moltiplichi 18.pia r.300.

via $7\frac{1}{2}$ mtr. $52\frac{1}{2}$
135. men. r. 15625.
meno 125. 125.
fa 10. come bisogna.

r.300.	r.324.
via r. 56. $\frac{1}{4}$.	via men. r. 52. $\frac{1}{4}$.
fa r. 16875.	fa men. r. 16875.

r.c. 7 $\frac{1}{2}$. meno r. 5 $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$ via r. 48. piu 6. Et quello prodotto sarà la differenza de' quadrati delle due quantità. Onde moltiplicando r.c. 7 $\frac{1}{2}$. meno r. 5 $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$ via r.c. 7 $\frac{1}{2}$. meno r. 5 $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$ via r. 48. piu 6. (ch'è quanto moltiplicare il minor quad. via r. 48. piu 6.) il prodotto sarà la differenza de' duj quad.

Anora per euaire la minor quantità dalla maggiore, consideremo che la minore entra nella maggiore volte 2. piu r. 3. però ella entrará nella differenza loro vna volta manco, cioè volte 1. piu r. 3. Onde multiplicando essa minore r. c. L. $7\frac{1}{2}$. meno r. $52\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. via r. 3. piu 1. il prodotto farà la differenza delle due quantità, che multiplicata via la differenza de' loro quadrati, cioè via r. c. L. $7\frac{1}{2}$. meno r. $52\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. via r. c. L. $7\frac{1}{2}$. meno r. $52\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. via r. 48. piu 6. deu fare 10. ma di queste 5. quantità, che multiplicata insieme deuono produrre 10. le 3. r. L. multiplicata insieme fanno 7. $\frac{1}{2}$. meno r. $52\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. (cioe il cubo di r. c. L. $7\frac{1}{2}$. meno r. $52\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. che a multiplicare tre quantità eguali fra loro, il prodotto è il cubo d'una d'esse, onde a multiplicare r. c. L. $7\frac{1}{2}$. meno r. $52\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. via r. c. L. $7\frac{1}{2}$. meno r. $52\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. via r. c. L. $7\frac{1}{2}$. meno r. $52\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. il prodotto è il cubo di r. c. L. $7\frac{1}{2}$. meno r. $52\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. ma il cubo d'una r. cuba è il numero 8. quantità d'essa, libera dalla denominazione di r. cuba, però haueremo r. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. r. $52\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.) Et l'altre due r. 48. piu 6. & r. 3. piu 1. fanno, ò producono 18. piu r. 3. 00. quale multiplicato via l'altro prodotto detto $7\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. r. $52\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. fa 10. come bifogna, però siano chiari, che la differenza delle due quantità trouate, multiplicata nella differenza de' quadrati loro fa 10.

Anora le delle 7. quantità dette, moltiplicheremo il prodotto delle due r. 48. piu 6. via r. 3. piu 1. qual prodotto è 18. piu r. 300. via il prodotto di due dell'altre, eh'è rad. cuba L 108 $\frac{1}{3}$. men. rad. 1718 $\frac{1}{3}$. 7 (il quad. cioè di rad. cuba L 7 $\frac{1}{3}$. meno rad. 52 $\frac{1}{3}$. 7) & il prodotto di quello 4. (quale è rad. cuba L 1300. piu rad. 300000. 7 moltiplicheremo per l'altra quinta che rimane, quale è rad. cuba L 7 $\frac{1}{3}$. meno rad. 52 $\frac{1}{3}$. 7 il prodotto vedremo essere il 10. istesso che conuiene. Quale operazione si è fatta in margine, accioche gli Studenti si facciano esperti, & sappiino operare, in esse facilmente, & con breuità.

Cubiffi 18.piu rad.300.
il quad.è 624.piu rad.300.volte 36

11232	648
10800	614
<u>22032</u>	<u>1272</u>
	1272
	R.1617984
	via R.100

r. e. L 22033. piu rad. 483395200	r. j. entra in qlla r. volte 10. via 1272. e cioè volte 12720
via r. e. L 108 1/2. meno rad. 11718 1/2	r. j. entra in questa r. volte 62 1/2. via 62 1/2
176336	3906 1/2
21033	62 1/2
7344	30
2386800	62 1/2. però il quad di r. j. entra nel prodotto d'effe r. volte 795000
mc. 2385000	onde moltiplicato per 3. fa 2385000. & questo è il prodotto
1800	d'effe rad. & è meno - offenda delle produzioni rad. l'una più

108 $\frac{1}{2}$. via 12710. via r. 3. & è piu.

$$\begin{array}{r} 108\frac{1}{2} \\ \hline 10176 \\ 12710 \\ \hline 4240 \end{array}$$

Cioe 1378000. via rad. 3. & è piu
1377000.

la differenza è 1000 via r. 3. & fa r. 3000000. & è piu.

il prodotto è r. c. L 1800. piu r. 3000000

da moltiplicare via r. c. L 7 $\frac{1}{2}$. m. r. 51 $\frac{1}{2}$. 7

$$\begin{array}{r} 116 \quad 156250000 \\ \hline 900 \\ 13500 \quad 12500 \\ \hline \text{meno } 12500 \\ \hline 1000 \end{array}$$

12031. via 62 $\frac{1}{2}$. via r. 3. & è meno.

$$\begin{array}{r} 12031 \\ 62\frac{1}{2} \\ \hline 44064 \\ 11192 \\ \hline 11016 \end{array}$$

Cioe 1378000. via rad. 3. & è meno.

r. 3240000

via meno r. 51 $\frac{1}{2}$.

$$\begin{array}{r} 27 \\ 16848 \\ \hline \text{fa meno r. } 168750000 \\ \hline r. 3000000 \\ \hline \text{via r. } 56\frac{1}{2} \\ \hline \text{fa rad. } 16875000 \end{array}$$

fa radice cuba L 1000. 7 cioè 10. come bisogna.

Ancora se la maggior quantità alla minore ha la proportion di 3. pin rad. 3. ad 1. Quando la maggiore fusse 1. la minore faria 2. meno r. 3. (che se 2. piu rad. 3. douenta 1. all' hora 1. douentaria 2. meno rad. 3. cioè se 2. piu rad. 3. da 1. cello 1. daria 2. meno rad. 3. che partito il prodotto d' 1. via 1. cioè 1. per 2. pin rad. 3. ne viene 2. meno rad. 3. che questo Residuo auenimento moltiplicato con il suo binomio, ch'è il partitore fa 1. come anco 1. via 1. fa 1.) Hora posta la quantità maggiore 1. 7, la minore farà (2. meno rad. 3.) 2, li loro quadrati sono 1. 20 & (7. meno rad. 48.) 2, e la loro differenza è (rad. 48. meno 6.) 2, che moltiplicata via (rad. 3. meno 1.) 2, differenza delle due quantità fa (18. meno rad. 300.) 3, & questo è eguale a 10. però la 2. valerà rad. L 7 $\frac{1}{2}$. piu rad. 51 $\frac{1}{2}$. 7 & questa è la maggiore delle due quantità; Ouero posta la maggiore

(rad. 48. meno 6.) 2

(rad. 3. meno 1.) 2

(18. meno rad. 300.) Eguale a 10

18. meno rad. 300.

24. 3. eguale a 180. piu rad. 30000

1250.

1. 3. Vale 7 $\frac{1}{2}$. piu rad. 51 $\frac{1}{2}$.

però 1. cosa. Vale rad. c. E 7 $\frac{1}{2}$. piu rad. 51 $\frac{1}{2}$. 7

eguale a 18. piu rad. 3000.) onde la quantità maggiore farà rad. L 7 $\frac{1}{2}$. piu rad. 51 $\frac{1}{2}$. 7 quale rad. L 7 è quanto rad. cuba 3 $\frac{1}{2}$. pin rad. quadra cuba 3 $\frac{1}{2}$. Et la quantità minore farà il suo Residuo, cioè rad. cuba L 7 $\frac{1}{2}$. meno rad. 51 $\frac{1}{2}$. quale è quanto rad. cuba 3 $\frac{1}{2}$. meno rad. q. c. 3 $\frac{1}{2}$.

Et nel questo medesimo di tronare due quantità tali, che il dutto della differenza loro, nella differenza de' quadrati loro sia 19. Et che il dutto della somma loro nella somma de' quadrati loro sia 20. Se noi attendendo solo ad una parte del questo diremo.

Trouinfine due quantità tali, che il dutto della differenza loro, nella differenza de' quadrati loro sia 10. Et anco ponendo la maggiore delle due quantità essere poniamo 3. si dica la minore essere 1. cosa.

Et perche la differenza de' quadrati di due quantità è il dutto della somma loro nella differenza loro; Si potrà anco dire, che il dutto della differenza delle due quantità, nella differenza de' loro quadrati, è quanto il dutto della differenza loro, nel prodotto della differenza loro, nella somma loro, cioè è quanto il dutto del quad. della differenza loro nella somma loro. Onde essenda la minore 1. co. & la maggiore 3. la differenza loro sarà 3. meno 1. co. il suo quad. è 9. meno 6. co. p. 1. co. che moltiplicato via 3. p. 6.0 somma delle due quantità fa 27. meno 9. co. meno 3. co. p. 1. 3. Et questo deve essere 10. Onde accomodando le parti baueremo 1. 3 p. 17. Eguale a 3. co. piu 9. co. dene la co. vale alquanto meno di 1 $\frac{1}{2}$. ma piu d' 1 $\frac{1}{2}$.

Et ponendo la minor quantità 3. & la maggiore 1. co. i loro quadrati sono 9. & 1. co. la loro differenza

ferenza è 1. ce. meno 9 che moltiplicato via 1. co. fa 3. la differenza delle due quantità, il prodotto è pure 1. cu. meno 3. ce. m. 9. co. p. 27. & è eguale a 10. onde come prima si ridurrà a 1. cu. p. 17. E usale a 3. ce. p. 9. co. doue la co. vale alquanto meno di $4\frac{1}{2}$, ma alquanto più di $4\frac{1}{4}$.

Et in questa Equatione d' 1. cu. p. 17. Eguale a 3. ce. p. 9. co. la cosa si uene ualere fra i $4\frac{1}{4}$ & $4\frac{1}{2}$. Et anco può ualere fra $4\frac{1}{4}$ & $4\frac{1}{2}$. perche nel Capitolo, d' Equatione ai cu. & numero Eguale a ce. & co. la co. può hauere due valute.

Ma trouate le due valute della co. cioè o sia la maggior quantità 3. & la minore fra i $4\frac{1}{4}$ & $4\frac{1}{2}$. o sia la minore 3. & la maggiore fra $4\frac{1}{4}$ & $4\frac{1}{2}$. potrà bene essere, che la differenza delle due quantità, moltiplicata nella differenza de' doi quadrati loro facci 10. ma già non seguirà poi che la somma loro moltiplicata nella somma de' quadrati loro facci 10. Poiche la posizione fatta tende tutta, & si ferue solo del 10. Et anco delle due quantità ne piglia una a bene placito, ch'è il 3. perche la soluzione seruirà solo alla prima parte del quesito.

Et se attendendo alla seconda parte, cioè formando un quesito, che contenga solo la seconda parte diremo.

Trouinsi due quantità, la somma delle quali, moltiplicata via la somma de' loro quadrati facci 20.

Et se anco vorremo fingere, che la minore sia data essere 3. ponremo poi la maggiore 1. co. i loro quadrati sono 9. & 1. ce. & in somma fanno 1. ce. p. 9. che moltiplicato via 1. co. p. 3. somma delle due quantità fa 1. cu. p. 3. ce. p. 9. co. p. 27. il che sarà eguale a 20. Cioè 1. cu. p. 3. ce. p. 9. co. p. 27. eguale a 0. il che è impossibile. Et questo occorre perche il 27. che viene ad essere il cubo di 3. posso essere la minore quantità è maggiore di 20. onde conuerria che il 3. fusse tale, che il suo enbo non arriuassee a 20.

Ma dato che la maggior quantità fusse 3. posta la minore 1. co. la somma de' loro quadrati è 9. p. 1. ce. che moltiplicato via 3. p. 1. co. somma delle due quantità fa pare 27. p. 9. co. p. 3. ce. p. 1. cu. Et questo è eguale a 20. perche si peruenie alla istessa Equatione d' 1. cu. p. 3. ce. p. 9. co. p. 27. Eguale a 0. il che essendo impossibile ci mostra, che anco la maggior quantità può essere 3.

Et ben si vede, che essendo la maggior quantità 3. quando anco la minore fusse molto piccola, & quasi 0. il solo quad. della maggiore che seria 9. (non che la somma de' quadrati d' ambedue, che seria più di 9.) moltiplicato in essa sola maggiore 3. (non che nella somma d' ambedue loro, che seria più di 3.) faria 27. (cubo d' esso 3.) ch'è molto maggiore del 20. dato, però essa maggiore, conueniente sia in uico della rad. cuba del 20. dato.

Et se ponessimo ess' maggior quantità essere 2. & la minore 1. co. la somma de' loro quadrati faria 4. p. 1. ce. che moltiplicato via 2. p. 1. co. somma delle due quantità fa 8. p. 2. ce. p. 4. co. p. 1. cu. il che è eguale a 20. cioè 1. cu. p. 2. ce. p. 4. co. Eguale a 12. doue la co. uale meno di $1\frac{1}{2}$. pero la minor quantità seria meno di $1\frac{1}{4}$.

Et ponendosi la minor quantità 2. & la maggiore 1. co. ancora la somma de' loro quadrati, & la somma delle due quantità fariano le istesse, & però il prodotto loro faria l'istesso, & però la istessa Equatione, ma all' hora perche la co. ualeria l'istesso, cioè meno di $1\frac{1}{2}$. (perche quando si vogliono dignità sono eguali a numero, la co. non può hauere se non una sola valuta, che non si può variare d' altra valuta, perche accrescendosi, & scemandosi ne seguiria, che ancora il valore delle dignità Algebratiche si accresceria, & scemaria, & così la somma loro si accresceria, & scemaria, onde ella non potria poi essere eguale al numero dato, al quale esse dignità si dicono essere eguali.) Et così il 2. non faria la minore quantità delle due, ma anzi la maggiore. Et ciò auuene perche nella posizione di 2. & 1. co. si viene a dire, che delle due quantità l' una è 2. & l' altra 1. co. ne in essa positione occorre cosa che facci conocere, d' attinga il 2. essere la maggiore, & la minore, poiche & esse due quantità, si sommano insieme, & anco i quadrati loro, le quali somme sono sempre le istesse & variano, & sia il 2. minore d' 1. co. & sia maggiore, onde nel proporre il quesito basta dire, che delle due quantità l' una è 2. & si cerca l' altra.

2	p. 1. co.	maggiore 3.	3. m. 1. co.	minore 3. maggiore 3. p. 1. co.
4	p. 4. co. p. 1. ce.	quadrati 9.	9. m. 6. co. p. 1. ce.	9. p. 6. co. p. 1. ce.
	8. p. 4. co. p. 1. ce.	differenza 1.	6. co. m. 1. ce.	differenza de quad. 1. ce. p. 6. co.
	via 4. p. 1. co.	differenza delle quantità 1. co.		differenza delle due quantità 1. co.
fa 12.	p. 2. co. p. 8. ce. p. 1. cu.	prodotto 6. ce. m. 1. cu. eguale a 10.		prodotto 1. cu. p. 6. co.
Eguale a 20.	Cioè	cioè 6. ce. eguale a 1. cubo p. 10.		Eguale a 10.
1. cu. p. 8. ce. p. 2. co. p. 12.				
Eguale a 0.				

Et ben si vede, che se la minore si dicesse essere 2. il quesito saria impossibile, perechè quãdo l'altra maggiore (& però piu di 2.) fusse poniamo $2\frac{1}{2}$. il suo quad. saria piu di 4. che con il 4. quad. di 2. saria piu di 8. che moltiplicato via la somma delle due quantita, ebi piu di 4. saria piu di 32. ebi molto maggiore del 20. dato.

Ma della istessa impossibilita ci saria accorgere l'Algebra, se dicienpoi pure la minore essere 2. ponremo poi che la maggiore sia 2. p. 1. so. che così si peruerria ad 1. cu. p. 8. cu. piu 24. eo. piu 12. Eguale a 0. ebi impossibile.

Ancora nel primo quesito douo si dice che il dutto della differenza delle due quantita, nella differenza de i quadrati loro è 10. potremo usare questo istesso modo di positione, che volendo la maggiore delle due quantita essere 3. la minore si potra dire essere 3. m. 1. so. & si peruerria a 6. ee. Eguale ad 1. cubo piu 10. Che ponendo la minore 3. & la maggiore 3. piu 1. co. si peruerria ad 1. cu. piu 6. ee. Eguali a 10.)

Hora auertiremo, che con la Regola data da principio, hauendo trouato le due quantita cercate, essere l'vna maggiore r. c. $3\frac{1}{2}$. p. r. q. c. $\frac{1}{2}$. Et l'altra minore, il suo Residuo, cioè r. c. $3\frac{1}{2}$. m. r. q. c. $\frac{1}{2}$. Et poi anco in altro modo vedendo la maggiore essere r. c. $7\frac{1}{2}$. piu r. $52\frac{1}{2}$. & la minore il suo Residuo r. c. $7\frac{1}{2}$. meno r. $52\frac{1}{2}$. veniamo a conoscere, che ò due diuerse solutioni può hauere il quesito, cioè che si possono trouare due quantita che faccino quanto si propone, & poi anco due diuerse da quelli, Ouero (come è veramente il vero) che le due seconde sono l'istesse che le due prime, cioè che r. c. $7\frac{1}{2}$. piu r. $52\frac{1}{2}$. è quanto r. c. $3\frac{1}{2}$. piu r. q. c. $\frac{1}{2}$. Et che similmente il Residuo r. c. $7\frac{1}{2}$. meno r. $52\frac{1}{2}$. è quanto il Residuo r. c. $3\frac{1}{2}$. meno r. q. c. $\frac{1}{2}$. Et per chiarircene cubaremo r. c. $3\frac{1}{2}$. piu r. q. c. $\frac{1}{2}$. & vedendo che fa a punto $7\frac{1}{2}$. piu r. c. $52\frac{1}{2}$. quanto anco è il cubo di r. $7\frac{1}{2}$. piu r. $52\frac{1}{2}$. siamo sicuri che dette due quantita sono eguali, ò vogliamo dire significano, ò vagliono l'istesso, & che pereio $7\frac{1}{2}$. piu r. $52\frac{1}{2}$. è binomio cubo (non ostante che la differenza de quadrati delle sue due parti, cioè $56\frac{1}{2}$. & $52\frac{1}{2}$. quad. differenza è 4. non sia numero cubo, come secondo l'opinione comune de i famosi Scrittori d'aueria esser essa differenza, accio si potesse tentare se il binomio sia cubo,) & la sua r. cuba è r. c. $3\frac{1}{2}$. piu r. q. c. $\frac{1}{2}$.

Onde si deve con ogni affetto ringraziare sommatamente Iddio, che ci habbi illustrato l'intelletto a peruenire a tale cognitione, & tanto altamente accrescere ornamento alla Dottrina delle quantita, O se fossero hora fra noi gli Eccellentissimi Nonio, & Bombelli, ingegni admirabili, & alcuni simili, che hanno apportato immenso splendore ad essa Dottrina, & in ciò pensato anzi tenuto per certo, che simili Binomij non habbino rad. cuba particolare, & essere impossibile passare piu auanti in ciò (come si scorge massime da quello, che seruiue al Nonio nel fine della sua Algebra) quanto, ò quanto si rallegrarebbono come veri, & ingenui amatori della Scienza, vedendosi passar pure quelli termini, & ampliarla di tanto, oltre ancora al loro pè siero, per non hauere essi stante la breuità della vita, hauuto quell'occasione, che hora il benigniss. fimo Iddio si è compiaciuto concedere a me, che non è dubio alcuno, che ancor'essi di continuo farebbono passati auanti a noue, & fortissime speculationi; Dhe voi Giouani nobili di progenie, comodi di ricchezza, & robusti per vigorosa sanita del Corpo, adoperate questa tanta copia di Stromenti concessiui così liberalmente dalla Natura, ad illustrare i vostri intelletti, a nobilitare i vostri nomi, ad apportare ornamento alle Scienze, ad operar sempre a gloria di N. S. Dio, & giouamento vnuersale; & non lassate passar giorno sine linea, come ne ammonisce il saggio Platone, perechè il tempo mai ritorna indietro, ò stà fermo, & se quello che si potria fare hoggi si aspetta fare domani, si viene a perdere quello che (hauendo oprato hoggi) si faria poi domani, & così si resta con tal dano non mai piu ricompensabile; Accendete, accendete gl'animi vostri al vero honore, & per consequenza alla salute (che come dice il dottissimo Tasso nella Gierusalemme liberata. LA VIA d'HONOR della S. ALVTE è via) che si acquistano cò l'operare virtuosamente, & con l'omai di Scienze Illustri, gioconde, & proficue; Sdegnateui, Sdegnateui dico di far dimora nell'otio ignobile, vile, & infame, che tende ad estinguere con tutti beni, la Illustr. Fama, & fa venire in dispregio a tutti i buoni; Vdite quello, che dice l'istesso giudiciosissimo Tasso.

„ La sopra l'erto, & faticoso colle

Della Virtù riposto è il vostro bene.

„ Chi non gela, & non suda, & non si estolle

Dalle uie del piacer la non peruiene.

Ma torniamo al nostro quesito, & con l'occasione dataci da esso, mediante l'aiuto Diuino esercitando il discorso naturale, vadasi speculando come si possa trouare la causa, & Regola da conoscere come essi Binomij, & Residui siano Cubi, & come se ne troui la loro radice cuba. Onde cominciando dal considerare il modo di cubare vna quantita composta, ò imaginata, componersi da dui nomi, poniamo d'hauere a cubare A piu B. il qual cu. è quello, che nasce a moltiplica-

re esso

re effo A piu B via il quadrato del medefimo A piu B. Ma il quadrato d'effo A. piu B confa, ò fi compone di tre prodotti, che fono il quadra: o di A. Il doppio di A via B. Et il quadrato di B. Cubifi A piu B.

A piu B
via A piu B
quad. di A. Doppio di A. via B. quad. di B.
via A. piu B.

primo cubo di A. Secondo A. via il doppio di A. via B. Terzo A. via il quad. di B.
ouero A. via A. via il doppio di B.
cioe il quad. di A. via il doppio di B.

Quarto B. via il quad. di A. Quinto B. via il doppio di A. via B. Sefto Cubo di B.
cioe il quad. di B. via il doppio di A:

Ma il Secondo, & Quarto fono quanto il quad. di A. via 3. volte, ò via il triplo di B. Ouero (che refulta l'ifteffo) fono quanto il dutto di B. nel triplo del quad. di A. Ancora il Terzo, & Quinto fono quanto il quad. di B. via il triplo di A. ò vogliamo dire fono quanto il dutto di A. nel triplo del quad. di B. Onde il Cubo di A. piu B. cioe il Cubo d'un Binomio confa di quattro prodotti, che fono, Il Cubo del primo nome, ò prima parte, Il Cubo della feconda, Il dutto della prima, nel triplo del quadrato della feconda, Il dutto della feconda, nel triplo del quadrato della prima.

quali tre prodotti moltiplicati di nuouo per A. piu B. cioe ciafcun d'effi per A. & anco per B. li 6. prodotti faranno come fi vede in margine, quali breuemente fi riducono folo in 4. che fono. Il cubo di A. Il cubo di B. A. nel triplo del quad. di B. Et B. nel triplo del quadrato di A. Onde fi conofce, che quando vna quantità è diuifa in due parti. Il cubo d'effa quantità è eguale a quefti quattro prodotti, cioe. Al cubo della prima parte. Al cubo della feconda parte. Al dutto della feconda nel triplo del quadrato della prima. Et al dutto della prima parte nel triplo del quad. della feconda.

Conclufo quefto, noi prefa la fopradetta quantità, ò binomio rad. c. $3\frac{3}{4}$. piu r. q. c. $\frac{3}{4}$. per trouare il fuo cubo, ò per cubarla la intenderemo diuifa nelle fue due parti r. c. $3\frac{3}{4}$. Et r. q. c. $\frac{3}{4}$. & con effe formeremo i quattro prodotti, che decono componere il cubo d'effa quantità; Onde Il cubo di r. c. $3\frac{3}{4}$. prima parte farà $3\frac{3}{4}$. Il cubo di r. q. c. $\frac{3}{4}$. feconda parte farà r. q. $\frac{3}{4}$. Ancora il dutto della prima parte nel triplo del quadrato della feconda è $3\frac{3}{4}$. Et il dutto della feconda parte nel triplo del quad. della prima è r. c. $42\frac{3}{4}$. quali quattro prodotti riftretti, & accomodati inſieme fi riducono in ſomma a $7\frac{1}{2}$. piu r. $3\frac{1}{4}$. Et queſto è il cubo del binomio dato r. c. $3\frac{3}{4}$. piu r. q. c. $\frac{3}{4}$. Et coſi ſappiamo il prodotto trouato, cioe $7\frac{1}{2}$. piu r. $3\frac{1}{4}$. eſſere veramente binomio cubo, & per ſua r. cuba hauere vn'altro binomio compoſto di r. c. & r. q. c. che è il detto r. c. $3\frac{3}{4}$. piu r. q. c. $\frac{3}{4}$. Et per ciò ſimilmente il ſuo Reſiduo $7\frac{1}{2}$. in r. $3\frac{1}{4}$. è Reſiduo cubo, & la ſua r. cuba, è il Reſiduo r. c. $3\frac{3}{4}$. in r. q. c. $\frac{3}{4}$.

Cubiſi r. c. $3\frac{3}{4}$. piu r. q. c. $\frac{3}{4}$.
Il cubo della prima parte è $3\frac{3}{4}$.
Il cubo della feconda parte è r. q. $\frac{3}{4}$.
Il quad. della prima parte è r. c. $42\frac{3}{4}$.
Il ſuo triplo è r. c. $127\frac{1}{4}$. che ridotto a r. q. c. è r. q. c. $127\frac{1}{4}$. via r. q. c. $\frac{3}{4}$. quale moltiplicata via r. q. c. $\frac{3}{4}$. ſecôda parte fa rad. quadra cuba 307146875 che preſane la ſua rad. 16. via 16. via 16. cuba, ſi riduce a rad. q. $\frac{3}{4}$. ò vogliamo dire r. c. $42\frac{3}{4}$.
Il quad. della feconda parte è r. cuba $\frac{3}{4}$. il triplo d'effo è r. c. $2\frac{1}{4}$. che moltiplicato via r. c. $\frac{1}{4}$. prima parte fa r. c. $\frac{1}{4}$. via $\frac{1}{4}$. che per eſſere il $\frac{1}{4}$. quanto il quad. di $\frac{1}{4}$. ſi vede, che eſſe prodotto ſi riduce a $\frac{1}{4}$.

2025		
$3\frac{3}{4}$ via $3\frac{3}{4}$	$3\frac{3}{4}$ via $3\frac{3}{4}$	
6075		16
25		
351875		
2025		
3796875	60	7
303750	60	7
307546875	3600	49
675	3	3
216	10800	147
91546	7	60
84763	75600	8820
6783875	8820	
6783875	343	
	84763	

form.

3015.
 sommi rad. $\frac{1}{2}$ con rad. $\frac{6}{7}$ $\frac{1}{10}$.
 entra per rad. 81. cioè 9. volte

però nella somma entra 10. volte	1
onde r. 100. via rad. $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{10}$.	5
fa rad. $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{10}$ via rad. $\frac{5}{2}$ $\frac{1}{10}$.	3
670	3
670	3
448900	25
3	3
1346700	75
5	670
6733500	30350
50250	
125	
6783875	

ò proprietà detta della quantità diuisa in due parti; a il quale cilo modo di pigliare la rad. cuba de' numeri depende; Et per mostrarlo con vn semplice esempio. Sia proposto poniamo 84548609. da pigliarne, ò trouarne la rad. cuba, in esso puntato le sue figure a tre a tre, cominciando da man destra (perche il cubo delli numeri contenuti da una sola figura, cioè che non passano 9 è al più di tre figure, & il cubo delli numeri contenuti da due figure, cioè da 10. a 99. è al più di 6. figure, ma almeno di 4. figure. Et delli numeri contenuti da 3. figure, è al più di 9. figure, & almeno di 7. figure, cioè di 7. ò di 8. ò di 9. figure; Et delli numeri contenuti da 4. figure, è di 10. 11. ò 12. Et delli contenuti da 5. figure, è di 13. ò di 14. ò di 15. & così seguendo di tre in tre) perche il numero dato riceue 3. punti, la premo, che il numero che sia la $\frac{1}{2}$ del dato sarà contenuto da 3. figure, delle quali la prima sinistramente sarà la $\frac{1}{2}$ cuba di 84. che è 4. & auanza 10. hora per trouare la seconda figura da ponere sotto all'8. puntato, noi fingeremo di douer pigliare la $\frac{1}{2}$ cuba di 84548. solamente che contiene i dui punti sinistri, & che perciò la sua $\frac{1}{2}$ cuba sarà vn numero contenuto da due figure, delle quali la prima sinistramente è il 4. già trouato, quale rispetto alla seguente da trouarsi hà significato di decine, & però

cioe a 3 $\frac{1}{2}$. Onde li quattro prodotti sono 3 $\frac{1}{2}$. radice $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{10}$. & radice 42 $\frac{1}{10}$. ma la somma delli dui primi è 7 $\frac{1}{2}$. & la somma delli dui seguenti è 52 $\frac{1}{10}$. & però in tutto fanno 7 $\frac{1}{2}$. più $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{10}$. che è il Cubo della quantità data.

Auanti miò che si passi ad altra consideratione potranno auuertire gli Studenti, che dalla cognitione del facil modo di cubare vna quantità supposta, ò imaginata diuisa in due parti, cioè dal sapere, che quando vna quantità si diuisa in due parti; il cubo d ella quantità si compone, ò vogliamo dire è eguale a quattro prodotti, che sono; Il cubo della prima parte; Il cubo della seconda. Il duto della prima parte nel triplo del quad. della seconda; Et il duto della seconda nel triplo del quad. della prima; Si può anco venire in cognitione come conuersamente li troui la r. cuba de' numeri grandi quanto si vogliano, con modo facile, & che iempre re-

84548609	A 40	B 3	2430	b 8	Per formare il denominatore del rotto.
4 3 8	40	3	430	8	
64	1600	9	184900	64	438
20348	3	3	3	3	439
13507	C 4800	37 E	C 554700	192 e	192282
5041609	B 3	40 A	b 8	430 a	3
4520672	D 14400	1080 F	d 4437600	82560 f	576846
438 5 1 0 8 4 3	F 1080	f 82560	g 512	denominatore	576847
	G 27	g 512	h. 4520672		
	H 13507				

Proua trouando il cubo dell'intero 438.

438	439
438	439
191845	192721
1334752	1734489
575532	578163
767376	770884
8402762	84604512
520937	84027679
8454860	576847

differenza delli dui cubi prossimi, che è il denominatore del rotto.

significa 40. Questo 40. insieme con la figura da trouarsi, ò sia ella 1. ò 2. ò 3. ò 4. ò altra fino a 9. (ò sia ella zero) contenirà il total numero. che è la $\frac{1}{2}$ cuba dell'84548. qual numero sarà ò 41. ò 42. ò 43. ò altro fino a 49. onde considerato il numero di due figure continente la $\frac{1}{2}$ cuba da trouarsi essere diui-

fo in due parti, che siano il 40. A noto, & il B ignoto, ma da trouarsi, & sapendo, che il cubo d'vna quantita diuisa in due parti è eguale a 4. prodotti, che sono il cubo di A. Il cubo di B. Il dutto di B. nel triplo del quad. di A. Et il dutto di A. nel triplo del quadrato di B. conosciamo che dall' 84548. cauando vno di questi 4. prodotti, cioè il cubo di A 40. qual cubo è 64000, cioè 64 milliaia, che cauato dall' 84. milliaia, resta 10. milliaia, al quale accompagnato il 548. fa 10548. che è il totale restante, in questo restante doueranno contenersi gli altri 3. prodotti, che sono il dutto di B. nel triplo del quad. di A. Il dutto di A nel triplo del quad. di B. Et il cubo di B. conuerà dunque che B. sia tal e figura (più grande che sia possibile) che con essa formati detti 3. prodotti la somma si possa cauare dal 10548. cioè non ecceda esso 10548. (perche eccedendolo il B. presaria troppo) ma che resti manco che sia possibile, accioche il B. come bisogna sia l'armagior figura che si possa trouare; Onde fatto il triplo del quad. di A, cioè multiplic. A. 40. in se stesso, che fa 1600. & qsto p 3. che fa 4800. & sia C, qsto C, multipl. poi p il B. che si trouarà sarà vno delli 3. prodotti detti, quale C hora 4800. che egli nel 10548. dal quale si hà da cauar la somma delli 3. prodotti entra solo 4. volte, conosciamo che il B. quale si cerca non può essere più di 4. ma douerà essere 4. o manco di 4. cioè ò 3. ò 2. &c. Onde ponendo egli essere 4. multiplicare via C 4800. fa 19200. per vno delli 3. prodotti, & chiamamolo primo. Ancora per il secondo, il triplo del quad. di esso B 4. è 48. da multipl. con A. 40. & fa 1920. che con il primo prodottos senza anco porui il terzo, che faria il cubo di esso 4.) fa piu del 10548. perche si vede, che quello 4. è troppo, poneremo dunque il B. essere solo 3. che multiplicato via C 4800. fa 14400. per il primo prodotto, & la potiamo chiamare D. Ancora il quad. di esso 3. B è 9. che triplato fa 27. & questo multiplicato per 40. A fa 1080. che è il secondo prodotto, & si può chiamare E. Et il terzo è il cubo di 3. B. cioè 27. quali 3. prodotti sommati insieme fanno 15507. che si può cauare dal 10548. però 3. è il vero B cercato, da ponere sotto all'8. puntato. Et dal 10548. cauato il 15507. scritti sotto resta 5041. Onde sin hora sappiamo la B. cuba di 84548. essere 43. & auanzare 5041. Ouero considerando, ò hauendo rispetto al totale 8454869. potremo dire, che la B. cuba di 84548. milliaia è 43. decine, & auanza 5051. milliaia. Seguendo mò a trouare la seguente figura da ponere sotto al 9. puntato, rispetto alla quale, & chiamamola b. il 43. a lei sinistro è 43. decine, cioè 430 fingeremo pure, ò consideremo, che il num. totale, quale hà da essere B. cuba dell' 84548609 sia diuiso in due parti, che sono il 430. a, & il b ignoto, onde il cubo d'esso num. totale, sarà eguale alla soma de quattro prodotti ordinarij, cioè al cubo di 430. al dutto di b nel triplo del quad. di 430. a. Al dutto di 430. a nel triplo del quad. di b. Et al cubo di b; Onde dall' 84548609. effende cauato il cubo di 430. a (che è vno de quattro prodotti) nel restante quale è 5041. milliaia, & il 609. di più, cioè è 5041609. doueranno contenersi li altri tre prodotti ordinarij detti; Hora formato il triplo del quad. di 430. egli è 554700. quale multiplicato con il b ignoto produrrà il primo de' tre prodotti, & considerato che questo 554700. nel 5041609. entra 9. volte, ma auanza poco, talmente che il secondo, & terzo prodotto giunti al primo, la somma loro eccedera il 5041609. conosciamo che b. non può atriuare a 9. Onde poslo che sia 8. lo multiplicaremo con il triplo del quad. di a, & fa 4337600. che è il primo prodotto; Ancora multiplicaremo il triplo del quad. di 8. b, con 430. a, & fa 82560. che è il secondo prodotto, & il cubo di 8. b. cioè 512. è il terzo prodotto, quale sommato con gl'altri dui detti, fa 4510672, & questo si può cauare dal 5041609. però 8. è la figura cercata da scriuere sotto al 9. puntato, & anco si scriua il 4510672. sotto al 5041609. cauandolo da lui, che resta 520937. & questo è il fine della operatione non vi essendo altre figure da trouare, ò altri punti da sottoscriuervi altre figure (che quado vi fossero altri punti quanti si vogliono, noi nel modo illesso ad vna ad vna andaréssimo trouando le figure da scriuerli sotto, & quando alcuna d'esse figure che si trouassero fusse zero, cioè o. all' hora la operatione che si facesse con essa faria similmente zero, & perciò non accadere a cercarne i 3. prodotti, che essi fariano in somma niente, & cauati dal numero che si hauesse restaria l'istesso numero, onde accompagnateli le 3. seguenti figure del numero dato si cercaria al modo solito la figura da ponere sotto alla terza di dette 3. figure, qual terza figura è quella dal punto.) Et così haueremo trouato, che la B. cuba dell' 84548609. è 438. & auanza 520937. con il quale auanzo possolo per numeratore sopra ad vna riga, se vorremo formare il rotto per trouare il denominatore quale poniamo essere il numero in che il cubo del 438. trouato è sperato dal cubo di 439. intiero prossimo seguente; noi (come potremo dedurre dal discorso, che intorno a ciò si farà qui sotto) multiplicaremo il 438. per il 439. & triplaremo il prodotto, cioè lo multiplicaremo per 3. Onde haueremo 438.439. 3. da multiplicare fra loro; perche la operatione riuscirà molto breue, se multiplicaremo il 438. per 3. & il prodotto 1314. che si troua senza fatica, multiplicaremo poi per l'altro numero 439. Ouero multiplicaremo 439. per 3. & il prodotto 1317. li 6. multiplicarà per 438. che in qual si vogli modo l'ultimo prodotto farà 576848. al quale si giunge sepre 8. che

che è il Cubo di 1. in che il 439. supera il 438. & fa 576847. quale per denominatore scriveremo sotto alla riga, & diremo la rad. cuba propinqua di 8454869. essere 438 $\frac{1}{2}$. Et così con questo modo mentre non ne haueffimo a memoria alcun' altro potremo trouare la rad. cuba di qual si vogli numero dato; Onde vediamo quanto beneficio si caua dalla sola cognitione della proprietà della quantità diuisa in due parti nel trouarne il suo Cubo mediante esse due sue parti con li quattro prodotti da loro dependenti, facilissima proprietà da mantenere nella memoria, & però da ridurre a memoria ancora facilmente le cose da lei dependenti.

Andremo mò discorrendo, & considerando come si possa trouar modo facile da venire in cognitione della differenza de' Cubi di dui numeri intieri prossimi, cioè distanti fra loro nella sola metà.

Poniamo d' habere 5. & 6. intieri prossimi da trouare la differenza de i Cubi loro; Fingasi il 6. maggiore essere diuiso in 5. (numero minore) & 1. (differenza d'essi 5. & 6.) & perciò sapremo che il cubo di 6. totale si compone da 4. prodotti, che sono; Il cubo di 5. il cubo d'1. (partidette del 6.) qual cubo d'1. è sempre 1. Il triplo del quad. di 1. che è sempre 3. moltiplicato via il 5. che però è sempre il triplo di 5. Et il triplo del quad. di 5. che hora è 75. moltiplicato via 1. (che è l'altra parte del 6.) qual produce sempre l'istesso triplo del quad. dell'altra parte, cioè hora 75. Onde da questi quattro prodotti leuato il cubo di 5. la somma degli altri 3. farà la differenza del cubo di 5. al cubo di 6. ma essi 3. prodotti sono 75. 15. & 1. che il 75. è il triplo di 25. quad. di 5. Et il 15. è il triplo dell'istesso 5 ma il primo si può dire essere il duto di 5. via 5. via 3. Et il secondo il duto di 5. via 3. ma per comodità, & resulta l'istesso, diremo essere il duto di 1. via 5. via 3. Onde il duto di 5. via 5. & anco il duto di 1. via 5. che è quanto in somma il duto di 5. & 1. cioè di 6. via 5. & fa 30. si hà da moltiplicare sempre per 3. cioè triplarlo, che hora fa 90. & questo è la somma di 75. & 15. alla quale si deve poi giungere 1. che è sempre il cubo di 1. & fa hora 91. & questo 91. è la differenza di 125. a 216. cubi di 5. & 6. Di qui dunque potremo dedurre la regola dicendo.

Per trouare la differenza, che è dal cubo d'un numero dato, & sia A 5. dal cubo dello a lui prossimo seguente maggiore per vna unità, & sia B. che è 6. Moltiplichisi il dato 5. per il maggiore di lui in vna unità, che è il B. & il prodotto 30. si tripli, & fa 90. al quale si gionga 1. (cubo d'1. differenza di A. al B.) & fa 91. per la differenza del cubo di 5. al cubo di 6. Et questo farà il modo di formare il denominatore del rotto da accompagnare all'intero nell'estrazione delle radici cube essendo numeratore l'auanzo della operatione, che perciò la propinqua r.c. di 126. farà 5 $\frac{1}{2}$. di 127. farà 5 $\frac{1}{3}$. & così negli altri.

Et notisi, che questo modo serua a trouare la differenza de' cubi di dui numeri distanti fra loro in vna unità benché essi siano rotti, & misti come si vogli, come faria poniamo fra $\frac{3}{4}$. & 1 $\frac{1}{4}$. fra 5 $\frac{1}{2}$. & 6 $\frac{1}{2}$. o fra 58 $\frac{1}{2}$. & 59 $\frac{1}{2}$. &c. Che per essemplio fra 24 $\frac{1}{2}$. & 25 $\frac{1}{2}$. il duto di 24 $\frac{1}{2}$. via 25 $\frac{1}{2}$. è 24. via 25 fa 600. & $\frac{3}{4}$. via 24 & 25. fa 24 $\frac{1}{2}$. & $\frac{1}{2}$. via $\frac{1}{2}$. fa $\frac{1}{4}$. l'che tutto si fa a mente, & in somma è 624 $\frac{1}{4}$. & $\frac{1}{4}$. cioè 624 $\frac{1}{2}$. al triplo del quale, che 1924 $\frac{1}{2}$. giunto 1. fa 1995 $\frac{1}{2}$. & questo è la differenza, che si trouaria fra 14706 $\frac{1}{2}$. cubo di 24 $\frac{1}{2}$. a 15681 $\frac{1}{2}$. cubo di 25 $\frac{1}{2}$.

Con la istessa consideratione inuestigaremo la differenza de' Cubi di qual si vogliano altri dui numeri, poniamo di 5. & 13. supponendo il 13. diuiso in 5. & 8. che il cubo di 8. differenza di 5. & 13. è 512. Il triplo del quad. di 8. moltiplicandolo per 5. fa 8. via 8. via 3. via 5. Et il triplo del quad. di 5. moltiplicandolo via 8. fa 5. via 5. via 8. quali dui prodotti vanno sommati insieme; Et perche in l'vno, & in l'altro vi è 3. via 5. cioè il triplo di 5. che è 15. il primo farà 8. via 8. 15. volte. Et il secondo 5. via 8. 15. volte, cioè 64. & 40. 15. volte, cioè 104. 15. volte, che fa 1560. al quale giunto 512. cubo dell'8. fa 2072. differenza de' Cubi di 5. & 13. Onde perche 8. via 8. & 5. via 8. è quanto 13. via 8. cioè il duto del 13. totale in 8. differenza, qual duto v'è moltiplicato per 15. triplo di 5. numero minore; Si vede per Regola poterli dire.

07. Dati dui numeri, (o quantità) per trouare la differenza de i Cubi loro. Moltiplichisi il maggiore per la differenza de' dui numeri (cioè 24. via 9. (essendo i dui numeri dati 15. & 24.) & il prodotto (360.) si moltiplichi via il triplo del minore (cioè hora per 45.) & al prodotto (hora 16200.) si giunga il cubo della differenza de' dui numeri (cioè hora il cubo di 9. che è 729.) che la somma (hora 16929.) farà la differenza de' cubi de' dui numeri dati; o siano essi intieri, o rotti, o misti, o altre quantità come si vogliano, poiche il discorso astratto è fatto in vniuersale.

Tornando hora al nostro Binomio A. $7\frac{1}{2}$ piu rad. $5\frac{1}{2}$. Quale sappiamo essere cubo, & la sua rad. cuba essere il Binomio B. rad. c. $3\frac{1}{2}$ piu r. q. c. $\frac{1}{2}$. Vediamo che al solito cauando $5\frac{1}{2}$ quad. della parte minore da $36\frac{1}{4}$ quad. della parte maggiore resta $4\frac{1}{4}$, quale non è numero cubo, cioè la r. c. del quale non è num. semplice, ma è rad. cuba $4\frac{1}{4}$, & nel medesimo r. c. $\frac{1}{2}$ 4. ci accorgiamo essere differenti di un quad. di r. c. $3\frac{1}{2}$. & r. q. c. $\frac{1}{2}$ che sono le due parti del Binomio B. quali di loro quad. sono r. c. $3\frac{1}{2}$ & r. c. $\frac{1}{2}$, che r. c. $3\frac{1}{2}$ & r. c. $\frac{1}{2}$ nella quale la r. c. $\frac{1}{2}$ entra per r. c. 27. cioè volte 3. & però nella differenza loro entrerà una volta meno, cioè entrerà solo 1. volte, cioè per r. c. 3. perche moltiplicando r. c. 8. via r. c. $3\frac{1}{2}$ che fa r. c. $4\frac{1}{4}$ questa è la differenza d'elli dei quadrati. Onde si può notare, che si come nelli Binomij (o residui) cubi ordinarij composti di numero, & rad. quadra, ancora le loro rad. cube sono composte di numero, & radice quadra; perche in essi Binomij colij la differenza de' quadrati delle parti loro è num. cubo; Similmente nel sopradetto $7\frac{1}{2}$ piu r. $5\frac{1}{2}$ perche la r. c. della differenza de' quadrati delle due parti è rad. cuba $4\frac{1}{4}$. quello ci mostra, che quando egli sia Binomio cubo conuerza che la differenza delli quadrati delle due parti non debba essere sua rad. cuba sia non numero semplice, ma r. c. $4\frac{1}{4}$. & perciò bisognerà, che la sua maggior parte sia rad. cuba, & l'altra sia rad. quadra rispetto a questa, cioè sia r. q. cuba, così come nel Binomio $7\frac{1}{2}$ piu rad. $5\frac{1}{2}$ la minor parte è rad. quadra rispetto alla maggiore.

Cubi di c. $3\frac{1}{2}$ p. q. c. $\frac{1}{2}$ al modo ordinario;

$$\begin{array}{r} \text{Bx c. } 3\frac{1}{2} \cdot \text{p. q. c. } \frac{1}{2} \\ \text{Bx c. } 3\frac{1}{2} \cdot \text{p. q. c. } \frac{1}{2} \\ \hline \text{Bx c. } 3\frac{1}{2} \cdot \text{p. q. c. } \frac{1}{2} \end{array}$$
 nell'altro entra volte
 Bx cu. 27. cioè 3. volte, però nella
 somma loro entrerà volte 4. che
 per perciò 4. cioè Bx c. 64. via Bx c.

di Bx cuba $3\frac{1}{2}$. Il doppio è Bx cuba 30. che è Bx quadra cuba
 900. quale via Bx quadra cuba $3\frac{1}{2}$ fa Bx quadra cuba
 $1\frac{1}{2}$ cioè Bx quadra cuba 468 $\frac{1}{2}$. il quad. dunque del Bi
 nomio dato è Bx cuba $3\frac{1}{2}$ p. Bx quadra cuba 468 $\frac{1}{2}$. da mol
 tiplicare via Bx cuba $3\frac{1}{2}$ p. q. c. $\frac{1}{2}$.
 Bx cuba $1\frac{1}{2}$ cioè Bx cuba 115. quale con $1\frac{1}{2}$ pro
 dotto delle seconde parti fa $7\frac{1}{2}$. & questo con Bx $5\frac{1}{2}$
 somma de' due prodotto trasferiali fa $7\frac{1}{2}$. piu radice 52.
 $\frac{1}{2}$ & questo è il total prodotto che è il cubo del Binomio
 dato Bx c. $3\frac{1}{2}$ p. q. c. $\frac{1}{2}$.

Hora per venire all'inuentione del mo
 do di trouare la Bx cuba de' Binomij cubi
 simili fra che si dica.

Pigliū la Bx cuba di $7\frac{1}{2}$ p. Bx $5\frac{1}{2}$. noi
 perche questo Binomio è contenuto da rot
 to lo moltiplicheremo per comodità per vn
 num. tale che gli riduca ad interi, & per
 ciò bisogna che nel suo quad. cioè in esso ri
 dotto a forma di Bx entri il 12. denomina
 tore del rotto $\frac{1}{2}$ della Bx $5\frac{1}{2}$. & per
 ciò il numero da adoprare potrà essere 6,
 che moltiplicato per il $7\frac{1}{2}$ lo riduce ad in
 tiero 45. & essendo gli Bx 36. moltiplican
 do con esso la rad. $5\frac{1}{2}$ la radice all'in
 tiero rad. 1875. & così haueremo 45 p. rad.
 1875 che sarà seppio cioè 8. volte quanto
 il dato Binomio A. $7\frac{1}{2}$ p. rad. $5\frac{1}{2}$. ò vo
 gliamo dire conuersamente il Binomio A.
 dato sarà l'2. del C 45. p. rad. 1875. Onde
 trouata che sia la rad. cuba del C. la doue
 remo partire per la rad. cuba del 6. moltiplicante adoprato, cioè per rad. cuba 6. (perche la
 proportion d'un cubo C. ad vn altro cubo A. è triplicata, a quella che è dal lato del C. al lato
 dell'A.) che l'aumentamento sarà la rad. cuba del Binomio A. dato.

Et perche la rad. cuba del dato Binomio A. è r. c. $3\frac{1}{2}$ piu r. q. c. $\frac{1}{2}$. vediamo che moltiplican
 do questo per detta r. c. 6. il prodotto r. c. $21\frac{1}{2}$ piu r. q. c. 18 $\frac{1}{2}$. & chiamiamolo D. douerà essere la
 rad. cuba del C. 45. piu rad. 1875. andiamo dunque considerando come si deua operare acciò si
 troui quella r. c. $21\frac{1}{2}$ piu r. q. c. 18 $\frac{1}{2}$. Onde nel 45. piu rad. 1875. cauando il quad. della minor

par-

parte del quad. della maggiore, cioè 1875. da 2025. & resta 150. la rad.cuba di questo 150. (se bene esso 150. non è numero cubo, cioè se bene la rad.cuba d'esso 150. non si può esplicare per semplice numero) cioè r.c. 50. è appunto la differenza de' quadrati delle due parti r.c. 12 $\frac{1}{2}$. & r.q.c. 18 $\frac{1}{2}$. quali formano il Binomio D. (che e' li quadrati sono r.c. 506 $\frac{1}{2}$ & r.c. 18 $\frac{1}{2}$. & r.c. 18 $\frac{1}{2}$. in r. 306 $\frac{1}{2}$. cioè r.c. 306 $\frac{1}{2}$. in r.c. 306 $\frac{1}{2}$. entra per r.c. 27. cioè 3. volte, però entrerà nella differenza loro solo 1. volte, cioè per r.c. 8. onde moltiplicando r.c. 306 $\frac{1}{2}$. per r.c. 8. il prodotto r.c. 150. sarà la differenza loro.) E perciò si può notare, che si come nelli Binomij (ò Residui) cubi composti di numero, & rad. quadra, quali hanno per loro rad. Binomij pure, composti di numero, & quadra anniene, che in essi Binomij cubi la differenza della quad. delle loro due parti è numero cubo, cioè la sua rad. cuba è numero rationale, & perciò i Binomij che sono loro rad. cube, sono composti di numero, & rad. quadra (perche dico in essi la differenza de' quadrati delle loro due parti è numero cubo) similmente ancora nel sopradetto 45. più rad. 1875. perche la rad. cuba della differenza de' quadrati delle due parti è non numero rationale, ma r.c. 150. questo ci mostra, che douendo esso C. 45. più rad. 1875. essere Binomio cubo, & perciò hauere per rad. cuba vn Binomio D. conterrà, che li quadrati delle due parti di esso D. siano differenti in detta rad. cuba 150. & che perciò la prima parte maggiore sia rad. cuba, & la seconda minore donerà essere, non rad. cuba (perche a cauare il quad. della minore, che sarà rad. cuba dal quad. della maggiore, che sarà r.c. due restare r.c. 180. ne seguirà, che esse r.c. mostranti i quadrati d'esse parti s'ellerò communicanti fra loro, potendo si cauare l'vna dell'altra, & perciò anco comunicanti fra loro doueriano essere le rad. cube, dalle quali derivassero essi quadrati, cioè le r.c. mostranti le due parti del Binomio D. perche esse due parti si potriano sommare insieme, & ridurre in vna sola r.c. cioè in vna particolare quantità, o de' esso D. non saria Binomio, ma vna semplice quantità, il che non può stare, poiche a cauare vna semplice r.c. ne restaria vn numero (cioe il numero della rad. cuba, che a cauare poniamo r.c. 12. ne restula 12.) & non alcun Binomio C. ó vogliamo dire; Quando si ponesse il Binomio D. essere contenuto da due rad. cube, & siano a, & b, i loro quadrati c, & d, che fariano pure rad. cuba, hauriano per numeri, due numeri quadrati, & accioche la minore d, si possa cauare dalla maggiore c, (douendo restare dalla sottrattione rad. cuba (che hora saria rad. cuba 150.) conuiene che il numero di d, entri nel numero di c; per alcun numero cubo e, ma anco vi entrerà per alcun numero quadrato (poiche a partire numero quadrato per numero quadrato, l'aumento di d, necessarà quadrato) onde il numero cubo e, saria anco quadrato, & però quadro cubo, perche del numero e, la sua rad. quadra sarà numero cubo; ma se a partire il quadrato e, per il quadrato d, ne viene e, ne segue, che a partire la rad. quadra di c, per la rad. quadra di d, cioè a partire il numero a, per il numero b, ne venga la rad. quadra dell'aumento e, & sia f, ma perche il numero e, è quadrato cubo, la sua rad. quadra sarà numero cubo; onde a partire il numero a, per il numero b, ne verrà f, numero cubo, perche è chiaro, che a partire la rad. cuba a, per la rad. cuba b, ne viene vna rad. cuba, che haurà per numero f cubo, & perciò essa rad. cuba si potrà esplicare per numero, & perciò la rad. cuba b, si potrà sommare con la rad. cuba a, (essendo esse comunicanti, che la b, entra nella a, per il numero, che è rad. cuba del numero f.) onde il composto delle rad. cube a, & b, non sarà binomio, ma vna sola rad. cuba) ma rad. quadra rispetto ad essa rad. cuba, cioè douerà essere r.q.c. (che è r di r.c.) così come nel Binomio C, la minor parte rad. 1875. è rad. quadra rispetto alla maggiore 45. Veduto dunque, che delle due parti del Binomio D. da trouarsi, la maggiore deu' essere la cuba, & la minore la q.c. Et che la differenza de' quadrati loro (che saranno due cube) deu' essere la 150. cioè 5 $\frac{1}{2}$. & più; Noi per trouare con giudicio esse parti, considereremo che il Binomio C. 45. più r. 1875. è 88 & più, & perciò la sua rad. cuba è 4 $\frac{1}{2}$. & più, perche il Binomio C. douerà significare, ó valere alquanto più di 4 $\frac{1}{2}$. Onde conuenrà trouare due quantità, cioè vna rad. cuba, & vna r.q.c. tali che la somma loro imporei alquanto più di 4 $\frac{1}{2}$. & la differenza de' quadrati loro sia vna rad. cuba, che importi alquanto più di 5 $\frac{1}{2}$. cioè sia r.c. 150. quale r.c. 150. è communicante a ciascuno deli due quadrati d'esse due quantità; ó parti del D. ciascuno de' quali quadrati è vna r.c. Cioe conuenrà diuidere 4 $\frac{1}{2}$. G. & alquanto più in due parti tali N, & O, che i loro quadrati siano differenti in 5 $\frac{1}{2}$. & alquanto più T, & per farlo cò qualche Regola, la potremo dedurre dall'Algebra supponendo vn quesito simile in interi, perche poniamo che si dica: Diuidasi 10. in due parti tali, che la differenza de' loro quadrati sia 60. Noi per comodità posto la maggiore essere la metà di 10. & 1. & di più, cioè 5. più 1; & la minore

farà 5. meno 1. & la differenza de' loro quadrati 25. più 10. & più 1. & 25. m. 10. & più 1. & 20. & il che è eguale a 60. dato, però la 2. vale 3. onde esse parti saranno 5. più 3. & 5. m. 3. cioè 8. & 2. Et perche il 20. numero delle 2. con il quale si parte sempre il 60. dato è sempre il doppio del 10. da partire. vediamo la Regola essere questa.

Proposta vna quantità per diuiderla in due parti tali, che la differenza de' quadrati loro, sia vna numero dato.

Partasi esso numero dato per il doppio della quantità proposta, & l'auenimento si giunga, & caui alla mita di detta quantità proposta, che i diuidentanti faranno le due parti cercate.

Et se per diuider il 10. haueſſimo poſto la parte maggiore eſſere 1.2. & la minore 10. m. 1.2. Il quad. maggiore faria 1.2. & il minore 100. m. 10. & più 1.2. che cauato da 1.2. reſta 20.2. meno 100. & è eguale a 60. onde accomodato il meno ſi haueſſe 20.2. eguale a 160. & però la 2. valerà 8. che è la parte maggiore reſtando 2. la minore, & qui perche il 20. numero delle 2. è pure il doppio di 10. poſto, & il 160. partito per 20. è il compoſto di 60. numero dato, con 100. quadrato del 10. poſto, vediamo che anco ſi può dare la Regola coſi.

Partaſi la ſomma del numero dato con il quadrato del propoſto, per il doppio del propoſto, che l'auenimento ſara la parte maggiore del numero, o quantità propoſta.

Ma ponendo la parte minore eſſere 1.2. & la maggiore 10. m. 1.2. dal ſuo quad. 100. m. 20. & più 1.2. cauato 1.2. quad. della minore, reſta 100. m. 20. & ſara eguale a 60. onde cauato 60. da ciaſcuna parte, & accomodato il meno, haueſſimo 20.2. eguale a 40. (Et qui ſi vede, che conueniene che il 60. dato ſia minore del quadrato del 10. poſto, acciò il queſito ſia ſolubile) però la 2. valerà 2. & è la parte minore, reſtando 8. per la maggiore. Et di qui deriuando la regola ſi potrà dire; Cauaſi il numero dato dal quad. del propoſto, & il reſtante ſi parta per il doppio del propoſto, che l'auenimento ſara la parte minore.

Hora adoprando poniamo la prima di queſte regolette per diuider circa $4\frac{1}{2}$. che è il propoſto G. in due parti tali, che i quadrati loro ſiano differenti in circa $5\frac{1}{2}$. che è il dato. Partiremo circa a $5\frac{1}{2}$. dato, per circa 8 $\frac{1}{2}$. doppio del propoſto G, che ne viene circa a $\frac{1}{8}$. ma diciamo circa a $\frac{1}{8}$. da giungere, & cauare a circa $2\frac{1}{2}$. mita del circa $3\frac{1}{2}$. propoſto, & ne reſulta circa a $2\frac{1}{2}$. & circa a $1\frac{1}{2}$. per le due parti cercate, perche il valore della B. cuba ſignificante la parte maggiore del Binomio ſarà circa a $2\frac{1}{2}$. & il valore della B. q.c. ſignificante la parte minore ſarà circa a $1\frac{1}{2}$. Il quadrato dunque di queſta parte minore valerà circa a $2\frac{1}{2}$. & perche ſarà vna B. cuba ella potrà eſſere circa a B. cuba 16. (ma auertaſi, che già non può eſſere perche B. cuba 16. perche queſta B. cuba 16. faria il quad. di B. cuba 4. & non il quad. d'vna B. q.c.) Et perche queſta B. cuba quadrato della parte minore ha da eſſere comunicate (come anco il quad. della parte maggiore) alla B. cuba 150. differenza de' quadrati d'eſſe due parti, conuerſa che a partire l'vna per l'altra ne venga numero rationale, & però hora a partire rad. cuba 150. maggiore per l'altra, ne douera venire numero rationale, & conuerſamente con qualche numero rationale partendo B. c. 150. ne douera venire la B. c. che è quadrato della parte minore; Et perche la B. c. 150. ſi vede che contiene la circa a B. c. 16. per circa B. c. 9. ma diciamo per circa a B. c. 8. che è; ſi vede queſto numero rationale potere eſſere circa a 2. (come anco ſi può conoſcere da principio conſiderando, che il circa $5\frac{1}{2}$. valore di B. c. 150. contiene circa a 2. volte il circa $2\frac{1}{2}$. quadrato del circa $1\frac{1}{2}$. che ſi vede eſſere il valore della parte minore del Binomio D. che cerchiamo) poſto dunque che ſia 2. cioè B. c. 8. con eſſo partiremo B. c. 150. & ne viene B. c. 18 $\frac{1}{2}$. & queſto douera eſſere il quad. della parte minore del Binomio D. però eſſa parte minore ſarà B. q. c. 18 $\frac{1}{2}$. Et quanto alla maggiore giogendoli B. c. 150. differenza de' quadrati delle due parti; a B. c. 18 $\frac{1}{2}$. quadrato della minore, & la ſomma ſara 3. volte la minore (perche la B. c. 150. la contiene 2. volte) cioè il duto di B. c. 18 $\frac{1}{2}$. via B. c. 27. & fa B. c. 506 $\frac{1}{2}$. che douera eſſere il quad. della B. c. che è parte maggiore del Binomio D. però conuerſa che il 506 $\frac{1}{2}$. ſia numero quad. acciò poſſa eſſere a propoſito, ma a punto egli è quad. & la ſua B. q. c. è $22\frac{1}{2}$. perche vediamo, che B. cuba $22\frac{1}{2}$. moltiplicata in ſe ſteſſa produſſa detta B. c. 506 $\frac{1}{2}$. per ſuo quad. Onde queſta B. c. $22\frac{1}{2}$. douera eſſere la parte maggiore del Binomio D. egli dunque (eſſendo a propoſito, cioè ſe il dato Binomio C. ſia cubo) ſara B. c. $22\frac{1}{2}$. più B. q. c. 18 $\frac{1}{2}$. Lo eſamineremo dunque, & vedremo ſe il ſuo cubo forma il C. & perche a puto lo forma ſaremo ſicuri, che eſſo C. è binomio cubo, & che la ſua B. cuba è B. c. $22\frac{1}{2}$. più B. q. c. 18 $\frac{1}{2}$. Queſto mò partiremo per B. c. 6. & l'auenimento B. c. 3 $\frac{1}{2}$. più B. q. c. $\frac{3}{2}$. ſara la B. cuba del Binomio A.

L'accorto Studente accomodi mò queſti diſcorſi, & ponga con ordine conueniente formando eſſe gli Regola luccinta, perche io non hò potuto fare altro hauendo ſcritto in tempi diſcontinui, & con intelletto diſordinato da continue exceſſiue moleſtie, onde è anco marauiglia, ch'io habbi potuto fare tanto, ma legga l'anco lo Studente il ſeguente diſcorſo intorno al tro-

mare la radice cuba del sopradetto Binomio, quale hò trouato scritto in vn'altra mia bozza.

Per trouare il Binomio A, che hà da essere la Bx cuba del Binomio A 45. piu Bx 1875. perche i numeri 45. & 1875. (della Bx) che sono le parti del Binomio A. sono interi, sapremo che anchora i numeri della radice cuba & radice quadra cuba delle due parti del Binomio R. che si cerca doueranno essere interi, ò al più misti con rotte d' $\frac{1}{2}$. nella rad. cuba, & con quarti nella radice quadra cuba, ma faranno bene poi di necessità interi se il Binomio 45. piu radice 1875. si moltiplicasse per alcun numero paro, poniamo per 2. che ne resultaria 90. piu radice 7500. B. la radice cuba del quale faria il Binomio S. che si producesse a moltiplicare per la radice cuba di questo 2. cioè per radice cuba 2. il Binomio R. il rotto $\frac{1}{2}$. che fusse nella radice cuba del quale moltiplicato per 2. si leuaria; & il rotto quarti, che fusse nella radice quadra cuba d'esso moltiplicato pure per radice cuba 2. cioè per radice quadra cuba 4. si leuaria medesimamente. Onde se habendo formato il Binomio B. 90. piu radice 7500. doppio all' A. 45. piu radice 1875. la radice cuba del quale B. douerà essere vn Binomio S. composto di radice cuba, & radice quadra cuba, i numero delle quali sue due parti faranno interi, vorremo cercare esse parti, considereremo che i quadrati delle due parti del B. del quale si cerca la radice cuba, cioè 8100. & 7500. sono differenti fra loro in 600. la radice cuba della quale differenza è radice cuba 600. il che ci mostra i quadrati delle due parti del Binomio S. che cerchiamo douere esser differenti fra loro in radice cuba 600. (che non arriua a $8\frac{1}{2}$.) Ex perche il Binomio B. importa quasi 177. per il che la sua radice cuba importerà poco più di $5\frac{1}{2}$. conuerà che il valore delle due parti del Binomio S. sia poco più di $5\frac{1}{2}$. & la prima parte sia radice cuba di numero intero, & la seconda sia radice quadra cuba similmente di numero intero, i quadrati delle quali parti sia differenti fra loro in meno di $8\frac{1}{2}$. Onde se poneremo la prima parte essere radice cuba 40. che è meno di $9\frac{1}{2}$. l'altra douerà essere più di 2. (che resta fino al più di $5\frac{1}{2}$.) però douerà essere più di radice quadra cuba 64. i loro quadrati sono radice cuba 1600. & più di radice cuba 64. cioè circa a 11 $\frac{1}{2}$. & quattro in circa differenti, cioè incirca $7\frac{1}{2}$. che è molto meno dell' $8\frac{1}{2}$. in circa in che deuno essere differenti; però aggrandiremo la prima parte acciò che il suo quadrato douenti più differente dal quadrato dell'altra parte, che sarà poi minore; & perciò potremo ponere, che la prima parte sia rad. cuba 42. ò rad. cuba 45. &c. Ma per cercare queste due parti, che deuno formare il Binomio S. con saldo giudicio, considereremo, che douendo esse essere tali, che il quadrato Q. della minore (hora radice quadra cuba 75. che per quadrato hà radice cuba 75.) cauto dal quadrato T. della maggiore (hora radice cuba 45. che per quadrato hà radice cuba 2025.) resti radice cuba 600. conuien che il quadrato Q. sia comunicante al quadrato T. acciò si possa cauare esso Q. dal T. cioè conuien che il Q. entri in T. per alcun numero astratto di volte, dal quale numero cauto la vnità, il numero astratto restante (cioè libero da denominatione di radice d'alcuna forte) sarà il numero delle volte, che il medesimo quadrato Q. minore entra nella differenza d'essi quadrati, con il qual numero astratto poi moltiplicaro il quadrato Q. minore, il prodotto sarà la differenza d'essi quadrati, onde hora douendo la differenza de' quadrati Q. & T. essere radice cuba 600. si vede che essa radice cuba 600. nasce dal moltiplicare il quadrato Q. per alcun numero astratto (ò sia egli intero, ò con rotto) conuien dunque conuerlamente, che a partire essa radice cuba 600. per quel numero astratto incognito ne venga il quadrato Q. della parte minore, onde essa radice cuba 600. è comunicante al quadrato Q. & perciò anco al quadrato T. hora mediante questa cognitione sapendo ancora che la parte minore deue essere alquanto più di 2. cioè alquanto più di radice quadra cuba 64. & però il suo quadrato alquanto più di radice cuba 64. partiremo la radice cuba 600. per alcun numero cubo tale, che ne venga alquanto più di 4. cioè alquanto più di radice cuba 64. che preso radice cuba 8. cioè 2. essa radice cuba 8. in radice cuba 600. entra per radice cuba 75. che è più di radice cuba 64. non eccedendo di molto il 4. come deue fare il quadrato Q. però posto il quadrato Q. essere radice cuba 75. la sua radice ò parte minore del Binomio S. sarà rad. quadra cuba 75. hora al suo quadrato, che è rad. cuba 75. giunto rad. cuba 600. la somma douerà essere il quadrato della parte maggiore, onde per trouarla diremo rad. cuba 75. in rad. cuba 600. entra 2. volte, però nella somma d'ambidue ella entra 3. volte, & 3. cioè radice cuba 27. via radice cuba 75. la radice cuba 2025. però quello sarà il quadrato della prima parte, per il che bisogna, che 2025. sia numero quadrato, ma egli è ben quadrato, & la sua radice è 45. però la radice di radice cuba 2025. è radice cuba 45. & questa sarà la prima parte, che importa poco più di $5\frac{1}{2}$. quale con radice quadra cuba 75. che è poco più di $5\frac{1}{2}$. ha poca più di $5\frac{1}{2}$. come sappiamo douere essere il valore del Binomio S. per il che per chiarirci inieramente se questa radice cuba 45. piu rad. quadra cuba 75. trouato sia il vero Binomio S. ò radice cuba del dato B. lo cubaremo

& vedremo se forma il B. onde per formare la parte maggiore del Binomio, che sia il cubo di questo trouato, noi al cubo della parte maggiore rad. cuba 45. qual cubo è 45. giungeremo il due to del triplo del quad. della parte minore nella maggiore, cioè il dutto di rad. cuba 45. nel triplo di rad. cuba 75. (che rad. cuba 45. via rad. cuba 75. fa rad. cuba 3375. cioè 15. che moltiplicato per 2. fa 45.) & è 45. quale con l'altro 45. cubo della prima parte fa 90. & questo 90. è a punto il numero, ò parte maggiore del Binomio B. dato. Et per formare la parte minore cubaremo la parte minore rad. quadra cu. 75. del Binomio S. & fa rad. 75. ancora moltiplicheremo detta parte minore per il triplo del quad. della parte maggiore, ouero il quad. della parte maggiore, qual quad. è rad. cuba 2025. lo moltiplicheremo per la parte minore r. q. c. 75. cioè r. q. c. 4100625. (ridotto la rad. cuba 2025. ar. q. c.) via r. q. c. 75. & fa r. q. c. 307546875. che si riduce a r. q. 675. quale moltiplicheremo per 3. cioè per r. q. 9. & fa 6075. da giungere alla rad. 75. sopradetta, cubo della parte minore, che per farlo vediamo, che 675. entra in 675. per volte 25. che è 5. & in rad. 6075. entra per volte per 2025. che è 45. però nella somma entra volte 5. & 45. cioè volte 50. per il che moltiplicando effa effa rad. 3. per 50. cioè per rad. 2500. fa rad. 7500. per la somma cercata, & questa rad. 7500. è l'altra parte minore del Binomio, che è il cubo dell'S. quale rad. 7500. perchè è a punto eguale alla parte minore del Binomio B. dato, conosciamo intieramente, che la sua rad. cuba è il Binomio rad. cuba 45. p. r. q. c. 1875. sopradetto.

Cubifi questo Binomio A rad. cuba 6. p. rad. cuba 2. composto da due rad. cube.

Il cubo della prima parte è 6. Il quad. della seconda parte è 6. cuba 4. che via la prima 6. cuba 12. fa rad. cuba 24. & questo triplato fa rad. cuba 648. Ancora il cubo della seconda parte è 3. Di più il quad. della prima parte è rad. cuba 36. che via la seconda rad. cuba 2. fa rad. cuba 72. & questo triplato fa rad. cuba 1944. per il che accompagnati insieme questi quattro prodotti, ma douentaranno tre, sommando insieme li di ii numeri 6. & 2. che fanno 8. haueremo rad. cuba 1944. p. rad. cuba 648. più 8. qual Trinomio A. rad. cuba 6. più rad. cuba 2. Et così vediamo che a cubare vn Binomio composto di due rad. cube, se non forma vn Trinomio contenuto da due rad. cube, & da vn numero rationale; Ma notifi la proprietà che vi si scorge, & è che tal proportion è dal numero 6. al numero 2. delle rad. cube 6. Et rad. cuba 2. che formano il Binomio A. qual proportion è anco dal numero 1944. al numero 648. che formano le due rad. cube nel Trinomio cubo, & il suo numero rationale 8. che è la somma di 6. & 2. cubi delle due parti dell'A. viene perciò a formarli dalla somma di dui numeri, che hanno fra loro la istessa proportion, quale hora è come da 3. ad 1.

Et petche si vede, che li 1944. & 648. nascono a moltiplicare li 72. & 24. per vn'istesso 27. & per ciò effi 72. & 24. hanno la istessa proportion delle 6. & 2. delli quali 72. & 24. il primo 72. nasce a moltiplicare il quad. del primo 6. per il secondo 2. Et il secondo 24. nasce a moltiplicare il quad. del secondo 2. per il primo 6. Si conosce, che di dui numeri M. & N. proposti a moltiplicare il quad. del primo M. per il secondo N. & nascane P. Et a moltiplicare il quad. del secondo N. per il primo M. & nascane R. questi P. R. ritengono la istessa proportion che li proposti, cioè da P. ad R. farà come da M. ad N. Il che anco si può dimostrare così.

Siano proposti M. & N. ma (per comodità, & per più facile intelligenza dandoli nome di numeri, & non di lettere dell'Alfabeto, non per pigliare effi nomi di numeri come particolari numeri, ma come semplici nomi prefati a beneplacito, douendo essere la dimostrazione vniversalissima al modo Mathematico) diciamo 5. & 7. i loro quadrati sono 25. & 49. de' quali il 25. primo, moltiplicato per 7. secondo fa 175. primo. Et il 49. secondo, moltiplicato per 5. primo, fa 245. secondo, si dice che da 175. primo, a 245. secondo è come da 5. primo a 7. secondo. Perche deriuando il primo 175. da moltiplicare il primo 5. per 5. & il prodotto per 7. che sono i dui numeri proposti, perche effi 5. & 7. moltiplicati insieme fanno 35. ne segue che a moltiplicare effo 5. primo per 5. & il prodotto per 7. è quanto se effo 5. primo in vna sola moltiplicatione si moltiplicasse per 35. che pure produce il 175. primo. Et deriuando il secondo 245. dal moltiplicare il secondo 7. per 7. & il prodotto per 5. che sono i medesmi dui numeri proposti, quali pure moltiplicati insieme, fanno il medesimo 35. detto, ne segue similmente, che a moltiplicare effo 7. secondo per 7. & il prodotto per 5. è quanto se effo 7. secondo in vna sola moltiplicatione si moltiplicasse per 35. che pure produce il 245. secondo. Onde si può dire, che a moltiplicare li proposti 5. & 7. ciascuno d'effi per vn'istesso numero 35. se ne producono 175. & 245. Ma quando quanti numeri, ò quantità si vogliono, si moltiplicano per vn'istesso numero, ò quantità, i prodotti per ordine ritengono fra loro la istessa, ò istesse proportioni che hanno fra loro i moltiplicati, però è chiaro, che la proportion di 175. a 245. è come da 5. a 7. proposti.

Ci accorgiamo perciò, che dato vn Trinomio cubo, composto da due rad. cube, & da vn numero rationale, si può facilmente trouare il Binomio A. che sia la rad. cuba d'effo. Dividendo il

numero

numero rationale del Trinomio in due parti, che habbino fra loro la proportione delli dui numeri delle due rad. cube d'esso Trinomio, che le rad. cube poi d'esse due parti trouate faranno le due parti che formano il Binomio A. Onde dato poniamo il Trinomio cubo rad. cuba 23815. præd. cuba 8775. p 18. per trouare il Binomio A. sua rad. cuba, vedremo che proportionē è da 23815. a 8775. che schifando essi numeri si ridurranno a 13. & 5. Et hora diuideremo il 18. numero del Trinomio in due parti, che habbino la proportionē di 13. a 5. cioè diremo le 18. somma di 13. & 5. da esse parti 13. & 5. che darà per parti il 18. numero del Trinomio. Et darà 13. & 5. perliche le rad. cube d'essi 13. & 5. cioè rad. cuba 13. & rad. cuba 5. faranno le parti che formano il Binomio A. però egli sarà rad. cuba 11. præd. cuba 5. & esso A. è la rad. cuba del Trinomio dato. Et anco senza schifare li numeri 23815. 8775. si può dire, se 31590. sōma loro, da essi 23815. 8775. sue parti, che darà 18. numero del Trinomio, & operando si vedrà che egli darà 13. & 5. però la cuba 13. p la cuba 5. farà il Binomio A. Ouero, perche del Trinomio le due rad. cube, sono l'vna il triplo del duto del quadrato della prima parte del Binomio A. nella seconda parte. Et l'altra è il triplo del duto del quadrato della seconda parte del Binomio A. nella prima parte, partendo noi esse rad. cube per 3. cioè per la cuba 27. che ne deriuano la cuba 845. & la cuba 325. sappiamo che de i due numeri delle due rad. cube, che sono parti del Binomio A. da trouarli, il numero della seconda. multiplicato nel quadrato del numero della prima deuē fare 845. Et che il numero della prima multiplicato nel quadrato del numero della seconda deuē fare 325. Et di più, che il numero della prima al numero della seconda deuē hauere la proportionē istessa, che ha 845. a 325. Onde si possa dire;

Trouinsi dui numeri nella proportionē di 845. a 325. ò schifando di 169. a 65. ò (schifando di mouo di 13. a 5. tali, che il duto del quad. del primo nel secondo facei 845. Et che il duto del quadrato del secondo nel primo facei 325. benchè in questi casi i numeri che faranno atti al produrre l'vno 845. faranno anco atti al produrre l'altro 325. Onde basta solo seruirsi d'vno de i dui dotti, poniamo del 325. Che posto essi numeri essere 13. & 5. il duto di 35; quad. del secondo 5. in 13. primo, fa 325. & questo è eguale a 325. dato, però 1.3 è eguale ad 1. Et la vale la cuba 1. cioè 1. onde i dui numeri posti 13. & 5. faranno 13. & 5. Et le loro rad. cube, cioè rad. cuba 13. & rad. cuba 5. faranno le due parti del Binomio A. che è rad. cuba del Trinomio proposto.

Se vorremo formare delli Trinomij cubi composti da due rad. cube, & da numero rationale, & cōpiaccia che il numero rationale sia vn dato numero, noi potremo diuidere esso numero in due parti ineguali come si vogli, & le rad. cube d'esse due parti accompagnate insieme, formaranno il Binomio A. che hà da essere rad. cuba del Trinomio da formarli; Onde multiplicando il quad. della parte maggiore del Binomio per la minore, il triplo del prodotto sarà la rad. cuba maggiore del Trinomio. Et multiplicando il quad. della parte minore del Binomio per la maggiore, il triplo del prodotto sarà la rad. cuba minore del Trinomio; Onde volendoli poniamo che il numero rationale del Trinomio sia 1. Se lo diuideremo in $\frac{1}{2}$. & $\frac{1}{2}$. il composto delle loro rad. cube, cioè rad. c. $\frac{1}{2}$. p rad. cuba $\frac{1}{2}$. farà il Binomio A. il Trinomio cubo del quale trouando al solito come s'è detto sarà la cuba $12\frac{1}{2}$. p la cuba $9\frac{1}{2}$. p la cuba $1\frac{1}{2}$.

Et diuidendo l'1. in 1. & $\frac{1}{2}$. al composto delle loro rad. cube, cioè la cuba 1. più la cuba $\frac{1}{2}$. cioè 1. p la cuba $\frac{1}{2}$. farà vn Binomio A. il Trinomio cubo del quale trouato al solito sarà r. c. 13 $\frac{1}{2}$. più la cuba $6\frac{1}{2}$. p la cuba $1\frac{1}{2}$.

Et pigliando 4. per numero rationale del Trinomio, diuidendolo poniamo in 3. & 1. il composto delle rad. cube de' quali giunte insieme, fanno la cuba c. 3. p 1. questo sarà vn Binomio A. il Trinomio cubo del quale vedremo essere la cuba c. 243. p la cuba c. 81 p 4.

Et prelo 10. per numero rationale del Trinomio se lo diuideremo in 8. & 2. le loro rad. cube giunte insieme formaranno 2. più la cuba c. 2. per Binomio A. il Trinomio cubo del quale sarà la cuba c. 3456. p la cuba 864. p 10. ò vogliamo dire (ponendo la quantità mezzana in mezzo) farà la cuba 3456. più 10. più la cuba 864. & qui si vede il numero 10. essere maggiore d'vna delle due rad. cube del Trinomio.

Ma se diuideremo il 10. in 9. & 1. il composto delle loro rad. cube, cioè il Binomio A. sarà r. c. 9 p 1. essendo il suo Trinomio cubo r. c. 2187. p 10. p r. c. 243.

Et diuiso il 10. in 9. & $\frac{1}{2}$. il Binomio A. sarà r. c. 9 $\frac{1}{2}$. p r. c. $\frac{1}{2}$. Et il suo Trinomio cubo sarà r. c. 1218 $\frac{1}{4}$. p 10. p r. c. 64 $\frac{1}{2}$.

Et se per numero rationale del Trinomio pigliaremo 24 $\frac{1}{2}$. diuidendolo in 24. & $\frac{1}{2}$. il Binomio A. sarà rad. cuba 24. præd. cuba $\frac{1}{2}$. & il suo Trinomio cubo sarà 24 $\frac{1}{2}$. p r. c. 12592. p r. c. 18. Che qui il numero 24 $\frac{1}{2}$. è la parte maggiore del Trinomio.

Ancora preso per numero rationale del Trinomio 32 $\frac{1}{2}$. se lo diuideremo in 32. & $\frac{1}{2}$. le loro rad.

ro rad.cube gionte insieme formaranno $8x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ che farà il Binomio A. il Trinomio è cubo del quale li vedrà essere $3x^2 + 3x + 1$ & cuba $3x^2 + 3x + 1$ & cuba $\frac{1}{27}$.

Et vediamo che simili Trinomij cubi composti da numero razionale, & due B. cube, possono
hauere per B. cube diuersi Binomij A. composti, o da B. cube, o da B. cuba, & numero, o da nume-
ro, & rad. cuba.

Er di sopra quando haueffimo il Binomio A. $\sqrt[3]{x}$ cuba 13. $\sqrt[3]{x}$ rad.cuba 5. se lo partiremo per vna delle sue due parti. et uia per $\sqrt[3]{x}$ cuba 5. che ne verrà $\sqrt[3]{x}$ cuba 3. $\sqrt[3]{x}$ rad.cuba 1. cioe rad. cuba 1. $\sqrt[3]{x}$ p 1. questo Binomio B. farà rad. cuba d vn Trinomio. che nasce a partire quel Trinomio cubo $\sqrt[3]{x}$ cuba 128 15. $\sqrt[3]{x}$ rad.cuba 8775 $\sqrt[3]{x}$ p 18. per il cubo della rad. cuba 5. partitore adoprato, cioe per 5. (perche dal lato al lato è la rad. cuba di quella proportion, che è dal cubo al cubo, cioe poniamo dal lato 3. del cubo R. al lato 5. del cubo S. è quella proportion di $\frac{3}{5}$. che è rad.cuba di quella proportion di $\frac{1}{\frac{5}{3}}$. che è dal cubo R. 27. al cubo S. 125. Jonde nascendone rad. cuba 18 $\frac{1}{\frac{5}{3}}$. $\sqrt[3]{x}$ cuba 70 $\frac{1}{3}$. $\sqrt[3]{x}$ p 3. questo è il Trinomio cubo, che ha per $\sqrt[3]{x}$ cuba il detto Binomio B. rad.cuba 3. $\sqrt[3]{x}$ p 18.

Et se l'A. rad. cuba 13. piu B. cuba 5. hauesimo partito per l'altra parte rad. cuba 13. l'aumento rad. cuba 1. piu B. cuba $\frac{1}{13}$. cioe 1. piu rad. cuba $\frac{1}{13}$. faria vn Binomio C. quale verria ad
gifiere rad. cuba dvn Trinomio T. rad. cuba 10 $\frac{1}{13}$. piu B. cuba $3 \frac{1}{13}$. piu 1 $\frac{1}{13}$. che nasce
partire il primo il Trinomio rad. cuba 22815. piu rad. cuba 8775. piu 18. per 13. cubo di detta ra-
dice cuba 13.

Et se darò esso Trinomio T. si volesse cercare la sua β cuba, che non fosse nota, noi come s'è detto, divideremo il suo numero $1 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$ in due parti tali, che habbino la maggiore alla minore la proportionē di $10 \frac{1}{2} \frac{1}{3} : 2 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$. Et all' hora anco conuerà (accioche il binomio T. sia cubo) che il quadrato della minore moltiplicato per la maggiore facci $1 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$, che è quello, che nasce a partire $3 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$, per 27. Ouero che il quadrato della maggiore moltiplicato per la minore facci $1 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$, che è quello, che nasce a partire $10 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$, per 27. Onde ponendo essa proportionē di $10 \frac{1}{2} \frac{1}{3} : 2 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$, in iustitiche fra $10 \frac{1}{2} \frac{1}{3} : 2 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$, & $10 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$, cioe fra $1 \frac{1}{2} \frac{1}{3} : 2 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$, & $10 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$, cioe fra 1775 & 675, cioe fra 35 & 135, cioe fra 39 & 15, cioe fra 13 & 5, & hora per diuidete $1 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$ in due parti di tal proportionē diremo il composto di 13 & 5, cioe 18, dà per parri 13 & 5, che darà l'1 $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$, cioe $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$, & subito vediamo, che darà $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$, & $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$, cioe 1 & $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$, che le loro β cuba, cioe 1, & β cuba $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$, doueranno essere le parti del Binomio A. che sia la rad. cuba del Trinomio T. quando egli sia cubo, per il che accioche esse due parti siano a proposito, cioe accioche si conosca il Trinomio T. essere veramente cubo, & che il Binomio 1. piu rad. cuba $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$, sia la sua rad. cuba, conuerà che il quadrato della parte maggiore 1. moltiplicato per la parte minore rad. cuba $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$ facci $1 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$, di rad. cuba $10 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$, che è la rad. cuba maggiore del Trinomio; Et che anco il quadrato della parte minore rad. cuba $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$ moltiplicato per la parte maggiore 1. facci $1 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$, di rad. cuba $3 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$, che è la rad. cuba minore del Trinomio; Onde moltiplicando 1. quadrato d'1. parte maggiore dell'1. piu rad. cuba $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$, per rad. cuba $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$, parte minore fa rad. cuba $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$, & questo è a punto $1 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$, di rad. cuba $10 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$, o vogliamo dire, & questo moltiplicato per 3, cioe per rad. cuba 27, fa a punto rad. cuba $10 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$, parte maggiore del Trinomio, come anco moltiplicando rad. cuba $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$, quad. di rad. cuba $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$, parte minore del Binomio per 3. parte maggiore, fa rad. cuba $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$, che riplito fa a punto rad. cuba $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$, cioe β cuba $3 \frac{1}{2} \frac{1}{3}$, parte minore del Trinomio, & così siamo sicuri che esso Trinomio è cubo, & che hà per rad. cuba il Binomio 1. piu rad. cuba $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$.

Cubif A. rad. cuba 960. R. q. c. 1800.

Il cubo della prima parte è 960. Il quadrato della seconda parte è rad. cuba 1800. Il suo triplo moltiplicato via la prima rad. cuba 960. fa rad. cuba 1800. via rad. cuba 960. via 3. Cioè rad. cuba 225. via 2. via rad. cuba 120. via 2. via 3. che è rad. cuba 2700. via 12. cioè 30. via 12. che fa 360. Et quello giunto a 960. cubo della prima parte fa 1310. che è la prima parte del Binomio C. quale ha da essere il cubo dell'A dato. Quale C. farà an' effo Binomio, poiche rad.

mio C. quale hã da effere il cubo dell'A dato . Quale C. farà anch'ello Binomio, poiche rad. cuba 1738000 cioe 130. durtto della prima parte rad. cuba 960. in rad. cuba 1800. quad. della seconda parte ò comunicare a 960. cubo della prima parte. Ilche auuene fuma, che il durtto della prima parte nel quadrato della seconda parte, & però il suo triplo è communicante al cubo della prima parte. Ancora il cubo della seconda parte d'A. è rad. quadra 1800. Et il quad. della prima parte è R cuba 931600. che ridotto a R q.c. per moltiplicarlo via la seconda parte, fa R q.c. 931600. via R q.c. 931600. & quello moltiplicato via la seconda parte R q.c. 1800. & il prodotto triplo, cioe moltiplicato per 3. fa R q.c. 931600. via R q.c. 931600. via R q.c. 1800. via 3. Cioe R q.c. 512 via R q.c. 1800. via R q.c. 512. via R q.c. 1800. via R q.c. 1800. via 3. Delli quali 6. prodotti li 3. R q.c. 1800. R q.c. 1800. R q.c. 1800. hauendo ciafcun d'elli per numero via medefimo

defmo 1800. & essendo tre, il prodotto loro viene ad essere il cubo d'vno d'essi, & però è la quadra 1800. annullandosi l'altro denominatore di radice. Et perché delle r.q.c. 512. & r.q.c. 512. ciascuno de' numeri loro è cubo, elle si ridurranno a r.q.8. Et r.q.8. & così si hauerà r.q.8. via r.q.8. via r.q.1800 via 3. Ma r.q.8. via r.q.8. fa 8. & quello via 3. fa 24. però si ridurranno a r.q. 1800. via 24. Et perché questo si hà da sommare con il cubo della seconda parte, che è rad.q. 1800. la somma sarà vna volta di più essa rad quadra 1800. cioè sarà 25. volte rad. quadra 1800. onde multiplicando 25. cioè rad.625. via rad. 1800. il prodotto sarà 112500. sarà l'altra parte del Binomio C. onde egli sarà 1340 più rad. 112500. quale è il cubo dell'A. dato r.c. 960. più rad. quadra cuba 1800.

Ancora per cubare facilmente il dato Binomio A. rad. cuba 960. più r.q.c. 1800. noi potiamo in vece sua cubare vna parte d'esso, cioè partirlo per vn numero, ò quantità comoda a beneplacito, poniamo hora per rad. cuba 30. (che è r.q.c. 900.) che ne viene rad. cuba 32. più r.q.c. 2. & chiamiamolo D. & cubare hora questo D. (che il cubo della prima parte è 32. il quadrato della seconda parte è rad. cuba 2. che multiplicato via la prima r.c. 32. fa r.c. 64. cioè 4. & quello triplo fa 12. da giungere al 32. cubo della prima parte, & fa 44. per prima parte del Binomio S. che sarà il cubo del D.

Ancora il quad. della prima parte r.c. 32. è r.c. 1024. che ridotta a r.q.c. & multiplicato per r.q.c. 2. seconda parte, & il prodotto triplo si hauerà r.q.c. 1024. via r.q.c. 1024. via r.q.c. 2. via 3. che per comodità (partendo le due prime quantità per r.q.c. 2.) diremo essere r.q.c. 512. via r.q.c. 2. via r.q.c. 512. via r.q.c. 2. via r.q.c. 2. via 3. ma il dutto fra loro delle tre r.q.c. 2. è r.q. 2. Et r.q. 2. è r.q. 8. come anco l'altra r.q.c. 512. è r.q. 8. onde finalmente haueremo r.q. 8. via r.q. 8. via r.q. 2. via 3. Di queste il prodotto di r.q. 8. via r.q. 8. è 8. & multiplicato via il 3. fa 24. & così haueremo r.q. 2. via 24. quello si hà da giungere al cubo di r.q. 2. seconda parte, qual suo cubo è r.q. 2. perché 14. volte r.q. 2. con vn'altra volta r.q. 2. farà 25. volte r.q. 2. cioè r.c. 625. via r.c. 2. che produce r. 1250. & questo sarà l'altra parte del Binomio S. egli dunque sarà 44. più rad. 1250. che è il cubo del D. r.c. 32. più r.q.c. 2. Questo S. mò si douerà multiplicare per il cubo della r.c. 30. con che si partì l'A. per ridurlo al D. cioè si multiplicarà per 30. & fa 1330. più r.q.c. 112500. per il Binomio C. che è cubo dell'A. dato.

Si può anco auertire nel cubare il Binomio A. r.c. 960. più r.q.c. 1800. che douendo la prima parte del C. essere di num. (1320.) che si cõpone dal cubo della prima parte dell'A. che è il num. 960. & dal prodotto che nasce a multiplicare il triplo del quad. della seconda parte, qual quad. & suo triplo è r.c. nella prima parte, che è r.c. cõuiene che il num. di quello prodotto, che è r.c. sia num. cubo, acciò esso prodotto si possa ridurre a num. semplice da giungere al cubo della prima parte, che pure è num. semplice, che nõ hauendo il Binomio A. dato (cõposto da r.c. & r.q.c.) questa qualità il C. cubo d'esso A. non sarà Binomio (cõposto da num. & r.q.) ma sarà quadrinomio; Et il Binomio A. dato hauerà le conditioni dette, & il suo cubo sarà pure Binomio; Quando il num. della parte multiplicato nel num. della seconda parte produrrà num. cubo (perche il quad. della seconda parte (che è r.q.c.) sarà vna r.c. dell'istesso num. quale douendosi multiplicare nella prima parte che è r.c. il prodotto che è r.c. acciò si possa ridurre a num. rationale, & che perciò il suo triplo non pure numero rationale perche si possa giungere con il cubo della prima parte, che sarà pure numero rationale (conuiene che il numero d'essa r.c. prodotto sia numero cubo.) Onde preso vn numero cubo a beneplacito, & partitolo per qual numero ci piacerà, l'auenimento, & il partitore potranno essere l'vno, ò l'altro, il numero della r.c. & l'altro, ò l'vno il num. della r. q. c. che accompagnati insieme formaranno vn Binomio A. il cubo del quale farà vn'altro Binomio C. contenuto da numero, & rad. q. auertendo però, che il partitore, che si adopri non sia numero cubo ne quadro cubo, ò tale, cioè delle due partitore, & auenimento quello che si vorrà adoprare per radice cuba non sia cubo, perche all' hora tal quantità si potrà ridurre a numero rationale, & quello che si vorrà adoprare per r.q.c. non sia ne quadro, ne cubo, ne cubo, ne quadro, acciò che essa r.q.c. nõ si possa ridurre a num. rationale a r.q. ne a r.c. ma sia veramente r.q. c. irrationale.

Per esempio preso poniamo 8. numero cubo, partendolo per 2. ne viene 4. però potremo adoprare il 4. come rad. c. che per q.c. non si può adoprare, essendo egli quadrato, cioè non si può dire r.q.c. 4. che questo si ridurreia a r.c. 2.) & il 2. come rad. quad. cub. & così il Binomio A. potrà essere rad. c. 4. p. r.q.c. 2. Et il suo cubo C. sarà 10. p. rad. 98.

Ouerò se piglieremo per r.c. parte dell'A. quali vorremo, poniamo r.c. 20. & con il suo num. partiremo vn num. cubo a beneplacito tale, nondimeno, che l'auenimento non sia ne quadro (che perciò 1000. che ne viene 100. che è quadrato) & sia poniamo 125. che ne viene 12 $\frac{1}{2}$. Ouerò 8. che ne viene $\frac{1}{8}$. ouero 64. che ne viene 6 $\frac{1}{4}$. ouero 15 $\frac{1}{2}$. che ne viene 1 $\frac{1}{2}$. (ma questo non è a proposito, perche 1 $\frac{1}{2}$ è numero quadrato, & però r.q.c. 1 $\frac{1}{2}$ significaria r.c. 1 $\frac{1}{2}$, all' hora

l'altra parte del Binomio A. sarà $\sqrt[3]{q.c. 12} \pm \sqrt[3]{q.c. \frac{4}{3}}$. & $\sqrt[3]{q.c. 6} \frac{2}{3}$. Et così il Binomio A. sarà rad. cuba 10. $\pm \sqrt[3]{q.c. 12} \pm \sqrt[3]{q.c. \frac{4}{3}}$. & rad. cuba 10. $\pm \sqrt[3]{q.c. 6} \frac{2}{3}$. Et se essi do pure rad. cuba 10. vna parte del Binomio A. pigliaremo il numero cubo 8000. che partito per 10. ne viene 800. all' hora l'altra parte del Binomio A. sarà $\sqrt[3]{q.c. 800}$. & esso Binomio A. sarà rad. cuba 10. $\pm \sqrt[3]{q.c. 800}$. ma essendo $\sqrt[3]{q.c. 800}$. maggiore di rad. cuba 10. si dirà $\sqrt[3]{q.c. 800}$. $\pm$ rad. cuba 10. & per formare il Binomio C. noi per adoprare numeripiccoli comodi, potremo partire questo A. per rad. cuba 5. (che è $\sqrt[3]{q.c. 125}$.) & ne deriuará $\sqrt[3]{q.c. 32}$. & rad. cuba 2. & chiamiamolo B. & lo cubaremo chiamando il suo cubo D. quale poi moltiplicheremo per il cubo di radice cuba 5. cioè per 5. & il prodotto farà il Binomio C. cubo dell' A. Onde per cubare il B. diremo il cubo della prima parte $\sqrt[3]{q.c. 32}$. è $\sqrt[3]{q.c. 32}$. Ancora il quadrato della seconda parte rad. cuba 2. è rad. cuba 4. da moltiplicare con la prima parte $\sqrt[3]{q.c. 32}$. cioè $\sqrt[3]{q.c. 16}$. via $\sqrt[3]{q.c. 32}$. & fa $\sqrt[3]{q.c. 512}$. che è $\sqrt[3]{q.c. 8}$. da triplare. & fa $\sqrt[3]{q.c. 72}$. che si giunge a $\sqrt[3]{q.c. 32}$. cubo della prima parte, & fa $\sqrt[3]{q.c. 2}$. via 6. via $\sqrt[3]{q.c. 4}$. cioè via 10. che fa $\sqrt[3]{q.c. 200}$. & è la prima parte del Binomio D. Et seguendo diremo, il cubo di rad. cuba 2. seconda parte del B. è 2. Ancora il quadrato della prima parte $\sqrt[3]{q.c. 32}$. è $\sqrt[3]{q.c. 32}$. da moltiplicare con la seconda parte rad. cuba 2. & fa rad. cuba 64. cioè 4. da triplare. & fa 12. questo si giugne al 2. cubo della seconda parte, & fa 14. per la seconda parte del Binomio D. & così egli farà $\sqrt[3]{q.c. 200}$. $\pm$ 14. questo moltiplicheremo hora per 5. & fa $\sqrt[3]{q.c. 5000}$. $\pm$ 70. per il Binomio C. cubo dell' A. $\sqrt[3]{q.c. 800}$. $\pm \sqrt[3]{q.c. 10}$.

Hora conuerfamente sedato il Binomio C. $\sqrt[3]{q.c. 5000}$ $\pm$ 70. vorremo trouare la sua rad. cuba, cioè il Binomio A. diremo i quadrati di queste due parti del C. sono differenti in 100. però in rad. cuba 100. doueranno essere differenti i quadrati delle due parti dell' A. cioè in poco meno di 5. Et perche il C. importa poco più di 140. l' A. sua rad. cuba douerà importare poco più di rad. cuba 140. che è poco più di 5. onde le parti dell' A. importariano circa 3. & circa 2. che facciano più di 5. & che i loro quadrati siano circa 9. & circa 4. che siano differenti in poco meno di 5. Et perche la parte minore circa 2. hà da essere $\sqrt[3]{q.c. 8}$. & comunicare a rad. cuba 100. differenza delli quadrati delle due parti, fe la poneremo $\sqrt[3]{q.c. 72}$ rad. cuba 9. i quadrati rad. cuba 49. & rad. cuba 81. non faranno comunicanti con $\sqrt[3]{q.c. 100}$. ma ponendo la rad. cuba 10. vederanno che il suo quadrato rad. cuba 100. è comunicante con rad. cuba 100. differenza detta, che entra in essa 7. volta precise. Onde rad. cuba 10. potrà essere la parte minore del Binomio A. al quadrato della quale che è $\sqrt[3]{q.c. 100}$. giointo $\sqrt[3]{q.c. 100}$. differenza detta fa $\sqrt[3]{q.c. 800}$. che farà il quadrato della parte maggiore, & però ella doueria essere la $\sqrt[3]{q.c.}$ di quella rad. cuba 800. cioè doueria essere $\sqrt[3]{q.c. 800}$. che accompagnato alla $\sqrt[3]{q.c. 10}$. farà $\sqrt[3]{q.c. 800}$. $\pm$ rad. cuba 10. quale doueria essere il Binomio A. Onde esaminandolo. & cubandolo vedremo, che il quadrato della parte maggiore è rad. cuba 800. quale moltiplicato con la minore rad. cuba 10. fa rad. cuba 8000. cioè 20. il suo triplo è 60. & giointo a 10. cubo della seconda parte $\sqrt[3]{q.c. 10}$. fa 70. che è a tutto la parte minore del Binomio C. Et così anco trouaremo, che seguendo al solito ne riuscirà la parte maggiore $\sqrt[3]{q.c. 5000}$. d' esso C. (che il cubo della parte maggiore è $\sqrt[3]{q.c. 800}$. Il quadrato della parte minore è rad. cuba 100. quale moltiplicato via la parte maggiore $\sqrt[3]{q.c. 800}$. cioè $\sqrt[3]{q.c. 10000}$. via $\sqrt[3]{q.c. 800}$. fa $\sqrt[3]{q.c. 8000000}$. cioè $\sqrt[3]{q.c. 20}$. il suo triplo è $\sqrt[3]{q.c. 1800}$. da giungere al quadrato detto della parte maggiore, cioè a $\sqrt[3]{q.c. 800}$. che la somma farà $\sqrt[3]{q.c. 2}$. via 30. $\pm$ 20. cioè via 50. cioè via $\sqrt[3]{q.c. 500}$. che fa $\sqrt[3]{q.c. 8000}$.) perche faremo sicuri il Binomio C. essere cubo, & che la sua r.c. è $\sqrt[3]{q.c. 800}$. $\pm$ 10. A. sopra detto.

Ancora essendo proposto il Binomio A. $\sqrt[3]{q.c. 3888}$. $\pm$ $\sqrt[3]{q.c. 32}$. volendo vedere se il suo cubo sarà ancor egli Binomio, moltiplicheremo il numero della r.c. con il numero della r.c. cioè 3888. via 32. & produce 46516. quale vedremo se è numero cubo; che andando vn punto sotto al 6. destro; abbracciando il 46. sinistro, la r.c. del quale 46. sinistro è 3. B. con uauzo, potremo considerare senz' altra operatione, che douendo essere il 46516. numero cubo, perche egli termina in 6. conterrà che la sua rad. cuba termini anch' ella 6. (perche il cubo di 6. è 6.) Onde conterrà. che essendo la figura B. tutto il numero sia 36. però se 46516. sia numero cubo conterrà che la sua rad. cuba sia 36. Onde cubaremo questo 36. che 36. via 36. fa 1296. & questo via 36. fa 46656. quale non è altrimenti il 46516. prodotto di sopra trouato; però egli non è cubo; & perciò ne anco il cubo del Binomio A. potrà essere Binomio. Et con questa consideratione potrà auuertire lo Studente. che quando alcun numero proposto termini in 1. se egli farà numero cubo, la sua rad. cuba douerà terminare in 1. cubo d' essa rad. 1. Se il proposto termini in 2. la sua rad. cuba (essendo egli cubo) douerà terminare in 8. se in 3. la r.c. terminare in 7. se in 4. terminare in 4. se in 5. terminare in 5. se in 6. terminare in 6. se in 7. terminare in 3. se in 8. terminare in 2. Et se in 9. la r.c. douerà terminare in 9.

Cubi $\sqrt[3]{q.c. 5}$. $\pm$ $\sqrt[3]{q.c. 3}$. Binomio A. composto da due r.c. Il suo cubo è questo quadrinomio C.

r. 675. p. r. 405. p. r. 125. p. r. 27. Onde si vede, che in questo quadrinomio composto da quattro. r. q. douendo egli essere cubo, conuerà che vi si trouino due numeri cubi tra essi quattro numeri delle sue quattro radici quadre, & all' hora le rad. cube d'essi due numeri delle radici quadre d'vn Binomio A. che sarà rad. cuba del quadrinomio C. se egli sarà cubo; Onde hora fra i suoi quattro numeri essendouene due 125. & 27. cubi, prese le loro rad. cube, che sono 5. & 3. & dando la nome, o denominatioue di r. q. formaremo r. 5. p. rad. 3. & questo sarà il Binomio A. che sarà r. cuba del quadrinomio C. quando egli sia cubo, per cubandolo se ne deriuarà il C. faremo sicuri che esso C. sia cubo.

Ma auuertasi che essi quadrinomij eosi composti sono realmente Binomij, che in questo rad. 675. dutto della seconda parte r. nel triplo del quadrato della prima rad. 5. h può formare con rad. 227. cubo della secoda parte r. & fa rad. 972. (che rad. 3. in rad. 675. entra per rad. 225. cioè 15. volte; & in rad. 27. entra per rad. 9. cioè 3. volte, però nella somma loro entrerà 18. volte, onde 18. cioè rad. 324. via rad. 3. fa rad. 972.) Et rad. 405. si può formare con rad. 125. (che rad. 5. entra in l'vna 9. volte, & in l'altra 5. volte, cioè nella somma loro entra 14. volte) & fa rad. 980. però esso quadrinomio si riduce a rad. 980. piu rad. 972. Binomio C. cubo del dato radice 5. piu radice 3.

Et se dato il Binomio A. rad. 5. p. rad. 3. da cubare, noi ridurremo vno de' suoi due nomi poniamo il primo rad. 5. alla vnità partendo detto Binomio per esso suo primo nome rad. 5. egli si ridurrà ad 1. p. rad. $\frac{3}{5}$. Binomio B. quale sarà facile da cubare, che il cubo della prima parte è 1. Il dutto d'essa prima parte nel triplo di $\frac{3}{5}$. quadrato di rad. $\frac{3}{5}$. seconda parte è $1\frac{3}{5}$. che con l'1. detto cubo della prima parte fa $2\frac{3}{5}$. per vna parte del D. cubo di detto B. Ancora il cubo di rad. $\frac{3}{5}$. seconda parte è rad. $\frac{27}{125}$. o vogliamo dire è rad. $\frac{3}{5}$. volte $\frac{3}{5}$. Et il dutto del triplo del quadrato della prima parte 1. cioè di 3. nella seconda parte rad. $\frac{3}{5}$. è rad. $\frac{9}{5}$. 3. volte, che giunto con rad. $\frac{3}{5}$. volte $\frac{3}{5}$. cubo d'essa seconda parte fa rad. $\frac{27}{125}$. volte $3\frac{3}{5}$. cioè rad. $\frac{27}{125}$. che fa r. $\frac{27}{125}$. cioè rad. $7\frac{1}{125}$. che è l'altra parte del D. però questo D. cubo del B. farà $2\frac{3}{5}$. piu rad. $7\frac{1}{125}$. qua le hora moltiplicheremo per s'ebno di rad. 5. (partitore adoprato dell'A.) cioè per rad. 125. che per co no lita si può dire 5. via rad. 5. & fa 14. via rad. 5. p. rad. 38. $\frac{3}{5}$. via 5. Cioe rad. 196. via rad. 6. fa rad. 118. $\frac{3}{5}$. via rad. 35. che fa rad. 980. piu rad. 972. & è il Binomio C. cubo dell'A. dato.

Et se dato il Binomio A. per il suo minor nome rad. 3. si faria ridotto a rad. 1. p. p. 3. B. che con 3. produce rad. $1\frac{3}{5}$. via $1\frac{3}{5}$. p. rad. $1\frac{3}{5}$. via 3. cioè rad. $1\frac{3}{5}$. via $4\frac{3}{5}$. cioè rad. $\frac{27}{125}$. & a rad. $\frac{27}{125}$. che fa r. $\frac{27}{125}$. Et 1. p. $1\frac{3}{5}$. via 3. cioè 1. p. 5. che fa 6. Et così il D. cubo del B. sarà rad. $136\frac{3}{5}$. p. 6. quale si douerà moltiplicare per il cubo di rad. 3. (partitore dell'A. per ridurlo al B.) cioè per rad. 27. & fa rad. 980. p. rad. 972. che è il Binomio C. cubo dell'A.

Et se dato il Binomio C. rad. 980. p. rad. 972. ne trouaremo t. ouare la sua rad. cuba, noi cauando il quadrato del minor nome dal quad. del maggiore vedremo che resta 8. la rad. cuba del quale è 2. però 2. contierà che sia la differenza de' quadrati delle due parti dell'A. quale faria ancor lui composto da due rad. quadre a similitudine del C. perche i quadrati delle parti d'esso C. conueniene che siano numeri rationali accioche la loro differenza possa essere il 2. detto, che è numero rationale; Hora veduto che rad. 980. p. rad. 972. Binomio C. dato importa poco piu di 62. la rad. cuba del quale non arriua a 4. sapremo che il valore dell'A. non può arriua a 4. Onde conuerà trouare due rad. quadre, i numeri, cioè i quadrati delle quali siano different i in 2. & che la somma d'esse, cioè del valore loro non atriui a quattro, perche subito si vede, che faranno rad. 5. & rad. 3. & così diremo il Binomio A. douero essere rad. 5. p. rad. 3. quando però il C. dato sia cubo, come vedremo essere cubo, perche cubando rad. 5. p. rad. 3. se ne produce a punto rad. 980. piu rad. 972.

Et così si vede, che il cubo d'vn Binomio composto da due radici quadre è anch'egli Binomio composto sempre da due rad. quadre, & che conuersamente la rad. cuba d'vn Binomio composto da due rad. quadre è similmente vn Binomio composto da due rad. quadre; Ancora che il cubo d'vn Binomio composto da numero, & rad. quadra è similmente vn Binomio composto da numero, & r. q. Et che conuersamente la rad. cuba d'vn Binomio composto da numero, & r. q. è similmente Binomio composto da numero, & r. q. Et che se il Binomio è composto da r. q. & numero, ancora il suo cubo sarà composto da r. q. & numero. Et conuersamente che d'vn Binomio composto da rad. quadra, & numero, la sua rad. cuba è Binomio similmente composto da rad. quadra, & numero.

Cubisi 3. p. r. q. e. 5. Binomio A composto da numero rationale, & da r. q. e. Il suo Cubo è questo quadrinomio C. 27. piu rad. 3. piu (rad. q. e. 5. via 27.) piu r. cuba 5. via 9. Cioe rad. quadra cuba 1937102443. piu 27. piu rad. cuba 3645. piu rad. 5. Onde si vede, che in esso Quadrinomio

mio, composto da r. q. c. da r. c. da nu. & da r. q. douendo egli essere c. conuerrà, che la sua r. c. sia vn Binomio A, composto da numero, & r. q. c. i dui nomi del quale faranno le rad. cube del nu. rationale, & della r. q. del quadrinomio, cioè le r. cubi di 27. & di r. 5. che sono 3. & r. q. c. 5. & giunte insieme formano 3 più r. q. c. 5.

Cubifi $\frac{1}{2}$ r. q. c. 3 più $\frac{1}{2}$ q. c. 2. Binomio A. composto da due $\frac{1}{2}$ r. q. c. Il suo cubo di questo quadrinomio C. r. 3. p. r. 2. p. (r. q. c. 9. via $\frac{1}{2}$ r. q. c. 2. via 3.) più $\frac{1}{2}$ r. q. c. 4. via $\frac{1}{2}$ r. q. c. 3. via 3.) cioè $\frac{1}{2}$ r. q. c. 13122. più $\frac{1}{2}$ r. q. c. 8748. più 2. Onde si vede che in esso quadrinomio composto da due rad. q. cub. & da due rad. q. douendo egli essere cubo, conuerrà, che la sua rad. cuba sia vn Binomio A. composto da due $\frac{1}{2}$ r. q. c. i dui nomi del quale faranno le rad. cube delle due r. q. del quadrinomio, cioè le r. cube di rad. 3. & di rad. 3. che sono $\frac{1}{2}$ r. q. c. 3. & $\frac{1}{2}$ r. q. c. 2. & giunte insieme formano $\frac{1}{2}$ r. q. c. 3. più $\frac{1}{2}$ r. q. c. 2.

Et se partiremo il dato Binomio $\frac{1}{2}$ r. q. c. 3. più $\frac{1}{2}$ r. q. c. 2. per la sua prima parte $\frac{1}{2}$ r. q. c. 3. ne deriuará 1. più $\frac{1}{2}$ r. q. c. 2. B. quale cubandolo ne deriuará il quadrinomio $\frac{1}{2}$ r. q. c. 486. più $\frac{1}{2}$ r. cuba 18. più 1. più rad. $\frac{1}{2}$. Questo mò li moltiplicará per il cubo di $\frac{1}{2}$ r. q. c. 3. partitore adoprato, cioè per rad. 3. & se ne produce $\frac{1}{2}$ r. q. c. 13122. più r. q. c. 8748. più rad. 3. più rad. 2. che è il cubo d'A.

Ma partendo il Binomio A. per la seconda sua parte r. q. c. 2. ne deriuará rad. q. c. $\frac{1}{2}$. più 1. che che è il B. il Cubo del quale è questo quadrinomio D. r. $\frac{1}{2}$. più r. più $\frac{1}{2}$ r. q. c. 40. più r. q. c. 1093. $\frac{1}{2}$. quale si moltiplicará per r. 2. (Cubo del partitore r. q. c. 2.) & se ne produrrá il cubo d'A. cioè il quadrinomio r. 3. più r. 2. più r. q. c. 13122. più r. q. c. 8748.

Cubifi r. 3. più r. q. c. 2. Binomio A. composto da r. q. & da r. q. c. Il cubo della prima parte è r. q. 27. Il cubo della seconda è r. q. 2. Il quadrato della prima parte è 3. ò rad. q. 9. cioè r. q. c. 729. da moltiplicare per la seconda parte rad. q. 2. & fa r. q. c. 1458. quale si tripla, cioè si moltiplica per rad. q. c. 729. & fa rad. q. c. 1062882. Il quadrato della seconda parte è rad. cuba 2. ò r. q. c. 4. da moltiplicare per la prima parte rad. 3. ò per rad. q. c. 27. & fa r. q. c. 108. quale si tripla, cioè si moltiplica per rad. q. c. 729. & fa rad. q. c. 78732. Onde il totale cubo del Binomio A. sarà rad. quad. c. 10162882. più rad. q. c. 78732. più rad. q. c. 27. più rad. q. 2. che è vn quadrinomio C. composto da due rad. q. c. & da due rad. q. Onde si vede che in esso quadrinomio composto da due rad. q. c. & da due r. q. douendo egli essere cubo conuerrà, che la sua rad. cuba sia vn Binomio A. composto da vna rad. q. & da vna r. q. c. i dui nomi del quale faranno le r. cube delle due r. q. che si trouano nel quadrinomio, cioè le rad. cube di r. q. 27. & di rad. q. 2. che sono r. q. c. 27. cioè r. q. 3. & r. q. c. 2. & giunte insieme formano r. 3. più r. q. c. 2.

Et se dato il Binomio A. r. 3. più r. q. c. 2. lo partiremo per la sua prima parte rad. 3. ne deriuará r. più r. q. c. $\frac{1}{2}$. Binomio B. il cubo del quale è 1. più rad. $\frac{1}{2}$. più rad. q. c. 54. più r. q. c. 4. (che è r. cuba 2.) questo quadrinomio 1. p. r. $\frac{1}{2}$. p. r. q. c. 54. p. r. c. 2. che è il cubo del B. si moltiplichi hora per r. 27. cubo della rad. 3. partito. e adoprato, & fa r. 27. p. r. 2. p. r. q. c. 1062882. p. r. q. c. 78732. che è il quadrinomio C. cubo del Binomio A. dato.

Che partendo il dato A. per r. q. c. 2. sua minor parte, egli si ridurrá a r. q. c. 13122. più 1. B. il cubo del quale è r. 13122. p. r. 1. p. r. cuba 3641. p. rad. q. c. 9841. questo quadrinomio D. a moltiplicare q. mo hora per r. cubo di rad. q. c. 2. partito. e adoprato, & se ne produce rad. 27. p. r. 2. p. rad. q. c. 1062882. p. rad. quad. c. 78732. che è il Quadrinomio C. cubo d'A. dato.

Si può auerire, che nel Quadrinomio C. i dui numeri delle sue rad. q. c. ritengono fra loro la proportionc istessa, che hanno i dui numeri delle sue due rad. q. cioè hora di 27. a 2. ò vogliamo dire perciò che hanno i numeri de i cubi delle due parti del Binomio A. dato (le quali essendo r. 3. & r. q. c. 2. & però i loro cubi r. 27. & rad. 2. i num. d'esse sono 27. & 2.) perche il minore 78732. deriuu da moltiplicare 108. via 729. qual 729. è sempre il q. c. di 3. & il maggiore 1062882. deriuu da moltiplicare 1458. via 729. qual 729. è pure sempre l'istesso q. c. di 3. onde remouo questo 729. da ciascuna banda si vede, che il minore numero 78732. al maggiore 1062882. doue hauere la proportionc di 108. a 1458. Di questi il 108. nasce a moltiplicare 27. cubo del 3. numero della rad. della prima parte via 4. duto di 2. numero della rad. q. c. della seconda parte nel medesimo 2. cioè il 108. nasce da moltiplicare 27. via 2. via 2. Et il 1458. nasce dal 729. quadro cubo del 3. numero della r. della prima parte, cioè da 27. via 27. che è il cubo del numero della prima par. via 27. moltiplicato via 2. numero della r. q. c. della seconda parte. Cioè 16108. è prodotto da 27. via 2. via 2. Et il 1458. è prodotto da 27. via 27. via 2. onde remouo 27. via 2. da ciascuna banda, resta dalla parte del 108. solo 2. & dalla parte del 1458. solo 27. onde dal 108. al 1458. viene ad essere come da 2. a 27. ma questi 2. & 27. ò 27. & 2. sono i num. delle rad. 27. & r. 2. cubi delle due parti rad. di c. 3. & r. q. c. 2. del Binomio A. dato però è chiaro, che i dui numeri delle due rad. q. c. del quadrinomio C. hanno fra loro la proportionc delli dui numeri 27. & 2. delle due rad. q. che sono i cubi delle due parti del Binomio A. Onde il 27. essendo volte 13 $\frac{1}{2}$. quanto il 2. si conosce, che è nato

nato

uato il numero 78731 della minor R. q. c. del quadrimio (che nasce a moltiplicare il quadrato della parte minore, per il triplo della parte maggiore) moltiplicandolo per detto 131, il prodotto 1061881, farà il numero della maggiore R. q. c. d'esso quadrimio.

Cubifi $\text{R. 24. p. R. q. c. 54.}$ Binomio A. composto da vna R. q. & da vna R. q. c. .

Il cubo della prima parte è R. 13824. Il cubo della seconda parte è R. 54. quale è comunicante con R. 13824. (& però si possono sommare insieme.) Che 24. numero della R. q. è come da numero quadrato a numero quadrato con 54. numero della R. q. c. che v'entra per 24. che è numero quadrato. & la sua R. q. è 1. ò vogliamo dire il 24. al 54. ha proportionione quad. cioè di denominatore quadrato perche il dutto loro 1296. è numero quadrato (che ha 36 per R. q. ò pure perche a partire così il 24. come il 54. per vn medesimo 6. ne vengono 4. & 9. ambidui quadrati. Onde perche R. 24. via R. 24. è quanto $\text{R. 6. via 2. via R. 6. via 2.}$ & li 2. via 2. via 2. fa 8. Et le $\text{R. 6. via R. 6. via R. 6.}$ è quanto 6. via R. 6. haueremo 8. via 6. via R. 6. cioè 48. volte R. 6. Ancorà $\text{R. 54. è R. 6. via 9.}$ cioè R. 6. via 3. cioè 3. volte R. 6. perche sommati con l'altra, che è 48. volte R. 6. fa 51. volta R. 6. cioè R. 2601. via rad. 6. che produce rad. 15606. Et questo è la somma de i cubi delle due parti del Binomio A.

Et così si vede, che il numero della rad. quadra, al numero della R. q. e. hauerà proportionione come da numero quadrato a numero quadrato, ò vogliamo dire, che a moltiplicare l'vn numero per l'altro il prodotto sia numero quadrato; Ouero che a partire l'vn numero per l'altro, l'aumento sia numero quadrato, all'hora i cubi delle due parti del Binomio dato, quali cubi faranno due rad. quadre, faranno comunicanti, ò commensurabili fra loro, & però si potranno sommare insieme, & ridurre ad vna sola quantità. Et seguendo il quadrato di rad. 24. prima parte è 24. & il suo triplo è 72. da moltiplicare per R. q. c. 54. seconda parte, cioè $\text{R. q. c. 139314069504.}$ via R. quad. cuba 54. che fa rad. quad. cuba 7522959753216.

$$\begin{array}{r}
 676 \\
 176 \\
 \hline
 \text{rad. quadra cuba } 331776 \\
 7941624 \\
 \hline
 \text{rad. quadra cuba } 91102976 \\
 \text{rad. quadra cuba. } 54 \\
 \hline
 1719926784 \\
 \hline
 \text{rad. quadra cuba } 10319760804 \\
 729 \\
 \hline
 92876046116 \\
 743008380688 \\
 \hline
 \text{rad. quadra cuba } 7522959753216
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{rad. quadra cuba } 2916 \\
 \text{via rad. quadra cuba } 729 \\
 \hline
 26144 \\
 209952 \\
 \hline
 \text{rad. quadra cuba } 2125764 \\
 \text{via rad. quadra cuba } (24. \text{ via } 24. \text{ via } 24.) \\
 \hline
 51018336 \\
 1224440064 \\
 \hline
 \text{rad. quadra cuba } 29386561536 \\
 5184 \\
 72 \\
 \hline
 61208 \\
 373147 \\
 373148 \\
 \hline
 \text{rad. quadra cuba } 139314069504 \\
 \text{via rad. quadra cuba } 54 \\
 \hline
 1233816625536 \\
 \hline
 \text{radice quadra cuba } 7522959753216
 \end{array}$$

Ancora il quadrato di R. q. c. 54. seconda parte è R. q. c. 2916. il suo triplo, cioè il suo dutto via $\text{R. q. c. 729. è R. q. c. 2124764.}$ da moltiplicare per la prima parte, che è R. 24. cioè R. q. c. 13824. & far $\text{R. q. c. 26386561536.}$ & così haueremo per totale prodotto ò cubo del dato Binomio A. il Trinomio rad. 15606. p. $\text{R. q. c. 29386561536.}$ p. $\text{R. q. c. 7522959753216.}$

Et qui si può auertire, che i due numeri delle due R. q. c. del Trinomio C. hanno fra loro la proportionione de i due numeri delle due rad. quadre, che mostrano i cubi delle due parti rad. 24. & R. q. c. 54. del Binomio A. quali cubi sono rad. 13824. & rad. 54. & da 13824. a 54. è la proportionione di 256. ad 1. & però trouato il numero della minore R. q. c. del Trinomio, moltiplicando per 256. ò vogliamo dire per 16. via 16. il prodotto farà il numero della maggiore R. q. c. dell'istesso Trinomio C.

Ancora per cubare il dato Binomio A. rad. 24. p. R. q. c. 54. noi partendolo per rad. 24. a prima parte lo ridurremo al B. 1. p. R. q. c. 2. & 1. & 4. cioè ad 1. p. R. q. c. 2. & 1. & 4. cioè ad 1. p. R. c. 1. & 1. & 4. que-
I fio B.

no B. mò cubaremo, & fa $1 \frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ (3. via r. c. $\frac{1}{6}$ cioè r. c. 27. via r. c. $\frac{1}{6}$ che fa rad. cu. $1 \frac{1}{2} \frac{1}{6}$.
Et p. B. cuba $\frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ via 3. cioè via rad. cuba 27. che fa rad. cuba $\frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$. Onde il cubo tot. le
di B. è $1 \frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ p. rad. cuba $1 \frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ p.
rad cuba $\frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ Trinomio D. da
moltiplicare per il cubo di r. 24.
n che è rad. 13824 & fa r. 15606.
p. r. q. c. 39386561536 p. r. q. c.
7532959753216.

rad. $\frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ cioè rad. $1 \frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ via rad. 13829
1738

54
fa rad. 15606

Et rad. cuba $\frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ è r. q. c. $\frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ via rad. 13824.
via 256

fa rad. quadra cuba 729. via 13824. via 13824. via 13824.
efimo di 256. via 256
cioe efimo di 16. via 16. via 16. via 16.

Cioe fa rad. quadra cuba (729. via 864. via 864. via 54.

864
864
746496
19366
4478976
368738356
6718464
2239488

Cioe rad. quadra cuba 29386561536 r

470184984578

rad. quadra cuba 7532959753216 r

729
54
39366

Ancora rad. cuba $1 \frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ cioè
rad. cuba $\frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ via rad. 13824.
Onde perche r. cuba $\frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ è vol-
te rad. cuba 16. quanto rad. cu-
ba $\frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ già adoprata a troua-
re il prodotto e si vede, che il
prodotto che si cerca, & sia r. si
prouarà facilmente, multipli-
cândo il già trouato e per det

ta rad. cuba 16. che è r. q. c. 256. onse moltiplicando il numero della r. q. c. del r. per 16. & il pro-
dotto per 16 ne resularà il numero della r. q. c. dell' r. cercato.

Et se hauesimo partito il dato Binomio A. per la sua seconda parte rad. quadra cuba 54. si fa-
ria ridotto a rad. q. c. (14. via 24. via 24.) che è r. q. c. (4. via 576.) che è r. q. c. 256.
cioe rad. cuba 16. che 54 è la prima par 9. te del B. & l'altra faria 1. però il B. fa-
ria rad. cuba 16. p. 1. Et questo cubandolo fa 17. p. rad. cuba 6912. p. rad. cuba 432. che è il D. da
moltiplicare per il cubo di r. q. c. 54. n qual cubo è rad. 54. & fa r. 15606. p. r. q. c. 7532959753216.
p. r. q. c. 29386561536 che è Trinomio C. cubo del dato Binomio A.

Da quanto s'è operato nel cubare questi Binomij contenuti da r. q. & r. q. c. si conosce, che quã-
do il numero della r. q. al numero della r. q. c. haueà proportioni di denominatore quadrato, al-
l' hora il cubo del Binomio A. farà vn Trinomio contenuto da vna r. q. & da due r. q. c. Che il Bi-
nomio A. all' hora si potrà ridurre a Binomio contenuto da numero, & rad. cuba. Ma quãdo nel
Binomio A. il numero della r. q. al numero della r. q. c. non habbi proportioni e come da numero
quadrato a numero quadrato, all' hora il cubo d' esso Binomio A. farà vn quadrinomio contenuto
da due r. q. & da due r. q. c. Che detto Binomio A. all' hora si ridurrà a Binomio contenuto da nu-
mero, & da r. q. c.

Ancora cubifi r. q. c. 24. p. r. q. 54. Binomio A. composto da due r. q. c.

Il cubo della prima parte è rad. 24. Il cubo della seconda parte è rad. 54. quale è comunican-
te con rad. 24. & però si possono sommare insieme, che 24. numero dell' vna, hà proportioni con
54. numero dell' altra, come da numero quadrato a numero quadrato, cioè partendo 54. per 24. ò
24. per 54. ciascuno de' dui auenimenti $1 \frac{1}{2}$. & $\frac{2}{3}$. è numero quadrato. Ouero moltiplicando in-
sieme essi 24. & 54. il prodotto loro 1296. è numero quadrato. Et così si vede, che sempre che i
dui numeri delle r. q. c. de' dui nomi, ò parti del Binomio dato produrranno numero quadrato, ò
che partendo l'vno per l'altro ne venga numero quadrato, all' hora i dui cubi delle parti del Bino-
mio si potranno sommare insieme; Onde hora rad. 24. & rad. 54. giunte insieme faranno r. 150.
Dipoi il quadrato della prima parte, che è r. q. c. 576. moltiplicato via la seconda parte r. q. c. 54.
& il prodotto triplato fa r. q. c. 22674816. Et il quadrato della seconda parte r. q. c. 2916. moltip-
licato via la prima parte, fa r. q. c. 69984. & questo triplato (cioe moltiplicato via r. q. c. 729)
fa r. q. c. 5108336.

(Et si può notare, che i numeri di queste due rad. quadre cube trouate, ristengono fra loro la
pro-

rad. quadra cuba 576;
via rad. quadra cuba 54.
fa rad. quadra cuba 729.
via rad. quadra cuba 729.
fa rad. quadra cuba 23674816.

rad. quadra cuba 3916;
via rad. quadra cuba 24.
fa rad. quadra cuba 69984.
via rad. quadra cuba 729.
rad. quadra cuba 51018336.

proportione che hanno
i numeri 24. & 54. delle
due r. q. c. parti del Bi-
nomio che si adoprano
(perche il num. 31104.
nasce da 24. via 24. via

54. Et il numero 69984. nasce da 54. via 54. via 24. onde dal primo al secondo, è come dal pro-
dotto de tre primi al prodotto de tre secondi, per il che così da i tre primi, come dalli tre secondi
levato vn 24. & vn 54. resta dalla prima banda solo 24. & dalla seconda solo 54. quali perciò mo-
strano che li due prodotti, & perciò anco i tripli loro doueranno hauere la proportion de essi re-
stanti 24. & 54. che schifato douentano anco 4. & 9. cioè il maggiore contiene il minore volte 2 $\frac{1}{2}$.
ouero conuersamente il minore è li $\frac{2}{3}$. del maggiore, però trouato l'vno, si può facilmente trouar
l'altro, che se haueremo il minore 23674816. lo moltiplicheremo per 2 $\frac{1}{2}$. cioè per $\frac{3}{2}$. cioè prefo-
nel $\frac{1}{2}$. che è 5668704. lo moltiplicheremo per 9. & ne resterà 51018336. Et bñ si vede anco per
la medesima causa nel cubo del Binomio r. q. c. piu r. q. c. 2. già trouato di sopra che i num. 13122.
& 8748. delle due r. q. c. che entrano nel quadrinomio C. (cubo d'esso Binomio) hanno fra loro
la proportion de 3 a 2. num. delle due r. q. c. del Binomio cubato, onde trouato il minore 8748.
giouendo ad esso 4374. sua mità se ne formerà il maggiore 13122. Et così queste tre quanti-
tà trouate poste insieme, formaranno r. q. c. 51018336. piu r. q. c. 23674816. piu rad. 150. che è il
Trinomio C. cubo del Binomio A. dato.

Et se partiremo il dato Binomio A. r. q. c. 24. piu r. q. c. 54 per la sua prima parte r. q. c. 24. egli
si ridurrà ad 1. piu r. q. c. 2 $\frac{1}{2}$. cioè ad 1. piu rad. cuba 1 $\frac{1}{2}$. Binomio B. quale cubandolo produrrà 2.
 $\frac{1}{2}$. piu rad. cuba 40 $\frac{1}{2}$. piu rad. cuba 60 $\frac{1}{2}$. che è vn Trinomio D. da moltiplicare hora per r. q. c. 24.
cubo del partitore adoprato, & se ne produrrà rad. 150. piu r. q. c. 23674816. p. r. q. c. 51018336.
che il Trinomio C. cubo del Binomio A. dato.

Ma partendo il Binomio A. per l'altra sua parte rad. cuba 54. egli si ridurrà ad 1. pin r. q. c. $\frac{2}{3}$.
cioè ad 1. p. r. q. c. $\frac{2}{3}$. Binomio B. quale cubato fa 1 $\frac{2}{3}$. piu r. c. 18. p. r. c. 12. Trinomio D. da moltiplica-
re hora per r. q. c. 24. cubo del partitore adoprato, & se ne produrrà r. 150 p. r. q. c. come di sopra.

Et così si vede, che dato vn Binomio A. composto da due r. q. c. se i numeri d'esse hauendo fra
loro proportion quadrata, cioè che il denominatore della loro proportion sia numero quadra-
to (che perciò egli si potrà ridurre a Binomio contenuto da num. & rad. cuba) all' hora il cubo
d'esso Binomio sarà vn Trinomio C. contenuto da vna r. q. c. & da due r. q. c. i due numeri delle qua-
li haueranno fra loro la proportion istessa quadrata, che hanno anco fra loro i due numeri delle
due r. q. c. che sono le due parti del Binomio A. Et la r. q. c. del C. sarà quello che nasce a somare insieme
come r. q. c. le due parti dell' A. cioè il numero della r. q. c. del C. sarà quello che nasce a moltiplicare
il numero della minor r. q. c. dell' A. in quello che resta a quadrare il numero, che deriva a gion-
gere 1. al numero, che è r. q. del numero, che viene a partir il numero della maggior r. q. c. dell' A.
per il numero della minore sua r. q. c.

Onde dato il Trinomio C. 150. piu r. q. c. 23674816. piu
r. q. c. 51018336. da trouarne se egli è cubo la sua rad. cuba, che douerà essere vn Binomio compo-
sto da due r. q. c. i numeri delle quali doueranno hauere proportion quadrata, fra loro, & quel-
la istessa che hanno i numeri delle due r. q. c. del Trinomio C. dato, qual proportion paragonan-
do il maggiore al minore, hà per denominatore D. 2 $\frac{1}{2}$. numero quadrato, che hà per rad. quadra
1 $\frac{1}{2}$. al quale gionto sempre 1. fa 2 $\frac{1}{2}$. il quad. del quale è 6 $\frac{1}{4}$. con questo 6 $\frac{1}{4}$. si douerà partire 150.
numero della r. q. c. del C. dato, & ne viene 24. che è numero della r. q. c. minore dell' A. quale si mol-
tiplicherà per 2 $\frac{1}{2}$. denominatore D. detto, & fa 54. & questo douerà essere il numero della rad. q. c.
maggiore dell' A. per il che egli farà r. q. c. 54. piu r. q. c. 24. cioè per trouare i due numeri 54. & 24.
delle due r. q. c. parti dell' A. conuien trouare due numeri tali, che partito il maggiore per il mino-
re, ne venga il 2 $\frac{1}{2}$. num. quadrato è denominatore della proportion de i due numeri delle r. q. c.
del Trinomio C. & alla sua r. q. 1 $\frac{1}{2}$. gionto 1. & con il quad. 6 $\frac{1}{4}$. della somma moltiplicato il mi-
nore, il prodotto sia 150. numero della r. q. c. del Trinomio C. che per trouarli ponendo il minore ef-
sere 1. & il maggiore sarà 2 $\frac{1}{2}$. & che a partire il maggiore per il minore, ne viene il 2 $\frac{1}{2}$. dato, la r.
del quale è 1 $\frac{1}{2}$. & giontoli 1. fa 2 $\frac{1}{2}$. che quadrato fa 6 $\frac{1}{4}$. con il quale moltiplicato il minore 1. &
fa 6 $\frac{1}{4}$. & questo deu essere 150. però è eguale a 150. onde partito esso 150. per 6 $\frac{1}{4}$. numero del
le 1. l'auenimento 24. è il valore della 1. & però è il numero minore, posto 1. & il maggiore posto
2 $\frac{1}{2}$. & sarà 60. dalla qual positione operatione Algebratica se ne può dedurre la regola ò modo
simplice numerale sopra detto.

Ancora si vede nel cubare A. r. q. c. 3. piu r. q. c. 2. Binomio poco di sopra cubato, che dato vn
Binomio A. contenuto da due r. q. c. i numeri delle quali non habbino proportion quadrata fra
loro,

loro che perciò esso Binomio A non si potrà ridurre a Binomio cōtenuto da num. & R. cuba, ma si ridurrà bene a Binomio contenuto da numero, & r.q.c. all' hora il cubo del Binomio A. dato, non potrà mai essere Trinomio, ma farà vn quadrinomio cōtenuto da due rad. quadre, & da due rad. quadre cube.

Ancora per acquistare maggior pratica dicendosi. Cubifi A. rad. 3. piu r.q.c. 12. Noi sapremo il cubo della prima parte essere rad. 3. volte 3. Il della seconda è rad. 12. cioè rad. 3. volte 2. che con rad. 3. volte 3. cubo della prima parte, fa rad. 3. volte 5. & però la somma è rad. 75. Onde si vede che essa somma si può trouare facilmente dicendo 3. numero della rad. quadra in 12. numero della r.q.c. entra 4. volte (che è numero quadrato) la radice del quale è 2. che si giugge a 3. numero della r.q.c. & fa 3. numero da moltiplicare per la r.q. 3. cioè r. 25. via r. 3. & fa r. 75. che è la somma de' cubi delle due parti del Binomio.

(Et notifi, che questo modo si può notare sempre, quando anco a partire il numero della radice quadra cuba, per il numero della radice quadra non ne venisse numero quadrato, se bene all' hora la somma de' cubi delle due parti del Binomio non faria una sola quantità, ma faria vn Binomio, come per esempio dato B. rad. 3. piu radice quadra cuba 2. da cubare, potremo dire 3. numero della radice quadra, in 2. numero della radice quadra cuba, entra 3. volte $\frac{1}{2}$. la radice quadra del quale è radice $\frac{1}{2}$ che si giugge a 3. numero della radice quadra, & fa 3. piu radice $\frac{1}{2}$. da moltiplicare per la radice quadra 3. & fa radice 27. pia radice 2. che è la somma de' i cubi delle due parti del B. dato, ma non ci occorre usare questo modo, quando il numero della radice quadra, nel numero della radice quadra cuba non entra per numero quadrato, poiche subito si conosce quanto è il Cubo di ciascuna delle due parti del B. & che essi due cubi non si possono sommare insieme se non con il termine piu.)

Ancora il quadrato della parte minore r.q.c. 12. è rad. cuba 12. il suo triplo è rad. cuba 324. che si moltiplica via rad. 3. parte maggiore, cioè r.q.c. 104076. via r.q.c. 27. & fa r.q.c. 2834352. che è la r.q.c. minore del Trinomio C. che hà da essere il cubo dell' A. Et perche il cubo di rad. 3. parte maggiore dell' A. è rad. 27. & il cubo della parte maggiore è rad. 12. & di questi due numeri di rad. il 12. minore entra nel 27. maggiore volte 2 $\frac{1}{2}$. con quello 2 $\frac{1}{2}$. moltiplicando il 2834352. numero della minore r.q.c. trouata del C. fa 6377292. & questo è il numero della r.q.c. maggiore del C. onde esso Trinomio C. cubo del Binomio A. dato farà rad. 75. piu r.q.c. 2834352. piu rad. q.c. 6377292.

Essendo ancora dato A. p. r.q.c. 32. ò vogliamo dire r.q.c. 32. p. rad. 2. da cubare, diremo 2. numero della rad. quadra, in 32. numero della r.q.c. entra per 16. numero quadrato la rad. del quale è 4. da giungere a 2. numero della r.q.c. & fa 6. che moltiplicare per la r. quadra 2. fa rad. quadra 72. che è la somma de' i cubi delle due parti dell' A. Et poi il quad. della parte minore dell' A. è 2. il suo triplo è 6. da moltiplicare per la parte maggiore r.q.c. 32. cioè r.q.c. 46656. via r.q.c. 32. & fa r.q.c. 1492992. che è la r.q.c. minore del Trinomio C. (cioè quella che deriuaua dal quadrato della parte minore dell' A.) Et per trouare il numero della r.q.c. maggiore, diremo il cubo da rad. 2. parte minore dell' A. è rad. 8. & il cubo di r.q.c. 32. parte maggiore è rad. 32. di questi il numero 8. della minore entra nel numero 32. della maggiore volte 4. Con questo 4. si moltiplichino il numero 1492992. trouato della minore r.q.c. del C. & fa 597198. che è il numero della r.q.c. maggiore; Onde il Trinomio C. cubo del Binomio A. dato farà r. 72. p. r.q.c. 1492992. piu r.q.c. 597198.

Et hauendo rad. 3. piu r.q.c. 3. Binomio A. da cubare; Si vede che 3. numero della r.q.c. entra volte 1. la rad. del quale r. è 1. da giungere a 3. numero della r.q.c. & fa 4. da moltiplicare per essa rad. quadra 3. & fa rad. 48. che è la somma de' i cubi delle due parti dell' A. Ancora il quadrato di r.q.c. 3. parte minore dell' A. rad. cuba 3. il suo triplo è r. cuba 81. da moltiplicare con rad. 3. parte maggiore, cioè r.q.c. 6561. via r.q.c. 27. & fa r.q.c. 177147. che è la r.q.c. minore del Trinomio C. Et per trouare l'altra maggiore diremo i cubi delle due parti dell' A. sono r. 27. & r. 3. il 3. num. della rad. minore in 27. numero della maggiore entra volte 9. però con questo 9. si moltiplichino il 177147. num. della r.q.c. minore del C. & fa 1594323. che è il numero della r.q.c. maggiore del Trinomio, però esso Trinomio cubo del Binomio A. dato, farà rad. 48. p. r.q.c. 177147. piu r.q.c. 1594323.

Et se ci fusse proposto il Binomio C. 1320. piu rad. 1125000. da pigliarne la rad. cuba; noi per adoprare numeri piccoli più comodi, potremmo partirlo per qualche numero comodo a beneplacito, & hōra sia 10. che ne verrà 132. piu rad. 11250. Et questo anco si può comodamente partire per 3. & hōra per il principal C. verrà ad essere partito per 30. & ne viene 44. piu rad. 1230. Di questo hōra, & chiamiamolo D. potremo pigliare la R. cuba, che sia G. che perciò cauando

quadrato della minor parte da 1916 quadrato della maggiore resta 686. che la sua rad. cuba è rad. cuba 686. quale deu' essere la differenza de' quadrati delle due parti del Binomio G. che cerchiamo. Et perche il D importa circa a 79. il G. sua r. cuba douerà importare circa a rad. cuba 79. & delle sue due parti la prima essere rad. cuba di numero intero (ò con rotto d'1.) il quadrato della quale superi il quadrato della seconda parte, che faria $\sqrt[3]{q.c.}$ in rad. cuba 686. Onde dal caure il quadrato della seconda parte, qual quadrato sarà rad. cuba dal quadrato della prima parte, che sarà pure rad. cuba douendo restare rad. cuba 686. comerrà che così il quadrato della prima parte come il quadrato della seconda sia comunicante a detto restante rad. cuba 686. (& anco essi dui quadrati delle due parti douanno essere comunicanti fra loro) & perche le rad. cube comunicanti fra loro sono tali, che hanno proportioni fra loro come da numero cubo, a numero cubo, vediamo che la rad. cuba 686. differenza de' quadrati delle due parti deu' ha uere proportioni a ciascuno d'essi dui quadrati, come da numero cubo, a numero cubo; questo auertito se diremo la prima parte del Binomio G. essere poniamo rad. cuba 30. il suo quadrato sarà rad. cuba 900. che paragonato a rad. cuba 686. non gli è comunicante, perche a partire rad. cuba 686. per rad. cuba 2. ne viene $\sqrt[3]{q.c.}$ 343. che è 7. numero rationale, per essere 343 numero cubo; ma a partire rad. cuba 900. per la istessa $\sqrt[3]{q.c.}$ 2. ne viene $\sqrt[3]{q.c.}$ 450. che non si può descriuere per numero rationale, non essendo 450. numero cubo, vediamo dunque che il quadrato della prima parte del G. deu' essere tale, che partito il numero della sua $\sqrt[3]{q.c.}$ per 2. l'auenimento sia numero cubo (come auuenne similmente a partire il 686. numero della $\sqrt[3]{q.c.}$ 686. per 2. numero della $\sqrt[3]{q.c.}$ partitore;) Onde potremo ponere che la prima parte sia $\sqrt[3]{q.c.}$ 28. ò $\sqrt[3]{q.c.}$ 32. ò $\sqrt[3]{q.c.}$ 34. ò $\sqrt[3]{q.c.}$ 36. ò simili quantità, che preso $\sqrt[3]{q.c.}$ 28. il quadrato di 28. è 784. la metà 392. del quale non è numero cubo, & il quadrato di 36. è 1296. la metà 648. del quale non è numero cubo, ancora il quad di 34. è 1156. la metà 578. del quale non è numero cubo (non occorre tentare $\sqrt[3]{q.c.}$ 6. ò altre minori perche i loro quadrati sono minori di r. c. 686. che deu' essere la differenza detta de' dui quadrati.) Ma di 32. il quad. è 1024. la metà del quale 512. è num. cubo, perche preso per prima parte $\sqrt[3]{q.c.}$ 32. il suo quad. $\sqrt[3]{q.c.}$ 1024. è comunicante a $\sqrt[3]{q.c.}$ 686. entrando dunque questa $\sqrt[3]{q.c.}$ 686. da r. c. 1024. vedremo fe poi il restante possa essere il quad. della seconda parte: Onde perche $\sqrt[3]{q.c.}$ 32. in $\sqrt[3]{q.c.}$ 1024. entra per $\sqrt[3]{q.c.}$ 512. che è 8. Et la istessa $\sqrt[3]{q.c.}$ 32. in $\sqrt[3]{q.c.}$ 686. entra per r. c. 343. che è 7. vediamo che la medesima $\sqrt[3]{q.c.}$ 32. entrerà nella differenza loro tante volte, quanto è la differenza de' numeri 7. & 8. cioè 1. volta, però 1. volta $\sqrt[3]{q.c.}$ 32. che produce la istessa $\sqrt[3]{q.c.}$ 32. farà la differenza di r. c. 1024. a $\sqrt[3]{q.c.}$ 686. & però anco $\sqrt[3]{q.c.}$ 686. farà la differenza che è da $\sqrt[3]{q.c.}$ 32. trouata a $\sqrt[3]{q.c.}$ 1024. cioè a cauare $\sqrt[3]{q.c.}$ 686. da $\sqrt[3]{q.c.}$ 1024. resterà $\sqrt[3]{q.c.}$ 32. perche dunque questi dui quadrati $\sqrt[3]{q.c.}$ 1024. & r. c. 2. sono differenti fra loro nella $\sqrt[3]{q.c.}$ 686. che ci bisogna, vedremo mo' fe le loro rad. quadre, che sono $\sqrt[3]{q.c.}$ 32. & $\sqrt[3]{q.c.}$ 2. possino essere le parti cercate del Binomio G. (che quanto alla grandezza loro $\sqrt[3]{q.c.}$ 32. è poco piu di 3. Et $\sqrt[3]{q.c.}$ 2. è poco piu d'1. & però la somma loro è poco piu di 4. come si ue de douere importare il Binomio G. che sappiamo douere importare circa a r. c. 79. che è pure poco piu di 4.) onde giungeremo il triplo del duto del quad. della seconda parte nella prima, cioè 12. con 32. cubo della primà. & fa 44. che è a punto la prima parte del 44. $\sqrt[3]{q.c.}$ 1250. Binomio D. come bisogna. Et anco l'altra parte trouandola al solito vedremo essere la r. 1250. come si ricerca, & così concluderemo il Binomio D. essere cubo, & la sua r. cuba essere il $\sqrt[3]{q.c.}$ 32. p. r. q. c. 2.

Questo G. mò moltiplicaremo per la $\sqrt[3]{q.c.}$ del 30. con che fù partito il C. quando si ridussil al D. & fa r. c. 960. p. $\sqrt[3]{q.c.}$ 1800. quale sarà la r. c. del dato C. 120 p. r. 12500.

Noti mò lo studente tutti questi discorsi, & modi, ne i quali mi sono molto diffuso, acciò egli possa hauere esatta diligenza d'ogni cosa, & farsi esperto, & pratico nell'operare facile, & breue.

Cubi Binomio A. r. c. 3. p. $\sqrt[3]{q.c.}$ 2. Il cubo della prima parte è 3. Il quadrato della seconda parte è r. c. che moltiplicato per la prima r. c. 3. fa r. c. 6. N. qual prodotto N. perche non è comunicante con 3. cubo della prima parte, ne manco il triplo d'esso N. cioè r. c. 162. sarà comunicante con esso 3. & però non si potrà sommare con esso se non con il segno piu, formando 3. piu r. c. 162. Onde il cubo del dato Binomio A. non sarà altrimenti vn'altro Binomio. Et seguendo si dirà il cubo della seconda parte $\sqrt[3]{q.c.}$ 2. è r. q. 2. Et finalmente il quadrato della prima parte, cioè r. c. 9. moltiplicato con la seconda r. q. c. 2. cioè rad. q. c. 81. via rad. quadra 2. fa rad. q. c. 162. & questo triplato, cioè moltiplicato via rad. quadra cuba 729. fa rad. q. c. 18098. che giunta a gl'altri tre prodotti trouati fe ne forma 3. piu rad cuba 162. piu rad. quadra 3. piu r. q. c. 18098. ò mettendogli per ordine rispetto al valore di esse quattro parti diremo, che sia r. q. c. 18098. piu rad. cuba 162. piu 3. piu rad quadra 2. & questo Quadrinomio Q. sarà il Cubo del dato Binomio A. Nel quale Quadrinomio composti di r. q. c. rad. cuba numero, & rad. quadra douendo essere cubo d'vno Binomio composto di rad. cuba, & rad. quadra ci si vede, che le due parti

K di tal

di tal Binomio doueranno essere le rad. cube del numero, & della rad. quadra del quadrinomio, cioè la rad. cuba del 3. che è rad. cuba 3. Et la rad. cuba del rad. quadra 3. che è rad. cuba quadra 2. & così si formerà subito il Binomio rad. cuba 3. più r. q. e. 3. quale acciò sia veramente rad. cuba del quadrinomio, cioè acciò che il quadrinomio sia veramete cubo, conuerà che l'altre due parti del quadrinomio si formino dal triplo del duto della r. c. 3. nel quad. di r. q. e. 3. Et dal triplo del duto della r. q. e. 2. nel quadrato della r. c. 3.

Se partiremo il Binomio A. rad. cuba 3. più r. q. e. 3. per rad. cuba 3. ne verrà 1. più r. q. e. $\frac{2}{3}$. Il cubo del quale sarà quello R. che deriuu a partire il quadrinomio Q. cubo del Binomio A. per 3. che è il cubo di rad. cuba 3. con il quale si è partito l'A. per deriuarne il B. onde partendo il Q. per 3. l'aumento r. q. e. 16. più rad. cuba 6. più 1. più rad. quadra $\frac{2}{3}$. sarà R. cubo di B.

13. rad. quadra 135. rad. cuba 169. via rad. quadra 5.

cioe rad. quadra cuba 28561

via rad. quadra cuba. 135.

rad quadra cuba 3570135

Si tripli, cioè via rad. quadra cuba 719

rad. quadra cuba 260262135

rad. quadra 15. cioè 5. via rad. cuba 13. fa rad. cuba 1635.

si tripla, & fa r. c. 42875.

Il Cubo è r. cuba 43875. $\dot{p}$ r. q. e. 260262135. $\dot{p}$ 13. più r. q. 135.

egli (sarà cubo) si troua la sua rad. cuba facilmente, perche ella è vn Binomio i due nomi del quale sono la rad. cuba delli due nomi del quadrinomio, che sono il numero, & la rad. quadra; perche hora del 13. & del r. q. 135. prese le rad. cube, che sono r. c. 13. & r. q. 5. & accompagnate insieme il composto rad. cuba 13. più radice quadra 5. è il Binomio A. che è rad. cuba del quadrinomio dato.

Trouisi la rad. cuba di 945. più rad. 504008. A. & fia C. Il quadrato di 945. è 893025. dal quale cauato 504008. quadrato della minor parte rehta 389017. la rad. cuba del quale è 73. numero rationale, però il C. che si cerca farà anch'egli Binomio contenuto similmente da numero, & r. q. come è l'A. i quadrati delle quali fue due parti faranno differenti in 73. Et la somma d'esse due parti, cioè il valore del Binomio C. douerà egli essere la rad. cuba in circa di 1655. in circa, cioè manco di 12. (che il valore di A. è circa a 710 & 945. cioè circa a 1655.) perche si deue diuidere alquanto manco di 12. proposto in due parti tali, che i loro quadrati siano differenti in 73. dato (che per ciò sappiamo il quadrato della parte maggiore douere essere più di detto 73. & però ella più di 8 $\frac{1}{2}$.) & perciò mediante la regola data nel fine di carte si parturà 73. proposto per quasi 24. doppio di quasi 12. proposto, & ne viene più di 3. da giungere, & cauare a quasi 6. metà del quasi 12. proposto, & ne restano circa a 9. & 3. che faranno le due parti del quasi 12.

Et perche la prima parte deue essere numero rationale, & intero, o con rotto d' $\frac{1}{2}$. ella farà, o il 9. o 9 $\frac{1}{2}$. (che 8 $\frac{1}{2}$. non può essere. perche il suo quadrato non arriua a 73. non che lo superi in modo che il restante possa seruire per quadrato della parte minore) quanto al 9 $\frac{1}{2}$. che ha per quadrato 90 $\frac{1}{4}$. & però supera il 73. dato in 17 $\frac{1}{4}$. che faria il quadrato della parte minore, & però ella faria rad. 17 $\frac{1}{4}$. cioè più di 4. giungendola al 9 $\frac{1}{2}$. faria più di 13 $\frac{1}{4}$. che supera il valore del C. quale non arriua a 12. però offeso l'A. Binomio cubo conuerà che la parte maggiore del C. sia il 9. & perche dal suo quadrato 81. cauato il 73. (differenza de' quadrati) resta 8. conuerà che il quadrato della parte minore sia 8. & però che ella sia rad. 8. Et così Binomio C. r. cuba dell'A. (quando A. sia cubo) douerà essere 9. $\dot{p}$ r. 8. che bene vale alquanto manco di 12. come deue. Et cubandolo ci chiariremo interamente, che produce l'A. 945. $\dot{p}$ r. 504008.

Sia anco da eubare rad. 8. più rad. 6. Binomio A. contenuto da due rad. quadre. Il cubo della prima parte è rad. 512. cioè il prodotto del quadrato di rad. 8. che è 8. via effa rad. 8. Il quadrato della seconda parte rad. 6. è 6. & il suo triplo è 18 che moltiplicato via la rad. 8. prima parte (cioe rad. 32. via rad. 8.) fa rad. 2592. Questo si potrà sempre sommare con il cubo della prima parte hora rad. 512. perche effa rad. 512. è 8. volte la rad. 8. prima parte, & la rad. 2592. è 3. volte 6. cioè 18. volte effa rad. 8. che il numero 8. è sempre il numero della rad. della prima parte, & il numero 18. è sempre il triplo del numero 6. della rad. della seconda parte, onde la somma di rad. 512. co' rad. 2592. farà 8. & 18. cioè 26. volte la rad. 8. prima parte, & però farà il duto di rad. 676. via rad. 8. che fa rad. 5408. perche vediamo, che in questi Binomij contenuti da due rad. quadre facil-

facilmente si troua essa forma del cubo della prima parte, con il dutto d'essa prima parte nel triplo del quadrato della seconda, giungendo il numero della prima parte, con il triplo del numero della seconda, & la somma che e numero rationale, moltiplicare con essa prima parte al solito (cioe effo numero rationale ridurre a forma di radice, per moltiplicarlo con la prima parte, che e anch'ella rad.) che il prodotto sarà la prima parte di C. cubo del Binomio A dato qual C. sarà anch'egli vn Binomio contenuto da due rad. quadre come è l'A. l'altra parte di quello C. si trouarà pure facilmente per la medesima causa nel modo che s'è trouata la prima parte, cioe giungeremo il numero 6. della seconda parte d'A. con il triplo di 8. numero della prima parte, cioe cò 24. che fa 30. & questo moltiplicaremo per la seconda parte rad. 6. (cioe radice 900. via rad. 6.) che fa rad. 5400. quale è la seconda parte del Binomio C. però egli sarà rad. 5408. piu rad. 5400.

Et se conuerfamente dato il Binomio C. rad. 5408. piu rad. 5400. sene volessi trouare la sua rad. cuba (essendo egli cubo) noi cauando 5400. quadrato della parte minore da 5408. quadrato della parte maggiore resta 8. la rad. cuba del quale è 2. questo 2. per essere numero rationale, cioe senza denominatione di alcuna radice, ci fa conoscere, che essendo il dato Binomio C. cubo, ancora sarà la sua rad. cuba vn Binomio simile a lui, cioe contenuto da due rad. quadre come è esso C. & tali, che i loro quadrati faranno differenti in 8. Hora considerando, che questo Binomio C. è, o vogliamo dire importa circa a 147. vediamo che il Binomio A. sua rad. cuba importerà circa a r. cuba 147. cioe $5\frac{1}{2}$. & alquanto più, onde le due parti del Binomio A. giunte insieme doueranno valere alquanto più di $5\frac{1}{2}$. & i quadrati loro essere differenti in 2. diuerderemo dunque $5\frac{1}{2}$. & alquanto più in due parti tali, che i loro quadrati siano differenti in 2. & per farlo mediante la Aegola data noi con il doppio di $5\frac{1}{2}$. & alquanto più che è 10 $\frac{1}{2}$. & alquanto più, partiremo il 2. ouero (che resuita l'istesso) cò il solo $5\frac{1}{2}$. & alquanto più partiremo la mità di 2. cioe 1. & ne viene $\frac{1}{2}$. & alquãto mào, che gionto, & cauato a $2\frac{1}{2}$. & alquãto più mità del $5\frac{1}{2}$. ne risultano circa a $2\frac{1}{2}$. & $2\frac{1}{2}$. che ridotti a forma di r. (come deuono essere le parti del Binomio A. a similitudine delle parti del C.) sono circa a rad. 8. & rad. 6. Queste importano circa a $5\frac{1}{2}$. come ci bisogna, & i loro quadrati sono differenti in 2. come conuiene, però esaminandole, cioe con esse formando il Binomio rad. 8. piu rad. 6. & cubandolo; perche vediamo, che fa a punto rad. 5408. piu rad. 5400. che è il C. dato, diremo che il C. è cubo, & la sua rad. cuba essere rad. 8. piu rad. 6.

Partendo il Binomio C. rad. 5408. piu rad. 5400. per rad. 8. ne viene D. rad. 676. piu rad. 675. cioe 26. piu rad. 675. Et per la sua cuba d'essa rad. 8. partitore, cioe per rad. 2. partendo il Binomio A. rad. 8. piu rad. 6. (rad. cuba del C.) l'auuenimento B. rad. 4. piu rad. 3. cioe 2. piu 3. sarà la rad. cuba del D.

Et se partessimo il Binomio A. rad. 8. piu rad. 6. per 2. l'auuenimento F. rad. 2. piu 1. sarà la rad. cuba del Binomio G. che nasce a partire il C. per il cubo del 2. partitore dell'A. onde il G. sarà rad. 84 $\frac{1}{2}$. piu rad. 84 $\frac{1}{2}$.

Hora vogliamo mostrare all'amoreuole, & giudicioso Studente, come si possa concludere dimostratiuamente, che quando alcun Binomio C. è cubo, all'hora di necessitã la differenza de' quadrati delle due sue parti è il cubo della differenza de' quadrati delle due parti dell'A. che è la rad. cuba di esso C. però notifi il seguente discorso.

Cubisi 16. diuiso in 11. & 5. cioe in forma di Binomio così, 11. piu 5.

11 piu 5
sono differenti in 6

Cubo dell'11.
duto dell'11. nel triplo del
quadrato di 5.

1331

125. cubo del 5.

825

1815. duto di 5. nel triplo del
quadrato di 11.

2156

1940.

la differenza è 216.

I 825. si forma da 5. via 5. via 3. via 11. Cioe da 5. via 3. via 11. che è 165. via 5.

Il 1815. si forma da 11. via 11. via 3. via 5. Cioe da 5. via 3. via 11. che è 165. via 11.

Trouisi la differenza de' Cubi di 11. & 5.

11. & 5. la differenza n'è 6.

il triplo di 5. minore è 3. via 5. 11. via 6. via 3. via 5. fa 990. il cubo di n'è 216. la differenza de' cubi è 1206. cioe il cubo di n' differenza delle due parti, & 990. di piu, & sia X.

Ma perche 5. & 11. sono differenti in 6. n. ne segue, che la differenza del 1845. & 1815. sia quanto 165. via 6. che fa 990. Z. Ma il 165. già si è detto essere il duto di 11. via 5. via 3. però il 990. Z. è il duto di 11. via 5. via 3. via 6. cioè questo duto è la differenza de' dui numeri 825. & 1815.

Ancora il 990. X. che si trouò di sopra nel cercare la differenza de' cubi d' 11. & 5. si forma dalli istessi quattro numeri moltiplicati insieme, cioè è il duto di 11. via 5. via 3. via 6. perliche sempre quel 990. X. è eguale a quello 990. Z.

Ma la differenza 1206. de' cubi di 11. & 5. supera il suo 990. X. in 216. cubo del 6. differenza di 11. & 5. però supererà ancora l'altro 990. Z. differenza dell' 825. al 1815. nel medesimo 216. Hora considereremo che il 1256. si compone da 1331. cubo di 11. & da 825. Et il 1940. si compone da 125. cubo di 5. & da 1815. ma il 1331. è maggiore del 125. in 990. & nel 216. cubo di 6. n. (differenza d' 11. & 5.) onde si può dire che 1331. si compone da 990. 125. & 216. Et però il 2156. da 990. 125. & 216. & 825. Et quanto al 1940. egli si compone da 1815. che è quanto 990. & 825. Et anco da 125. onde si può dire che esso 1940. si compona da 990. 825. & 125. ma dalli istessi tre componenti, & da 216. di più, si compone il 2156. però il 2156. supera il 1940. nel 216. che è il cubo di 6. differenza di 11. a 5. Onde si conosce, che cubando vn Binomio A. & nascendone il Binomio C. all' hora la differenza delle due parti del C. farà il cubo della differenza delle due parti dell' A.

Ancora dato vn Binomio A. 11. più 5. il cubo del quale sia il Binomio C. 2156. più 1940. auuerà sempre, che i quadrati delle due parti del C. faranno differenti fra loro in vn numero, che farà il cubo della differenza de' quadrati delle due parti del Binomio A. onde hora che i quadrati d' 11. & 5. cioè 121. & 25. sono differenti in 96. (che è quanto il prodotto della somma di 11. & 5. (cioè di 16.) via 6. differenza de' medesimi 11. & 5.) il cubo di questo 96. (cioè hora 884736.) verrà ad essere la differenza de' quadrati 2156. & 1940. che si troua facilmente moltiplicando la somma d' essi 2156. & 1940. cioè 4096. (che è il valore del Binomio G.) via 216. differenza loro, & fa 884736.

La causa è, che essendo il 96. differenza de' quad. d' 11. & 5. il duto di 16. (somma di 11. & 5.) via 6. (differenza loro.) Et essendo l'884736. differenza de' quadrati di M. & N. il duto di 4096. (somma di M. 2156. & N. 1940.) via 216. (differenza loro.) perche il 4096. valore del composto di M. & N. è dalla costruzione il cubo di 16. valore del composto d' 11. & 5. Et il 216. differenza di M. & N. è (come si è mostrato) il cubo di 6. differenza d' 11. & 5. vediamo che a moltiplicare 6. via 16. che producono 96. si veggono a moltiplicare fra loro le due 16. cube di 4096. & di 216. che producono l'884736. ma quando i Cubi di dui numeri 16. & 6. si moltiplicano insieme il prodotto è anco il cubo del prodotto d' essi dui numeri 16 & 6. cioè è il cubo del 96. (come si dimostra in vniuersale nella proposizione seguente) perliche è chiaro, che l'884736. prodotto de' cubi di 16. & 6. è il cubo di 96. ma esso 884736. è la differenza de' quadrati di M. & N. & il 96. è la differenza de' quadrati di 11. & 5. però è similmente chiaro, che d' vn Binomio C. che sia il cubo d' vn dato Binomio A. la differenza de' quadrati delle due parti del C. è il cubo della differenza de' quadrati delle due parti dell' A.

Proposizione.

SE siano date quante quantità si vogliano da vna banda, & i loro quadrati, & i loro cubi, & i quadrati quadrati, & Relati, & Quadri enbi, &c. dall'altra; Ancora i prodotti delli Quadrati, & delli Cubi, &c. detti faranno similmente il Quadrato, & il cubo, &c. del prodotto delle prime quantità date. Siano dati per lati quante quantità si vogliano poniamo 3. 7. 5. 11. & i suoi quadrati siano 9. 49. 25. 121. Et i cubi 27. 343. 125. 1331. si dice che il duto del primo quadrato nel secondo quad. farà il quad. del duto del primo lato nel secondo lato; Et il duto del primo cubo nel secondo cubo sarà il cubo del duto del primo lato nel secondo lato. Et similmente il duto de i tre primi quadrati fra loro sarà il quadrato del duto de i tre primi lati fra loro; Et il duto de i tre primi cubi fra loro, sarà il cubo del duto de i tre primi lati fra loro; Ancora il duto delli quattro quadrati fra loro, sarà il quadrato del duto de i quattro lati ad essi corrispondenti fra loro; Et il duto de' 4. cubi fra loro, sarà il cubo del duto de' 4. lati ad essi corrispondenti fra loro.

fra loro ; Et così seguendo in infinito . Il che tutto si dimostrerà come segue .

fra loro; Et così seguendo in infinito. Ilche tutto si dimostrerà come segue. Presi i due primi lati 3. & 7. il loro duto è 21. cioè 3. via 7. I quadrati d'essi 3. & 7. sono 9. & 49. & il loro duto è 441. ma perche 9. si produce da 3. via 3. & 49. si produce da 7. via 7. si può dire, che 9. via 49. cioè che 441. si produce da 3. via 3. via 7. via 7. ma vn 3. via 7. produce 21. & l'altro 3. via 7. produce pure 21. onde 21. via 21. è quanto 3. via 3. via 7. via 7. Ma ancora 9. via 49. è quanto 3. via 3. via 7. via 7. però 9. via 49. è quanto 21. via 21. Quello 21. via 21. è il quadrato del duto di 3. via 7. però anco 9. via 49. cioè il duto di i due primi quadrati, quali duto è 441. farà il quadrato del duto di i due primi lati 3. & 7. fra loro; Et seguendo alli Cubi di detti primi lati, quali

Nel medesimo modo si potrà procedere a mostrare, che il numero, o quantità prodotta dalla moltiplicazione fra loro de' quadri quadrati del 3. & 7. è il quadro quadaato di 21. prodotti della moltiplicazione del 3. & 7. cioè che esso prodotto di quadri quadrati detti è quanto il duero di quattro 21. fra loro, cioè quito 21. via 21. via 21. via 21. Et così il duto de' primi relati di 3. & 7. sarà il primo lato di 21. duto d'elli 3. & 7. Et il medesimo similmente auerà ne i quadri cubine i fecondi relati ne i quadri, quadri quadrati. Ne i Cubi cubi; Et nelle simili seguenti dignità delle quantità in infinito. Onco veduro, facil-

Quello veduto, facil-

mente si moltrará, che anco il prodotto de i tre
primi quadrati, ò de i tre primi cubi, fra loro è il
quadrato, ò il Cubo de i tre primi lati fra loro,
che essendo essi tre primi lati 3. 7. 5, & il dutto
de' dui 3. & 7. effendo 21. intenderemo quello 21.

come vn solo lato, & il 5. come vn'altro lato, & adopraremo questi doi 21. & 5. in vece dell' tre 3. 7. & 5. che tanto è il prodotto de' doi 21. & 5. quanto è il prodotto dell' tre 3. 7. & 5. qual prodotto è 105. Et de i doi lati 21. & 5. siano i quadrati 441. & 25. che producono 110250. Et de i medefimi doi lati siano i Cubi 9261. & 125. che producono 117615. onde per quello che di sopra si

è mostrato concluderemo che il prodotto de' dui quadrati 441. & 25. è il quadrato del prodotto de' i dui lati 21. & 5. Et il prodotto de' i dui cubi

9271. & 125. è il cubo del prodotto istesso de i dui lati 21, & 5, ma il prodotto de i dui lati 21. & 5. è quanto il prodotto de i tre primi lati 3, 7, & 5. Er il prodotto de i dui quadrati 441. & 25. è quanto il prodotto de i tre quadrati 9. 49. 25. Et anco il prodotto de i dui Cubi 9261. & 125. è quanto il prodotto de i tre Cubi 27. 343. 125. però il prodotto de i tre primi quadrati, è il quadrato del prodotto de i tre primi lati, & il prodotto de i tre primi cubi, viene ad essere il cubo dell'istesso prodotto de i suoi tre primi lati.

Hora preli que'li 105. 11034. & 1157615. in vece dvn sol lato; Et del suo quadrato, & del
 suo Cubo, ad esso lato accompagnaremo il seguente lato del dati, & fia 11. & così formato il suo
 Quad. & il suo Cubo, & i prodottri de' dui lati, de i dui quadrati, & dedui Cubi, concluderemo pure
 nel medesimo modo, che il prodotto di questi dui quadrati, è il quad. del prodotto di quelli dui la-
 ti, & il prodoto di questi dui Cubi, è il eubo del prodotto istesso di quelli dui lati, & però che
 del prodoto de i quattro lati dati, il quadrato è il prodoto de i quattro quadrati, & il cubo è il
 prodoto de i loro quattro cubi. Et così con tal modo procedendo si concluderà il medesimo, ef-
 fendo i lati dati, & 5. & 6. & 7. quanti si vogliono in infinito; Et non solo ne i quadrati, & ne i Cu-
 bi de i lati, ma nelli quadri quadrati loro, nelli Relati, & ne gl'altri.

Cubili questo Residuo A.r.c. $1 \frac{1}{2}$, m r.q.c. $1 \frac{1}{2}$.

Il cubo della prima parte è $1\frac{1}{2}$. Il cubo della seconda parte è $m.r.q. 1\frac{1}{2}$. Il quadrato della prima parte è $r.c. 1\frac{1}{4}$, da moltiplicare via $m.r.q.c. 1\frac{1}{2}$, seconda, cioè $r.q.c. \frac{3}{2}$, via $m.r.q.c. \frac{3}{2}$, che fa $m.r.q.c. \frac{3}{2}$. & quello li tripla, cioè li moltiplica via $r.q.c. 729$. & fa $m.r.q.c. \frac{3}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{3}{2}$, cioè $m.r.q.c. 1920$, che è l'altro partiolare prodotto.

Ancora il quadrato della seconda parte 4. in 1. q.c. 1 $\frac{1}{4}$, è r.c. 1 $\frac{1}{4}$, da moltiplicare via la prima

r.c. $1\frac{1}{2}$. & fa r.c. 3. quale si tripla. & fa r.c. 54. che è l'ultimo particolare prodotto. Et perciò il prodotto totale, che è il cubo del Residuo A. farà r.c. 54. $\bar{p}$ $1\frac{1}{2}$. m. $\bar{q}$ q. $1\frac{1}{2}$. m. r.q. 4920. che è vn Quadrinomio C. composto di $\bar{p}$ & m. & di numero r.q. r.c. & r.q.c. In questo Quadrinomio cubo C. composto di $\bar{p}$, & m. si vede il numero $1\frac{1}{2}$. essere il numero della $\bar{q}$ c. del Residuo A. che è r.c. cuba d'esso Quadrinomio: Et che del m. r.q. $1\frac{1}{2}$. il numero $1\frac{1}{2}$. è il numero della m. r.q. c. del medesimo Residuo A. Et che perciò delli $1\frac{1}{2}$. & m. r.q. $1\frac{1}{2}$. prelo separatamente la r.c. che farà r.c. $1\frac{1}{2}$. & m. r.q.c. $1\frac{1}{2}$. esse faranno le due parti che formano il Residuo A. che è r.c. del Quadrinomio; Et questo auuere perché esse due parti sono quelle, che si cubano nel sommare il Residuo A. & formano due parti del Quadrinomio; Et per chiarirci poi se il Quadrinomio dato sia cubo, cōtinue vedere se il triplo del quad. della r.c. $1\frac{1}{2}$. moltiplicato via la m. r.q. c. $1\frac{1}{2}$. formi la m. r.q. c. 4920. Et anco se il triplo del quad. della m. r.q. c. $1\frac{1}{2}$. moltiplicato via la r.c. $1\frac{1}{2}$. formi la r.c. 54. Et si può auuertire, che il r.c. 54. deue nascere dal triplo del quad. della m. r.q. c. $1\frac{1}{2}$. pche il quad. d'essa meno r.q.c. è sempre $\bar{p}$, & è r.c. che moltiplicato via l'altra r.c. cioè via r.c. $1\frac{1}{2}$. produce pure r.c. Et auuertire similmente, che il meno r.q.c. 4920. appartiene, o deue nascere dal triplo del quad. della r.c. $1\frac{1}{2}$. che si riduce poi a r.q.c. per moltiplicarlo via meno r.q.c. $1\frac{1}{2}$. qual moltiplicante perché è meno deue produrre meno, & è similmente r.q.c. Et così facilmente si può conoscere se tali Quadrinomij sono cubi, o no, & essendo cubi, quale sia la sua r.cuba.

Moltiplichisi r.c. 12. via r.q.c. 12. Cioe r.q.c. 144. via r.q. c. 12. fa r.q.c. 1728. che si riduce a r.q. 12. Di qui si può auuertire, che moltiplicando vna r.c. via vna r.q.c. del medesimo numero, il prodotto è sempre r.q. dell'istesso numero. Cioe a moltiplicare poniamo r.c. 19 via r.q.c. 19. fa r.q.

r.q.c. 19. via r.c. 19. cioè
via r.q.c. 361.

fa r.q.c. 6859. cioè r.q. 19.

19. percher. c. 19. ridotta a r.q.c. è r.q.c. (19. via 19.) & questo moltiplicato via r.q.c. 19. fa r.q.c. (19 via 19 via 19.) onde il numero del prodotto sarà cubo, & la sua r.c. farà il 19. perliche d'esso prodotto, che farà r.q.c. si potrà pigliare la r.c. che quanto al numero sarà 19. & però questo 19. sarà solo r.q.

Ma moltiplicando r.q. 19. via r.q.c. 19. il prodotto è 19. via 19. denominato da r.cuba, cioè r.c. 961. perché qui nel ridurre la r.q. 19. a r.q.c. si moltiplica 19. via 19. & il prodotto (che è r.q.c.) si moltiplica per 19. num. della r.q.c. & però il prodotto delli quattro 19. (che è r.q.c.) farà num. quad. onde prefine la r.q. che farà il duto di dui 19. il num. dell'auuimento sarà solo r.c.

Notino gli studenti, che se beue alle volte nelle operationi si potria dare vna Regola breue, & seruandola da breue discorso, noi ne facciamo diuerse, & alcune lunghe; deducendone Regole diuerse, & c. accio eia si facciano esperti, & in molti modi sappiano discorrere, & operare.

Ma lassando il trattare di queste quantità cube, & loro radici (che si potria procedere in infinito) passiamo ad altre speculationi,

3. *Data la somma de i quadrati di due quantità, & la proportion de l prodotto d'esse due quantità al quadrato della differenzia delle medesme due quantità, ritrouare esse due quantità.*

Sia B. somma de i quadrati delle due quantità 20. Et la proportion del prodotto d'esse due quantità al quadrato della differenza loro sia come da R. ad S. Si domanda esse due quantità.

Poriamo A. essere il prodotto delle due quantità, Adunque il quad. della differenza d'esse farà il duto di San A. (perche essendo da A. prodotto delle due quantità, al quadrato della differenza loro come da R. ad S. cioè essendo A. prodotto delle due quantità. Et il quad.

arato della differenza loro; Et R. & S. dal supposito, quattro quantità proportionali ne segue, che il duto della prima A. nella quarta S. sia eguale al duto della seconda, quadrato della differenza delle due quantità nella terza R. onde partendo il duto della prima nella quarta, cioè di A. in S. o togliamo dire, che resulta l'istesso di S. in A. per la terza R. l'auuimento sarà la seconda, cioè il quadrato della differenza delle due quantità) al quadrato della differenza delle due quantità, giunto il doppio del prodotto d'esse due quantità, ne resulta la somma de i quadrati delle due quantità. Adunque

Il duto di S. in A. sarà eguale alla superficie B. 20. dato.
Et di R. due volte in A. quantità (che R. in A. due volte da partire per R. è quanto due volte A. posto essere il prodotto delle due quantità, poiche a moltiplicare A. per R. & partire il prodotto per l'istesso R. ne ritorna A. ma in vece de dire A. due volte, qui si dice, o s'pone R. in A. due volte da partire per R. perche ci torna comodo, douendolo giungere con il duto di S. in A. che vñ anch'egli partito per il medesimo R. Et

così

così il duto di S. in A. da partire per R. è il quadrato della differenza delle due quantità. Et
il duto di R. in A. due volte da partire per R. è il doppio del prodotto delle medesime due quan-
tità, quali quad. della differenza delle due quantità; Et doppio del prodotto delle istesse due qua-
rità, giunti insieme componono la somma de' quad. delle due quantità (come si mostrò nel fine della scio-
da operatione, è Problema asse. Et però faranno eguali al dato B. 20.) La quale Equatione ri-
dotta a forma di proportionalità si potrà dire, che come è da S. più due volte R. ad R. così è da B.
20. ad A. da trouarsi rettangolo, o prodotto delle due quantità, (perche hauendo il duto di S. in
A. più il duto di R. due volte in A. Il tutto da partire, o esimo di R. o denominato da R. o voglia-
mo dire che hà per denominatore R. Et essendo eguale a B. noi per leuare il rotto multiplicando
scialcuna delle due parti sinistra, & destra dell'Equatione per R. denominatore della sinistra ci ri-
durremo ad hauere il duto di S. in A. più il duto di R. due volte in A. Eguale al duto di R. in B.
Et perehe il duto di S. in A. più il duto di R. due volte pure in A. si può dire essere il duto di que-
sta quantità S. più il doppio di R. in quest'altra A. Et essepo tal duto eguale al duto di quest'al-
tre due R. & B. fra loro, noi potiamo considerare esse 4. quantità come 4. quantità proportionali,
ponendo quelle d'un duto per estreme prima, & quarta. Et quelle dell'altro duto (al già detto
duto eguale) per medie, scòda, & terza, & stando cò quest'ordine S. più il doppio di R. prima R.
seconda B. terza, & A. quarta, si dirà, che come da S. più il doppio di R. ad R. così è B. 20. ad A. po-
stò essere il prodotto delle due quantità, che li cercano.) Onde dati S. R. & B. si trouaranno le
due quantità. Che dato B. (somma de' quad. delle due quantità) 20. Et la proportion de' pro-
dotto delle due quantità al quad. della differenza loro, essendo come da R. 2 ad S. 1. Il doppio di
R. con S. cioè 4. & 1. che fa 5 ad R. 2. farà come da B. 20. ad A. prodotto delle due quantità, onde se
5. da 2 il B. 20. darà 8 & questo 8. farà A. prodotto delle due quantità, il doppio del qual prodotto,
cioè 16. cauato dalla somma de i dui quadrati loro, cioè da B. 20. il restante 4. è il quadrato della
differenza delle due quantità, però la radice di questo 4. cioè 2. è la differenza delle due quantità. Et
l'istesso 16. doppio del prodotto delle due quantità, giunto al medesimo B. 20. somma de' quadrati
delle due quantità, il composto 36. sarà il quadrato della somma delle due quantità (come si mo-
strò nel secondo problema sopradetto) per il che la radice di questo 36. cioè 6. sarà la somma delle due
quantità. Et la differenza delle istesse si è trouato essere 2. però la metà della differenza, giòto a 1.
mità della somma che si 4. mostrerà la maggiore delle due quantità cercate douere essere 4. Et
il medesimo 16. cauato dall'istesso 3. che resta 1. mostrerà la minore douere essere 1. Et ben si vede
che la somma di 16. & 4. quadrati loro fa il 20. B. dato. Et che la proportion di 8. prodotto d'esse
due quantità à 4. quadrato di 2. differenza loro, è come da R. 2 ad S. 1. come si propone.

Et se stante la somma de i quadrati delle due quantità B. 20. il prodotto delle due quantità al
quadrato della differenza d'esse due quantità fusse come da 1 ad 1. cioè fussero eguali, che S. cioè
fusse eguale ad R. che però all'hora il doppio di R. giunto ad S. faria il triplo di R. all'hora ancora
B. 20. faria triplo ad A. prodotto delle due quantità, & perciò esso prodotto faria $\frac{20}{3}$. cioè $6\frac{2}{3}$. il
doppio del quale che è 13 $\frac{1}{3}$. giunto, & cauato a B. 20. somma de' quadrati delle due quantità i dui
residualanti 33 $\frac{1}{3}$. & 6 $\frac{2}{3}$. faranno i quadrati della somma delle due quantità, & della differenza del-
le istesse due quantità, onde la somma delle due quantità fara $33\frac{1}{3} + 6\frac{2}{3} = 40$. & la loro differenza fara $6\frac{2}{3} - 1\frac{1}{3} = 5$.
le metà del che sono $8\frac{1}{3}$ & $2\frac{1}{3}$. per il che la quantità maggiore fara $8\frac{1}{3}$. & $2\frac{1}{3}$. Et
la minore fara $8\frac{1}{3}$. meno $2\frac{1}{3}$. La differenza delle due quantità è due volte $2\frac{1}{3}$. cioè $4\frac{2}{3}$.
Il suo quadrato è $6\frac{2}{3}$. il che è eguale al prodotto delle due quantità come si propone.

La quantità maggiore è $8\frac{1}{3}$. più $2\frac{1}{3}$.	Il suo quadrato è 10. più $\frac{100}{9}$.
La quantità minore è $8\frac{1}{3}$. m. $2\frac{1}{3}$.	Il suo quadrato è 10. men. $\frac{100}{9}$.
Il prodotto delle due quantità è $8\frac{1}{3}$. meno $2\frac{1}{3}$.	la somma de i quadrati è 20. come si pro- pone.
cioè $6\frac{2}{3}$.	

Il Cardano al Capitulo 66. nel quesito 94. seruiue.

Trouinsi due quantità tali, che il prodotto sia eguale al quad. della differenza loro, & che la
somma de' quad. loro sia 20. Et lo risolue per Algebra con modo, simile al seguente. Sia la
maggiore $\frac{1}{2}$. & la minore 1. (che si potria anco dire 1. quantità, & trouar poi il valore d'essa que-
tita in num. di 1, ma pche que'lo riusciria laborioso, perciò adopraremo la semplice vnita) la diffe-
renza è $\frac{1}{2}$. & m. 1. il quad. d'essa è $\frac{1}{4}$. & m. 1. & p. 1. il che è eguale al prodotto delle due quantità che
è $\frac{1}{2}$. & che accomodato la Equatione si hauera $1 - \frac{1}{2}p = 1 - \frac{1}{2}$. & però $1 - \frac{1}{2}p = 4$. Eguale a
6. & 1. Onde la vale 3. & p. 5. & 3. m. 5. ma la valuta maggiore si serue, & fara $1 - \frac{1}{2}p = 1 - \frac{1}{2}$.
che $1 - \frac{1}{2}p = 1 - \frac{1}{2}$. faria poco per la quantità maggiore essendo posto 1. la minore. Et così quado la
mino-

minore sia 1. la maggiore posta $\frac{7}{2}$, & farà $1\frac{7}{2}$. p. R. $\frac{7}{2}$. Cioe la proportionone della maggiore alla minore è come di $1\frac{1}{2}$. p. R. c. $\frac{1}{2}$. ad 1. Hora con nouo questo si dice.

$1\frac{1}{2}$. p. R. $1\frac{1}{2}$. Et 1. Il prodotto è $1\frac{1}{2}$. p. R. $1\frac{1}{2}$.
La differenza delle due q. è $\frac{1}{2}$. p. R. $1\frac{1}{2}$. cioe
R. $1\frac{1}{2}$. p. $\frac{1}{2}$. il quadrato della quale è $1\frac{1}{4}$. piu R. $1\frac{1}{2}$.
eguale al prodotto d'esse due q. come bisogna.

($4\frac{1}{2}$. p. R. $11\frac{1}{2}$.) 2. Eguale a 29.

$4\frac{1}{2}$. m. R. $11\frac{1}{2}$.

cioe 9. 2. Eguale a 90. m. R. 450.

cioe 1. 2. Eguale a 10. m. R. 55. $\frac{1}{2}$.

cioe 1. 2. Eguale a R. L. 10. m. R. 55. $\frac{1}{2}$.

$\frac{5}{8}$ $\frac{3}{2}$ differenza $4\frac{1}{2}$.
 $\frac{5}{8}$ $\frac{3}{2}$ la sua R. è $6\frac{1}{2}$.

Cioe R. $8\frac{1}{2}$. meno R. $1\frac{1}{2}$. vale la 2. & è la minore quantità.

R. $8\frac{1}{2}$. m. R. $1\frac{1}{2}$.

via $1\frac{1}{2}$. p. R. $1\frac{1}{2}$. fa R. $8\frac{1}{2}$. p. R. $1\frac{1}{2}$.

R. $\frac{1}{2}$. via R. $\frac{1}{2}$. fa R. $\frac{1}{2}$. da cauarne R. $\frac{1}{2}$.

& resta R. $\frac{1}{2}$. cioe R. $\frac{1}{2}$.

la somma delle due multiplicationi transuersali è R. $\frac{1}{2}$. m. R. $\frac{1}{2}$.

ma R. $\frac{1}{2}$. in esse entra volte 5. & volte 3. però nella loro differenza

entra volte 2. & volte 2. cioe R. 4. via R. $\frac{1}{2}$.

fa R. $\frac{1}{2}$. cioe R. $\frac{1}{2}$. che è il valore d'esso residuo.

& acciò la maggiore alla minore habbi la proportionone di $1\frac{1}{2}$. p. R. $1\frac{1}{2}$. ad 1. (che se $1\frac{1}{2}$. p. R. $1\frac{1}{2}$. maggiore douerà 1. l'1. poi minore douerà $1\frac{1}{2}$. m. R. $1\frac{1}{2}$.) i loro quadrati sono 1. 2. Et ($1\frac{1}{2}$. m. R. $1\frac{1}{2}$.) 2. Et la somma loro è ($4\frac{1}{2}$. m. R. $11\frac{1}{2}$.) 2. & questo è eguale a 20. cioe 9. 2. Egualè a 90. p. R. 450. Onde la 2. vale $8\frac{1}{2}$. p. R. $1\frac{1}{2}$. & questa è la maggior quantità.

Et ben si vede, che il prodotto d'esse due q. $8\frac{1}{2}$. p. R. $1\frac{1}{2}$. Et $8\frac{1}{2}$. m. R. $1\frac{1}{2}$. è $8\frac{1}{2}$. m. $1\frac{1}{2}$. cioe 6. $\frac{1}{2}$. Et la differenza d'esse due q. è $7\frac{1}{2}$. p. R. $1\frac{1}{2}$. cioe $6\frac{1}{2}$. il quadrato della quale è $6\frac{1}{4}$. & però è eguale al prodotto loro come si propone; Ancora i quadrati d'esse due q. sono 10. p. R. $1\frac{1}{2}$. Et 10. m. R. $1\frac{1}{2}$. la somma de i quali è 20 come si propone.

Ouerò sia la maggiore 1. & la minore 1. la differenza è 1. & m. 1. il quadrato della quale è 1. m. 2. & p. 1. Eguale al prodotto loro, che è 1. & però 1. & p. 1. è Eguale a 3. 2. Onde la 2. vale $1\frac{1}{2}$. p. R. $1\frac{1}{2}$. o $1\frac{1}{2}$. m. R. $1\frac{1}{2}$. ma la maggior valuta è a proposito. Onde quando la minor q. sia 1. la maggiore possa 1. & farà $1\frac{1}{2}$. p. R. $1\frac{1}{2}$. Ouerò posta la minore 1. & la maggiore 1. la differenza è 1. m. 1. & il suo quadrato è 1. m. 2. & p. 1. 2. Et è eguale al prodotto delle due q. che è 1. & però 1. & p. 1. è eguale a 3. & come prima; Et la 2. vale pure $1\frac{1}{2}$. p. R. $1\frac{1}{2}$. o $1\frac{1}{2}$. m. R. $1\frac{1}{2}$. ma la maggior valuta hora è a proposito, onde quando la maggior quantità sia $1\frac{1}{2}$. la minore farà $1\frac{1}{2}$. m. R. $1\frac{1}{2}$. Et seguendo ad operare come di sopra si troueranno le due quantità.

Ma per deriuarne facilmente la Regola numerale. & anco la lineale sia che si dica.

Trouinsi due quantità tali, che il prodotto loro al quadrato della differenza loro habbi la proportionone di 3. a 10. cioe che il quadrato della differenza loro sia volte 3. quanto il prodotto loro; Et di più che la somma de' quadrati loro sia 20. Et trouaremo la maggior quantità essere $6\frac{1}{2}$. p. R. $1\frac{1}{2}$. Et perciò la minore douerà essere il suo Residuo, cioe $6\frac{1}{2}$. m. R. $1\frac{1}{2}$. accioche la somma de' quadrati loro sia 20. che il quad. della maggiore è $6\frac{1}{4}$. p. $1\frac{1}{2}$. cioe 10. più il doppio del due 20 di $6\frac{1}{2}$. in $1\frac{1}{2}$. & però il quad. della minore, che hà da essere il restante fino a 20. farà 10. manco il doppio del duto delle istesse due $6\frac{1}{2}$. & R. $1\frac{1}{2}$. i quad. delle quali giointe insieme deuno fare 10. onde conuiene che esso minore sia $6\frac{1}{2}$. m. R. $1\frac{1}{2}$.

Pono la minore 1. & la maggiore 1. la differenza è 1. m. 1. & il suo quad. è 1. m. 2. & p. 1. 2. Il loro prodotto è 1. & che multiplicato per $3\frac{1}{2}$. fa $3\frac{1}{2}$. & questo è eguale al detto 1. m. 2. & p. 1. 2. Cioe 1. 2. p. 1. Eguale a $3\frac{1}{2}$. & per il che la 2. vale $3\frac{1}{2}$. p. R. $6\frac{1}{2}$. Ouerò $3\frac{1}{2}$. meno $6\frac{1}{2}$. Onde la minore quantità sarà $3\frac{1}{2}$. meno $6\frac{1}{2}$. quando la maggior sia 1. Et ben vediamo la differenza loro essere $6\frac{1}{2}$. meno $1\frac{1}{2}$. il suo quad. è $8\frac{1}{4}$. meno $6\frac{1}{4}$. Et il loro prodotto è $3\frac{1}{2}$. meno $6\frac{1}{4}$. che moltiplicato per $3\frac{1}{2}$. fa $8\frac{1}{4}$. meno $6\frac{1}{4}$. che è quanto il quadrato sopradetto della differenza loro.

Hora

Hora faremo noua positione; Sia la maggiore quantita 1. 7. per la minore sarà (1. 7. m. 6. 7.) + (che te 1. maggiore da 1. 7. m. 6. 7. per la minore, se mō la maggiore douenti 1. cosa, la minore similmente douentarà l'istesso 1. 7. m. 6. 7. ma sarà +) i loro quadrati sono 1. 2. Et (13. 7. m. 173. 7. 7.) la somma de quali è (14. 7. m. 173. 7. 7. 2.) & è eguale a 10. onde partea do il 10. per il numero de 2. ne verrà il valore del 2. & la B. sarà il valore della cosa.

Qui il prodotto di 10. via 14. 7. vā poi partito per 18. 7. che è doppio al 14. 7. però all'auenimento sarà similmente il doppio di 10. onde esso auenimento sarà 10.

$\begin{array}{r} 14\frac{7}{8}, \text{ p. B. } 173\frac{7}{8} \\ \text{via } 14\frac{7}{8}, \text{ m. B. } 173\frac{7}{8} \\ \hline 6\frac{7}{8} \\ 196\frac{7}{8} \\ 203\frac{7}{8} \\ 173\frac{7}{8} \\ \hline \text{partitore } 18\frac{7}{8} \end{array}$	$\begin{array}{r} 10 \\ \text{via } 14\frac{7}{8}, \text{ p. B. } 173\frac{7}{8} \\ \hline 14\frac{7}{8} \\ 25 \\ 256 \\ 16 \\ \hline \text{ne viene B. } 85\frac{1}{8} \\ \text{però il 2. vale 10. p. B. } 85\frac{1}{8} \\ \text{da 100.} \end{array}$
--	---

Ancora moltiplicare per 10. & partire il prodotto per 18. 7. è quanto moltiplicare per 1. & partire per 1. 7. 7. che è 1. 7. 7. però douendo moltiplicare a dice 173. 7. 7. per 10. & partire il prodotto per 18. 7. questo rut to lara quāro partirla per 1. 7. 7. cioè per 1. 7. 7. che ne 10. sulta B. 85. 1. 7. 7.

ne risultano 13. 7. & 6. 7. le loro mita sono 6. 7. & 3. 7. & le B. d'esse giunte insieme fanno rad. 6. 7. p. B. 1. 7. 7. ilche è la B. del Binomio valore del 2. però questa B. 6. 7. p. 1. 7. 7. è il valore della +, & è la maggiore quantita. Et la minore sarà il Residuo di questa, cioè r. 6. 7. m. 3. 7. che la somma delli di quadrati fa il 10. dato. Ocro, quando la maggior quantita sia 1. la minore è 3. 7. m. r. 6. 7. essendo mō la maggiore r. 6. 7. p. 3. 7. 7. quanto douerà essere la minore. Et vedremo, che la r. 6. 7. m. 3. 7. che è il Residuo del Binomio continente la maggiore.

* Qui mō si può notare che 1. 7. m. 6. 7. è vna quantita, che moltiplicata per il Binomio r. 6. 7. p. 1. 7. 7. produce il Residuo d'esso Binomio, cioè produce r. 6. 7. m. 3. 7. Et se dicessimo quale è quella quātita, che moltiplicata poniamo per il Binomio 8. p. r. 40. produce il suo Residuo 8. m. r. 40. (o quale è quella quantita, che moltiplicata per il Residuo 8. m. r. 40. produca il suo Binomio 8 p. r. 40.) noi la potremo trouare mediante l'Algebra, ponendo ch'ella sia r. Ouero, partendo simplicemēte il Binomio dato B. p. il suo Residuo R. che l'auenimento Q. sarà la quantita cercata 4. 7. m. r. 7. 7. quale moltiplicata via il B. produca il suo residuo 8. m. r. 40.

$\begin{array}{r} 8 \\ \text{r. } 6\frac{7}{8}, \text{ via r. } 1\frac{7}{8}, \text{ Er via r. } 1\frac{7}{8} \\ \hline 1 \\ 440 \\ \text{fa r. } 48\frac{7}{8}, \text{ \& rad. } 23\frac{7}{8} \\ \text{A.} \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ \text{m. r. } 1\frac{7}{8}, \text{ via r. } 1\frac{7}{8}, \text{ Et via r. } 1\frac{7}{8} \\ \hline 1025 \\ 178\frac{7}{8} \\ \text{m. r. } 41\frac{7}{8}, \text{ Et m. r. } 19\frac{7}{8} \\ \text{B.} \end{array}$
---	---

9. 7. 7. in r. 1. 7. 7. entra per r. 64. cioè 8. volte; Et in r. 1. 7. 7. 7. entra per r. 15. cioè 5. volte, che cauato da 8. resta 3. che è r. 9. da moltiplicare per r. 1. 7. 7. & fa r. 1. 7. 7. & quello e la soma di A. & a, cioè quāto importar 48. 7. m. rad. 19. 7. 7. in rad. 1. 7. 7. entra per r. 3025. cioè volte 55. & in B. 178. 7. 7. che è r. 1. 7. 7. 7. entra per r. 1600 cioè volte 40. che cauato da 55. resta 15. da moltiplicare con r. 1. 7. 7. & fa r. 1. 7. 7. 7. cioè r. 3. 7. 7. & quello è m. & è la somma di r. 21. 7. 7. b. con m. r. 42. 7. 7. B. cioè il loro composto è m. r. 3. 7. 7. quale con r. 6. 7. 7. trouato per somma di A. & a, fa r. 6. 7. 7. m. r. 1. 7. 7. che è il prodotto della nostra moltiplicatione, quale partito per 1. ne viene l'istesso, & però clla è la quantita minore.

con 8. p. r. 40. si parta 8. m. r. 40.

$\begin{array}{r} 8 \text{ m. r. } 40. \\ 24 \text{ partitore. } \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \text{ m. r. } 40. \\ 104 \text{ m. r. } 1040. \\ \hline \text{ne viene } 4\frac{1}{2} \text{ m. r. } 17\frac{1}{2} \end{array}$	$\begin{array}{r} 426\frac{1}{2} \\ \hline \end{array}$
---	--	---

che moltiplicata via 8. p. r. 40. produce il Residuo 8. m. r. 40.

Et conuerfamēte il Binomio della quantita, cioè 4. 7. p. r. 17. 7. 7. faria la quantita, che moltiplicata via il residuo 8. meno rad 40. produria il suo Binomio 8. p. r. 40.

Et si può notar, che in questi casi la quantita Q. è tale, che il quadrato della maggior parte supera il quad. della minore in

M 1. &

1. & però ella sia Binomio, & Residuo di numero, & B. ella sarà quadrata. Ancora il prodotto della minor parte d'essa, nella minor parte del Binomio B. è sempre quanto il prodotto della maggior parte del Binomio B. in i. fianco della maggior parte della quantità Q. accioche moltiplicando poi la maggior parte del Binomio, per tutta la intera parte maggiore della quan-

3 $\frac{1}{2}$. (cioè 1. manco di $4\frac{1}{2}$.) via 8. deue fare quanto B. 40. via B. 10 $\frac{7}{8}$. perche esse due B. hanno fra loro proportionate douo produrre numero rationale.

$$\begin{array}{r} 3\frac{1}{2} \quad \quad \quad B. 17\frac{1}{8} \quad \quad \quad 1. 6. 6. \quad \quad \quad fa B. 6. 2. 0. \quad \quad \quad \text{cioe } 8. 0. \\ \text{via } 8 \quad \quad \quad \text{via } B. 40. \quad \quad \quad \text{via } 8. 40. \quad \quad \quad \text{via } 8. 40. \\ \hline \text{fa } 20. \quad \quad \quad \text{fa } 680. \quad \quad \quad \text{fa } 680. \quad \quad \quad \text{fa } 680. \end{array}$$

Er ancora 5 $\frac{1}{2}$. via B. 40. deue fare quanto 8. via B. 17 $\frac{1}{8}$. cioe B. 1. 13. 7 $\frac{7}{8}$. 8. cioe B. 64. via B. 1. 13. 7 $\frac{7}{8}$. fa B. 1. 0. 3. 0. cioe B. 1137 $\frac{7}{8}$.

* Per farne la proua diremo il quad. della maggior quantità è 10. p. (r. 5 $\frac{7}{8}$. via r. 1 $\frac{1}{2}$. 2. volte.)

Il quad. della minore è 10. m. r. 6 $\frac{7}{8}$. via r. 3 $\frac{1}{8}$. 2. volte, però la somma d'essi due quadrati è 20. come si propone.

Il rettangolo delle due quantità è 6 $\frac{7}{8}$. m. 3 $\frac{1}{8}$. cioe 3 $\frac{1}{8}$.

La differenza delle due quantità è rad. 3 $\frac{1}{8}$. 2. volte, cioe r. 12 $\frac{1}{8}$. il suo quad. è 12 $\frac{1}{8}$. al quale il 3 $\frac{1}{8}$. rett. loro ha la proportionate di 15. a 30. cioe di 3. a 10. come si propone.

to dal prodotto della maggior parte del Binomio nella minor parte della Q. (quale è meno) in vna volta la minor parte del Binomio cioe accioche a cauare il prodotto hora di 4 $\frac{1}{2}$. via rad. 40. dal prodotto di 8. via rad. 17 $\frac{1}{8}$. che è meno, resti rad. 40. ma che sarà meno.

Dall' operatione Algebrica di questo quesito, se ne può dedurre la seguente Regola numerale per risolvere i quesiti simili.

Al denominatore della proportionate, che ha il quadrato della differenza delle due quantità, al prodotto loro si giunga sempre 1. (che come si vede nella Operatione Algebrica al $\frac{1}{2}$. & Figionge sempre 1. & fa le 5 $\frac{1}{2}$. & che sono sempre eguali ad 1. & piu 1. & dal quadrato della metà M. della somma si caui sempre 1. (che è dal quadrato della metà del numero delle 1. cauare il numero sempre 1. che è con l' 1. & 2.) & la B. del restante si caui dalla metà M. & il restante si chiami N. (che nella Operatione è la quantità minore quando la maggiore sia 1.) Dipoi al quadrato di questo N. si giunga sempre 1. (che nella Operatione Algebrica si vede, che posto la maggiore 1. & la minore il numero delle 1. significato da N. (cioe hora (a $\frac{1}{2}$. m. r. 6 $\frac{1}{8}$.) & Si giogouo i loro quadrati insieme, & il còposto che è 2. è sempre eguale alla somma data (hora 20.) de' quadrati delle due quantità, & perciò in questa Equatione di 2. eguale a numero si parte sempre il numero (hora 20.) per il numero de' 2. & la r. dell' animento è il valore della 1. & perciò è la maggior quantità posta 1. & quale moltiplicata poi per l'N. il prodotto è la minore) & con la somma si parte la somma data de' quadrati delle due quantità, che la Radice dell' auenimento farà la quantità maggiore, quale si moltiplica per N. che il prodotto sarà la minore.

Per esempio essendo la somma de' quadrati delle due quantità 20. Et la proportionate del prodotto delle due quantità al quadrato della differenza loro come da 1. ad 1. per trouare le due quantità. Essendo dal quadrato della differenza loro al loro prodotto come da 1. a 2. & però il suo denominatore $\frac{1}{2}$. si giongeremo il 1. per regola, & fa 2 $\frac{1}{2}$. la sua metà M. è 1 $\frac{1}{2}$. il quadrato di questo è 2 $\frac{1}{4}$. da cauare sempre 1. & resta $\frac{1}{4}$. la sua Radice, che è $\frac{1}{2}$. si caua da M. $\frac{1}{2}$. & resta $\frac{1}{2}$. che è N. al quadrato del quale N. che è $\frac{1}{4}$. si gionge sempre 1. & fa 1 $\frac{1}{4}$. con il quale si parte il 20. somma data de' quadrati delle due quantità, & ne viene 16. la rad. del quale è 4. & questa è la quantità maggiore, quale si moltiplica per N. $\frac{1}{2}$. & fa 2. & questo 2. è la quantità minore.

Et nel secondo esempio essendo pure la somma de' quadrati delle due quantità 20. ma il prodotto d'esse due quantità eguale al quadrato della differenza loro, cioe la proportionate del prodotto loro al quadrato della differenza loro come da 1. ad 1. & però aneo dal quadrato della differenza loro al prodotto loro come da 1. ad 1. il denominatore della qual proportionate è 1. noi per trouare le due quantità al detto denominatore 1. giongeremo il 1. per regola, & fa 1. la sua metà M. è $\frac{1}{2}$. il suo quadrato è $\frac{1}{4}$. da cauare sempre 1. & resta $\frac{3}{4}$. la B. del quale, che è $\frac{\sqrt{3}}{2}$, si caua

fi caua da M. $1\frac{1}{2}$. & resta $1\frac{1}{2}$. m Bx $1\frac{1}{2}$. che è l'N. al quadrato del quale N. che è $3\frac{1}{2}$. m Bx $11\frac{1}{2}$. si giunge sempre 1. & fa $4\frac{1}{2}$. m Bx $11\frac{1}{2}$. con il quale si parte il 20. somma data delli quadrati delle due quant. & ne viene 10. piu Bx $55\frac{1}{2}$. la Bx del quale cioè Bx $8\frac{1}{2}$. piu Bx $1\frac{1}{2}$. è la maggior quantità, quale moltiplicata per N. $1\frac{1}{2}$. meno radice $1\frac{1}{2}$. produce radice $8\frac{1}{2}$. meno radice $1\frac{1}{2}$. (Residuo della radice $8\frac{1}{2}$. piu radice $1\frac{1}{2}$. Binomio detto maggior quantità) & questo è la minore quantità; Ouero trouato la maggiore quantità essere rad. $8\frac{1}{2}$. piu rad. $1\frac{1}{2}$. che ha per quadrato 10. piu rad. $55\frac{1}{2}$. questo si caui da 10. somma data de' quadrati delle due quantità, & resta 10. m rad. $55\frac{1}{2}$. che è il quadrato della quantità minore, però la sua r. cioè r. $8\frac{1}{2}$. m r. $1\frac{1}{2}$. farà la quantità minore.

Con $4\frac{1}{2}$. m r. $11\frac{1}{2}$. partasi 20.

$$\frac{4\frac{1}{2} \cdot \text{pr. } 11\frac{1}{2}}{9.}$$

$$\frac{4\frac{1}{2} \cdot \text{pr. } 11\frac{1}{2}}{90 \cdot \text{pr. } 4500.}$$

auenimanto 10. pr. $55\frac{1}{2}$. da pigliarne la rad.

$$\frac{10}{\frac{6\frac{1}{2}}{16\frac{1}{2}}} \quad \frac{10}{\frac{6\frac{1}{2}}{3\frac{1}{2}}} \quad \frac{10}{44\frac{1}{2}} \quad \frac{4 \cdot 0 \cdot 0}{9.} \quad \frac{3 \cdot 0}{2.}$$

via N. $1\frac{1}{2}$. m rad. $1\frac{1}{2}$. Causi il duto di $1\frac{1}{2}$. via rad. $1\frac{1}{2}$. cioè de rad. $\frac{1}{2}$. via r. $\frac{1}{2}$. dal duto di rad. $8\frac{1}{2}$. via rad. $1\frac{1}{2}$. cioè di rad. $\frac{1}{2}$. via rad. $\frac{1}{2}$. che è m, & il restante sarà meno. Qui perche i dui prodotti de' denominatori 3.

& 4. in ciascun duto è vn istesso 12. terremo conto solo de' numeratori, & haueremo 9. via 5. & 25. via 5. & lassando i dui 5. equali, attenderemo al 9. & al 25. che rad. 9. in rad. 25. entra per rad. $\frac{1}{2}$. che è $\frac{1}{2}$. però nel restante, o differenza de' dui duti entrara 1. volta manco, cioè solo volte $\frac{1}{2}$. chee rad. $\frac{1}{2}$. da moltiplicare hora via il minor duto, cioè via rad. $\frac{1}{2}$. via rad. $\frac{1}{2}$. che fa rad. $\frac{1}{4}$. (perche rad. $\frac{1}{2}$. via rad. $\frac{1}{2}$. suo connerfo fa rad. 1. che via rad. $\frac{1}{2}$. poi fa pure rad. $\frac{1}{2}$.) però a cauare il duto di rad. $\frac{1}{2}$. via rad. $\frac{1}{2}$. & è piu del duto di rad. $\frac{1}{4}$. via r. $\frac{1}{2}$. & è meno restarà r. $\frac{1}{4}$. cioè rad. $1\frac{1}{2}$. & è meno.

Ancora causi il duto di r. $1\frac{1}{2}$. via r. $1\frac{1}{2}$. cioè di r. $\frac{1}{2}$. via r. $\frac{1}{2}$. & è meno, dal duto di $1\frac{1}{2}$. via r. $\frac{1}{2}$. cioè di r. $\frac{1}{2}$. via r. $\frac{1}{2}$. che il restante sarà piu. Qui perche il prodotto de' denominatori è vn istesso 12. tenendo conto solo delli numeratori, perche il duto di 5. via 5. è quanto il solo 25. del $\frac{1}{4}$. restarà solo nel maggiore il numeratore 9. però il minor prodotto entrara nel maggiore per r. 9. cioè 3. volte, & però nella differenza loro entrara solo 2. volte, onde moltiplicando il minore per 2. cioè per rad. 4. haueremo rad. 4. via rad. $\frac{1}{2}$. via rad. $\frac{1}{2}$. cioè rad. 5. via rad. $\frac{1}{2}$. che fa rad. $8\frac{1}{2}$. pe r. 10 a cauare il duto di rad. $1\frac{1}{2}$. via rad. $1\frac{1}{2}$. dal duto di $1\frac{1}{2}$. via rad. $8\frac{1}{2}$. resta rad. $8\frac{1}{2}$. (Et ben si vede, che rad. $\frac{1}{2}$. via rad. $\frac{1}{2}$. fa rad. $\frac{1}{4}$. cioè rad. $1\frac{1}{2}$. che è la mità di rad. $8\frac{1}{2}$. da cauarfi da volte $1\frac{1}{2}$. effa rad. $8\frac{1}{2}$. onde cauando $\frac{1}{2}$ volte rad. $8\frac{1}{2}$. (che è la rad. $2\frac{1}{2}$.) da volte $1\frac{1}{2}$. effa rad. $8\frac{1}{2}$. restarà solo 1. volta la medesima rad. $8\frac{1}{2}$. & però sarà la istessa rad. $8\frac{1}{2}$.) Et così habbiamo anco con la moltiplicacione de' N. nella maggior quantità trouato che il prodotto è il suo Residuo rad. $8\frac{1}{2}$. meno rad. $1\frac{1}{2}$. & è la quantità minore.

Di qui anco si potrà estrarre al solito la Regola lineale.

Ma estraendo la Regola numerale dal discorso primiero, noi per comodità al 20. somma de' quad. delle due q. daremo nome di B. Et alli 3. & 10. termini della proportion che deue hauer il rettangolo delle due q. al quad. della differenza loro daremo nome di R. & S. & la Regola potrà essere questa. Giogasi 6. doppio di R. con S. 10. & fa 16. qual 16. ad R. 3. ha sempre la proportion che ha B. 20. al rettangolo delle due quantità, qual rettangolo chiamaremo A. però moltiplicheremo R. 3. via B. 20. & il prodotto 60. partiremo per il 16. che l'auenimento $3\frac{3}{4}$. chiamaremo S. rettangolo delle due quantità; Il doppio di questo A. cioè $7\frac{1}{2}$. si caui da B. 20. & il restante $12\frac{1}{2}$. è sempre il quadrato della differenza delle due quantità, però effa differenza sarà rad. $12\frac{1}{2}$.

Ancora l'istesso $7\frac{1}{2}$. si giunga al medesimo B. 20. che la somma $27\frac{1}{2}$. è sempre il quadrato della somma delle due quantità, però effa somma loro sarà rad. $27\frac{1}{2}$. Onde l'vna sarà il composto della mità della somma giointoli la mita della differenza, cioè sarà rad. $6\frac{3}{4}$. piu rad. $3\frac{1}{4}$. Et l'altra sarà la mita della somma, manco la mita della differenza, cioè sarà rad. $6\frac{3}{4}$. meno rad. $3\frac{1}{4}$. Cioe la maggior quantità è vn Binomio, & la minore è il suo Residuo. Con Regola breue dunque si potrà dire.

Dati R. & S. termini della p. proportion, che ha il rettangolo di due q. al quad. della differenza loro;

Et

Et dato B. sōma de' quad. loro; Questo B. si multiplichi per R. & il prodotto si parta per il cōposto di S & doppio di B. Et il doppio dell'auenimento si giunga, & caui al B. & di ciascuno de i dui restanti M. sōma, & N. restate si pigli la $\frac{1}{2}$ quadra, che all' hora la sōma delle mità loro farà la quantita maggiore, & quello che resta a cauare la mità della minore N. dalla mità della maggiore M. farà la quantita minore.

Et dicendosi si vogliono fare due Camere quadre A. & B. tali, che li dui piani, ò superficie d' esse siano in tutto grandi come è il sito, ò superficie della loggia a b c d; Et che facendo an' alt. 2. Camera C. quadra, tūc sia per lato tanto quanto è la differenza del lato della Camera A. al lato della B. Et anco facendo vn Andito D. quadrangolo rettangolo, che per lunghezza habbia vn lato della Camera A. & per larghezza vn lato della Camera B. il piano, ò superficie di quell' Andito al piano della Camera quadra C. habbi la conuenienza, ò proportionē, che hà retta R. alla retta S. ò che hà la superficie M. alla superficie N.

Noi seruendoci dell' Regola numerale, quale applicheremo alle linee, piglieremo per vnità lineale vna retta a beneplacito. & sia V. rispetto alla quale poniamo che R. sia 3. & S. 10. Et che a b sia 5. & a d 4. che colti il quadrangolo rettangolo a b c d. farà 20. qual numero di 20. conuenie ridurre a linee, multiplicando la a b via la b c, che farà alla V vnità prima. Et a b 5. & b c 4. seconda, & terza, trouare la quarta proportionale, & sia b g.

Ancora se fussero date non le rette R. 3. & S. 10. ma le due superficie M. & N. 10. & 100. ò 3. & 10. conuerria ridurre i numeri loro a linee nel medesimo modo, quali linee se fussero li 30. & 100. numeri grandi, essi si possono abbreviare, ò schiare, pigliando solo la mità, ò $\frac{1}{2}$. ò $\frac{1}{4}$. ò $\frac{1}{8}$. ò l' $\frac{1}{16}$. ò l' $\frac{1}{32}$. ò altra parte, ò parti così dell' vna come dell' altra, acciò resti sempre fra loro la proportionē istessa dell' numeri delle due superficie, ò linee grandi; Così anco quando le prime linee fussero molto corte, elle per comodità si possono allungare, doppiandole, ò tripiandole &c. Hor sia che i numeri delle due superficie date M. & N. ò presi come sono, ò abbreviati siano ridotti nelle due rette R. S. che rispetto alla vnità diremo essere 3. & 10. (che gli diamo i nomi di numeri per comodità, non già perche nell' operare Geometrico astratto sia bisogno conoscerle per numero.) Questo inteso noi come insegna la Regola, multiplicheremo il 10. per R. 3. cioè all' V. vnità prima a 20. & R. 3. seconda, & terza, trouaremo la quarta proportionale, & sia h i 60. quale si hà da partire per il cōposto di R. & doppio di S. cioè per 16. Il che è a 16. partitore prima 60. da partire. & Vnità, seconda, & terza, trouare la quarta proportionale. & sia la 3 $\frac{3}{8}$. il doppio della quale, che farà la 7 $\frac{3}{4}$. si giunga, & caui alla, & dalla 20. & siano i risultati la 27 $\frac{1}{8}$. & la 12 $\frac{1}{8}$. di ciascuna delle quali si pigli la $\frac{1}{2}$ quadra, che sono la media proportionale fra 27 $\frac{1}{8}$. & la Vnità; Et la media proportionale fra la 12 $\frac{1}{8}$. & la Vnità, cioè sono le $\frac{1}{2}$ 27 $\frac{1}{8}$. Et $\frac{1}{2}$ 12 $\frac{1}{8}$. che giointo insieme; Et caui anco la minore dalla maggiore. & dell' dui restanti prese le mita haueremo le $\frac{1}{2}$ 6 $\frac{7}{8}$. piu $\frac{1}{2}$ 3 $\frac{1}{8}$. Et $\frac{1}{2}$ 6 $\frac{7}{8}$. m. $\frac{1}{2}$ 3 $\frac{1}{8}$. che sono le due quantità cercate, cioè i lati delle due Camere quadre A. & B.

La prova del che potrà anco essere (oltre il bastare a dire, che la Regola deriuà dalla certissima Dottrina Algebratica) la applicatione dell' numeri di mano in mano alle linee che si adopranò, & veder poi se le quantità che si trouino faccino quanto si ricerca. che non lo facendo que sto sarà segno di hauere operato male, & conuerria veder doue, & emendare l' errore. che perciò per sicurezza nell' operare, è ben fatto alle linee di mano in mano dar nome di numeri, & che siano quelli numeri, che realmente se le conueniriano operando per numero, che è anco piu comodo che il nominarle con le lettere dell' Alfabeto.

Et perche si hà da pigliare vna retta a beneplacito, che serua per vnità lineale, farà molto espedito, & si faciliterà la operatione, se piglieremo per vnità lineale vna delle rette, che si adopranò nel Questo, poniamo la R che perciò di 1. douenterà 1. Onde la S. douenterà 3 $\frac{3}{8}$. Et le a b, b c douenteranno 1 $\frac{1}{4}$. & 1 $\frac{1}{8}$. perche la grandezza 20. della loggia, douenterà 1 $\frac{1}{2}$. Et per schiuare anco l' hauere a nominare le superficie M. N. ò le linee R. & S. particolarmente sarà bene, che diamo tali numeri alle a, b, b c, formanti le superficie rettangolo a b c d. 2 $\frac{1}{2}$. che elle ritengono fra loro la proportionē delle R. 1. & S. 3 $\frac{3}{8}$. cioè trouaremo due rette ne la proportionē di 1. & 3 $\frac{3}{8}$. il prodotto delle quali sia 2 $\frac{1}{2}$. che poste esse 1. & 3 $\frac{3}{8}$. & il prodotto loro 3 $\frac{3}{8}$. 2. farà eguale 2 $\frac{1}{2}$. & però 1. + farà $\frac{1}{2}$ 3 $\frac{3}{8}$. Et 3 $\frac{3}{8}$. +, farà $\frac{1}{2}$ 7 $\frac{1}{8}$. Et hora potremo formare il Questo con più breuità dicendo.

Si vogliono fare due Camere quadre P. Q. tali, che li dui piani, ò superficie loro in tutto siano quanto è la superficie della Loggia rettangola B. Et che facendo vn' altra Camera C. quadra, quale per lato sia quanto la differenza del lato della Camera P. al lato della Q. Et anco facendo vn Andito D. rettangolo, che per lunghezza habbi vn lato della Camera P. & per larghezza vn lato della Camera Q. il piano di questo Andito, al piano della Camera quadra C. habbi la conuenienza

nienza, che hà la larghezza della loggia B. alla sua lunghezza S. si domandano i lati delle due Camere P. Q.

Ma hora ti deuue notare, che le linee R. & S. non essendo più l'1. & $3\frac{1}{2}$. che haueuamo supposto, ne apparendo vestigio d'altre linee nel Quesito che delle radici $\frac{1}{2}$. & radici $7\frac{1}{2}$. noi potremo adoperare vna di queste per vnità lineale. Et se vorremo che il rettangolo B. habbi la grandezza 20. prima intentione, & non $2\frac{1}{2}$. che non occorre, trouaremo i lati a questo 20. conuenienti nella proportionione di 3. a 10. ò di 1. a $2\frac{1}{2}$. che hauendo $3\frac{1}{2}$. centi, eguale a 20. cioe 10. $\frac{20}{3}$ eguale a 60. il centio valerà 6. & però la R. sarà 6. per il lato minore, ò la larghezza. Restando poi la lunghezza S. 20. cioe $10.66\frac{2}{3}$. Et hora pigliando per vnità lineale la R. rad. 6. vorremo operando come $\frac{20}{6}$. insegna la Regola numerale, cioe

Moltiplicheremo il numero 20. per radice 6. R. cioe per la vnità lineale; Ma notifi, che volendo noi hora, che radice 6. R. douenti vnità, il radice $66\frac{2}{3}$. S. non sarà più radice $66\frac{2}{3}$. rispetto a detta vnità, ma conuerà accomodare il suo numero di modo, che si trasformi in nuovo numero, siccome radice 6. si è trasmutato in 1. però diremo; Se radice 6. douenta 1. che douenterà radice $66\frac{2}{3}$. & vedremo, che douenterà radice $11\frac{1}{3}$. cioe $3\frac{1}{2}$. come a punto sapiamo douere essere S. rispetto alla vnità attribuita hora ad R. Et perche a moltiplicare hora R. 1. via S. $3\frac{1}{2}$. produce $3\frac{1}{2}$. sapremo, che hora il rettangolo B. farà di superficie $3\frac{1}{2}$. Onde il numero d'esso rettangolo, cioe $3\frac{1}{2}$. farà l'istesso, che è il numero di S. $3\frac{1}{2}$. & però schiueremo la operatione cò la quale si riduce in linea il numero d'esso rettangolo B. che faria trouando alla vnità prima alla R. 1. & S. $3\frac{1}{2}$. seconda, & terza, la quarta proportionale, poiche essa quarta viene ad essere la S. terza $3\frac{1}{2}$. siccome la seconda R. 1. è la vnità istessa prima. Hora questa quarta proportionale, cioe S. $3\frac{1}{2}$. si ha da partire per il composto di S. & doppio di R. che è $5\frac{1}{2}$. il che è a $5\frac{1}{2}$. partirore prima $3\frac{1}{2}$. S. da partire, & vnira R. seconda, & terza, trouare la quarta proportionale, che vedremo essere la $\frac{1}{2}$. il doppio della quale, cioe 1. $\frac{1}{2}$. si giunge, & caua al numero della B. cioe a $3\frac{1}{2}$. (che è l'istesso della S. $3\frac{1}{2}$.) & ne risultano la $4\frac{1}{2}$. Et la $2\frac{1}{2}$. di ciascuna delle quali si piglia la radice quadra, che è fra la vnità R. & la $4\frac{1}{2}$. trouare la media proportionale; Et anco fra la vnità R. & la $2\frac{1}{2}$. trouare la media proportionale, & vedremo esse medie, ò radici di $4\frac{1}{2}$. & di $2\frac{1}{2}$. essere radice $2\frac{1}{2}$. & radice $1\frac{1}{2}$. la minore delle quali, cioe radice $1\frac{1}{2}$. si giunge, & caua alla maggiore radice $4\frac{1}{2}$. & di ciascuno delli dui risultanti, che sono radice $4\frac{1}{2}$. piu radice $2\frac{1}{2}$. Et radice $4\frac{1}{2}$. meno radice $2\frac{1}{2}$. si piglia la metà, & haueremo radice $1\frac{1}{2}$. piu radice $\frac{1}{2}$. Et radice $1\frac{1}{2}$. meno radice $\frac{1}{2}$. & queste sono le due linee cercate, cioe i lati delle due Camere quadre P. & Q. domandati. Et esperimentando quelli numeri vedremo li quadrati loro essere $1\frac{1}{2}$. piu (il doppio di radice $1\frac{1}{2}$. via radice $\frac{1}{2}$.) Et $1\frac{1}{2}$. meno (il doppio di radice $1\frac{1}{2}$. via radice $\frac{1}{2}$.) & però la somma loro essere $3\frac{1}{2}$. che è la grandezza del rettangolo B. (che faria 20. quando si dicesse R. vnità essere radice 6. & S. posta $3\frac{1}{2}$. essere radice $66\frac{2}{3}$.) Ancora il rettangolo, ò prodotto di detti dui numeri, ò quantità (delle quali essendo la maggiore Binomio, si vede la minore essere poi il suo Residuo) è $1\frac{1}{2}$. meno $\frac{1}{2}$. cioe $\frac{1}{2}$. La differenza delle medesime due quantità è $\frac{1}{2}$. due volte, cioe $\frac{1}{2}$. il quad. della quale è $\frac{1}{4}$. & a questo il prodotto $\frac{1}{2}$. hà la proportionione di 15. a 50. cioe di 3. a 10. che è la istessa di R. ad S. come si ricerca, però siamo sicuri d'hanere operato bene. Hora di qui potremo deriuare la Regola breue lineale, & dire.

Essendo data la proportionione del rettangolo de' dui lati delle Camere quadre P. Q. al quadrato della differenza de' medesimi dui lati essere come da R. ad S. lati angolari continenti la loggia rettangolo B. la superficie della quale è eguale alla somma delle superficie delle due Camere quadre P. Q. Per trouare il lato della P. & il lato della Q. Giungasi la linea S. con il doppio della R. & alla somma che sia prima alla R. & alla S. che siano seconda, & terza, si troui la quarta proportionale, quale si doppi, & ne venga G. Ouero (che resulta il medesimo;) Giungasi la linea R. con la metà di S. & alla somma presa per prima alla R. & alla S. prese per seconda, & terza, si troui la quarta proportionale, & sia G. quali si giunga alla S. & anco si caui dalla istessa S. & ne deriuino E. & F. poi fra la R. & la E. si troui la media proportionale, & sia H. Ancora fra la R. & la F. si troui la media proportionale, & sia. Poi si giunga I. ad H. & ne resulti L. Ancora si caui I. da H. & ne resulti M. Di piu si pigli la metà di L. & sia N. & la metà di M. & sia O. che all' hora N. & O. faranno i lati cercati, l'vno, cioe N. della maggiore delle due Camere quadre P. Q. l'altro cioe O. dell'altra Camera minore.



•• Così abeo nella Regola numerale si può dire. Giungasi R. 3. con la metà 5. di S. 10. è con la

la somma



1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations (1) and (2) under the conditions (3) and (4). It is shown that the system of equations (1) and (2) has a solution if and only if the conditions (3) and (4) are satisfied.

2. In the second part of the paper, the problem of the existence of solutions of the system of equations (1) and (2) is solved for the case of a linear system of equations. It is shown that the system of equations (1) and (2) has a solution if and only if the conditions (3) and (4) are satisfied.

3. In the third part of the paper, the problem of the existence of solutions of the system of equations (1) and (2) is solved for the case of a nonlinear system of equations. It is shown that the system of equations (1) and (2) has a solution if and only if the conditions (3) and (4) are satisfied.



il doppio della $3\frac{1}{2}$ si deve giungere, & cauare alla b. g. 10. ma noi giungeremo, & cauaremo la foia $3\frac{1}{2}$ di foia 10. mità del 20. & anco la cauaremo, & resulataranno $13\frac{1}{2}$, & $6\frac{1}{2}$.



$$\text{Rad. } 6\frac{7}{8} \cdot \text{m. rad. } 3\frac{1}{8}$$



10. m. rad. $8\frac{1}{2}$ $13\frac{1}{2}$
la somma è 20. grandezza
de' dui quadrati

$$\text{Rad. } 6\frac{7}{8} \cdot \text{p. } 3\frac{1}{8}$$


$$\text{Rad. } 6\frac{7}{8} \cdot \text{m. rad. } 3\frac{1}{8}$$





da $3\frac{1}{2}$. a $12\frac{1}{2}$. è come
da 15. a 30. o da 3. a 10.

$$\begin{aligned} &\text{rad. } 17\frac{1}{2} \cdot \text{p. rad. } 12\frac{1}{2} \\ &\text{rad. } 6\frac{7}{8} \cdot \text{p. rad. } 3\frac{1}{8} \\ &\text{rad. } 6\frac{7}{8} \cdot \text{m. rad. } 3\frac{1}{8} \\ &\text{rad. } 17\frac{1}{2} \\ &\text{rad. } 12\frac{1}{2} \cdot \text{rad. } 17\frac{1}{2} \\ &\text{m. rad. } 12\frac{1}{2} \end{aligned}$$







$$\text{Rad. } 1 \frac{1}{2} \cdot \bar{p} \cdot \text{rad. } 3 \frac{1}{2}$$

[B]

$$\text{rad. } 1 \frac{1}{2} \cdot \bar{p} \cdot \text{rad. } 3 \frac{1}{2}$$

la somma è 3 1/2 gran-
dezza de' due quadr.

$$\text{Rad. } 1 \frac{1}{2} \cdot \bar{p} \cdot \text{rad. } 3 \frac{1}{2}$$



$$\text{rad. } 1 \frac{1}{2} \cdot \bar{p} \cdot \text{rad. } 3 \frac{1}{2}$$

$$\text{rad. } 1 \frac{1}{2} \cdot \bar{p} \cdot \text{rad. } 3 \frac{1}{2}$$

da 1 1/2 a 3 1/2, è come da
15 a 30, & però come da
3 a 10, & da 1 a 3 1/2, come
si conviene.

$$\text{Rad. } 4 \frac{1}{2}$$

$$\text{Rad. } 4 \frac{1}{2} \cdot \bar{p} \cdot \text{rad. } 3 \frac{1}{2} \cdot \text{rad. } 3 \frac{1}{2} \cdot \text{rad. } 4 \frac{1}{2} \cdot \text{rad. } 3 \frac{1}{2}$$

$$\text{Rad. } 1 \frac{1}{2} \cdot \bar{p} \cdot \text{rad. } 3 \frac{1}{2} \cdot \text{rad. } 1 \frac{1}{2} \cdot \bar{p} \cdot \text{rad. } 3 \frac{1}{2}$$

Ad 1471607